

Tableau 3 : Cultures de remplacement possibles selon le désherbage appliqué sur la culture et conditions de mise en œuvre

Produit appliqué	Blé tendre	Blé dur	Orge	Avoine	Mais	Lin	Colza	Pois protéagineux	Féverole	Tournesol	Betterave Sucrière	Pomme de Terre	Sorgho	Soja	Graminées fourragères	Légumineuses fourragères	Luzerne	Ray grass	
Avadex 480									-										
Chlorobuluron	Application de CTU avant fin novembre																		
	Application de CTU en décembre/janvier																		
Codix*	-	-		-		-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	
Constel / Lauréat	Application avant fin novembre																		
	Application de décembre/janvier																		
Défi/Daiko	Application avant fin novembre																		
	Application de décembre/janvier																		
DFF (nombreuses spécialités)	Application avant fin novembre																		
	Application de décembre/janvier																		
Kalenkoa / Othello*	Fosburi*	(3m)	(3m)	(3m)		(5m)	(4m)		(4m)	-	(4.5m)		(4.5m)	(5m)					
	Application d'automne	(3m)	(3m)	(3m)		(5m)			(4m)	-			(5m)						
	Application de sortie d'hiver					(7.5)													
Méteno*	(4m)	(4m)	(4m)	(4m)	(5m)	(5m)	-	(4m)	(4m)			(5m)	(5.5m)	(5.5m)					
Merkur*																			
Pontos*	(2m)	(2m)	(2m)		(2m)		(2m)	(2m)	(2m)	(2m)	(2m)								
Prowl 400 / Baroud SC																			
Quinrus*	(2m)	(2m)	(2m)		(2m)		(2m)	(2m)	(2m)	(2m)	(2m)								
Trinity*	Application avant fin novembre																		
	Application en décembre/janvier																		
Trooper*																			
Xinia*	(3m)	(3m)	(3m)	(4m)	(4m)	(4m)		(2m)	(4m)	(5m)	(5m)	(5m)	(5m)	(4m)			(4m)	(4m)	
* données firmes																			
légende		OK quel que soit le travail du sol																	
		Travail du sol nécessaire																	
		labour nécessaire																	
		déconseillé																	
		(m ; j)	précision du nombre de mois ou jours entre l'application et le semis																
	-	pas de données																	