HERBICIDES ANTIDICOTYLEDONES UTILISABLES APRES LE STADE 2 NŒUDS DES CEREALES HIVER 2026

ARVALIS

- ● dose homologuée sur la culture
- ◦ dose la plus faible sur la culture
- • produit non autorisé
- ○ Produit autorisé sur la culture par portée de l'usage, et avec accord de la firme

CEREALES
Hiver

Anti-dicotylédones

Blé tendre	Blé dur	Orge	Avoine	Seigle	Triticale	Epeautre	SPECIALITES COMMERCIALES	Firmes	Doses autorisées kg/ha ou l/ha ou g m.a./ha	MATIERES ACTIVES, CONCENTRATIONS ET MODE DE PENETRATION: RACINAIRE ET FOLIAIRE	HRAC	FOLIAIRE	HRAC	FORMULATIONS	Nombre d'application max	Restrictions sols drainés	DAR (jour ou stade) ou stade max d'application	Gaillet	Chardon	Liserons	Rumex de souche	Renouée liseron	Renouée oiseaux
●	●	◦	•	●	●	●	ACCURATE TF/ RACING TF/ DAYTONA TF	Nufarm	0,06 - 0,075	metsulfuron 7% thifensulfuron 68%	2 2			WG	1	-	BBCH 39						
●	●	●	●	●	●	●	AKA/SEKENS (1)	Corteva	1	florasulame 2,5	2	fluroxypyr 100 + clopyralid 80	4	EC	1	-	BBCH 37						
●	●	●	●	●	●	●	ALLIE DUO SX / PRESITE SX	FMC	0,075	metsulfuron-méthyl 6,7% thifensulfuron-méthyl 33,3%	2 2			WG	1	oui (8)	BBCH39						
●	●	●	●	●	●	●	ALLIE MAX SX/ POINTER ULTRA SX	FMC	0.035	metsulfuron-méthyl 14.3% tribénuron-méthyl 14.3%	2 2			WG	1	oui (>45% argile)	BBCH39						
●	●	●	●	●	●	●	ALLIE STAR SX/ BIPLAY SX	FMC	0.045	metsulfuron-méthyl 11.1% tribénuron-méthyl 22.2%	2 2			WG	1	oui (>45% argile)	BBCH39						
●	●	●	●	●	●	●	BOUDHA	Albaugh	0,02	metsulfuron-méthyl 25% tribénuron-méthyl 25%	2 2			WG	1	oui (>45% argile)	BBCH 39						
●	●	●	•	◦	●	●	CROUPIER OD	Certis Belchim	0,6	metsulfuron 9	2	fluroxypyr 225	4	OD	1	oui (>45% argile)	BBCH39						
●	●	●	●	●	●	●	CHARDEX/EFFIGO (2)	Corteva	1.5			MCPA 350+clopyralid 35	4	SL	1	-	BBCH39						
●	●	●	●	●	●	●	Florasulame (3)	nombreuses spécialités	-	florasulame	2			SC	1	oui (>45% argile)	BBCH 45						
●	●	●	●	●	●	●	Fluroxypyr (3)	nombreuses spécialités	200			fluroxypyr 200	4	EC	1	-	BBCH39						
●	●	●	●	●	●	○	HARMONY EXTRA SX / PRAGMA SX	FMC	0,075	thifensulfuron-méthyl 33,3% tribénuron-méthyl 16,7 %	2 2			WG	1	oui (8)	BBCH39						
●	●	●	•	●	●	●	HARMONY M SX / CONCERT SX	FMC	0,15	metsulfuron 4% thifensulfuron 40%	2 2			WG	1	oui (9)	BBCH 39						
●	●	●	•	●	●	●	Metsulfuron (6)	nombreuses spécialités	0,025 - 0,03	metsulfuron-méthyl 20%	2			WG	1	oui (>45% argile)	BBCH39						
●	●	●	●	●	●	●	METISS	Nufarm	2			MCPA 400	4	SL	1	-	BBCH39						
●	●	●	●	●	●	•	OMNERA LQM / PROVALIA LQM (7)	FMC	1	metsulfuron 5 thifensulfuron 30	2 2	fluroxypyr 135	4	OD	1	-	BBCH39						
●	●	●	●	●	●	●	PHYTON/ KUMYS	UPL	0,1	metsulfuron 4% +bensulfuron 50%	2 2			WG	1	oui	BBCH39						
●	●	●	●	●	●	●	PICARO SX	FMC	0,06	thifensulfuron-méthyl 25% tribénuron-méthyl 25 %	2 2			WG	1	-	BBCH39						
●	●	●	◦	●	●	●	PIXXARO EC / FRIMAX (5)	Corteva	0.25-0.5			halauxifen 12.5 fluroxypyr 280 cloquintocet 12	4 4	EC	1	-	BBCH 30- 39						
●	●	●	•	●	●	●	PRIMA STAR / TURBAN	Nufarm / Ascenza Agro	0,03	tribénuron-méthyl 75 %	2			WG	1	-	BBCH 39						
●	●	●	◦	●	●	●	STARANE GOLD (4)	Corteva	1.5	florasulame 1	2	fluroxypyr 100	4	SE	1	-	BBCH32-45						
●	●	●	●	●	●	●	SYNOPSIS	FMC	0,05	metsulfuron-méthyl 8.3% tribénruron-méthyl 8.3% florasulame 10.5%	2 2 2			WG	1	oui (>45% argile)	BBCH 39						
●	●	●	◦	●	●	●	ZYPAR / RENITAR (5)	Corteva	0,5-1			halauxifen 6 florasulame 5 cloquintocet 6	4 4	OD	1	-	BBCH 30-45						

(1) Sur cultures de printemps, limitation à 2 nœuds, à 1,5 l/ha. Sur céréales d'hiver, 0,75 l/ha après le stade 2 nœuds.
(2) 2 nœuds pour les cultures de printemps.
(3) Vérifier les homologations : variations possibles de stades limites selon les cultures en fonction des spécialités.
(4) Utilisation possible jusqu'au stade gonflement (BBCH45) sur blé tendre hiver, blé dur hiver, épeautre, triticale et orge hiver - 2 nœuds pour les autres cultures.
(5) l'utilisation sur avoine d'hiver est possible, mais uniquement jusqu'au stade épi 1cm, à la dose de 0.25 l/ha pour Pixxaro EC et 0.5 l/ha pour Zypar.
(6) Doses et homologations par culture pouvant varier d'une spécialité à une autre - notamment pour l'avoine.
(7) Sur avoine d'hiver, dose de 0.75 l/ha recommandée.
(8) ne pas appliquer sur parcelles drainées, uniquement pour applications précoces (avant BBCH20)
(9) ne pas appliquer sur parcelles drainées, en période de drainage.

* fin des utilisations au 07/11/2025

- sensible
- moyennement sensible
- faible à irrégulier
- innefficace

Avril 2026

HERBICIDES ANTIGRAMINEES UTILISABLES APRES LE STADE 2 NŒUDS DES CEREALES HIVER 2026

● dose homologuée sur la culture
◆ dose la plus faible sur la culture
◆ produit non autorisé
○ Produit autorisé sur la culture par portée de l'usage, et avec accord de la firme

CEREALES Hiver																				
Blé tendre	Blé dur	Orge	Avoine	Seigle	Triticale	Epeautre	SPECIALITES COMMERCIALES	*Firmes*	Doses autorisées kg/ha ou l/ha ou g m.a./ha	MATIERES ACTIVES, CONCENTRATIONS ET MODE DE PENETRATION: RACINAIRE ET FOLIAIRE	HRAC	FOLIAIRE	HRAC	FORMULATIONS	Nombre d'application max	Restrictions sols drainés	DAR (jour ou stade)	Folle avoines	Vulpin	Ray grass
Anti-graminées																				
●	◆	●	◆	●	●	●	**AXIAL PRATIC / ALKERA / AXEO (1)**	Syngenta	0.9-1.2			pinoxaden 50 +cloquintocet 12,5	1 1	EC	1	-	60			
●	◆	●	◆	●	●	●	**AXIAL ONE (1)**	Syngenta	1 - 1.3	florasulame 5	2	pinoxaden 45 + cloquintocet 11,25	1	EC	1	-	BBCH 37			
●	●	◆	◆	●	●	○	**BROCAR 240**	Nufarm	0,25			clodinafop-propargyl 240 + cloquintocet 60	1	EC	1	-	BBCH 39			
●	●	◆	◆	●	●	◆	**CELIO / DYVEL / STIGMA / GRIMS / CLODINASTAR**	-	0.6			clodinafop-propargyl 100 + cloquintocet 25	1	EC	1	-	BBCH 69 et 42 j			
●	●	◆	◆	●	●	●	**TRAXOS PRATIC / TOUNDRA / TROMBE (1)**	Syngenta	1.2			pinoxaden 25 clodinafop-propargyl 25 + cloquintocet 6,25	1 1	EC	1	-	60			

(1) Uniquement sur grand épeautre