

Blé d'hiver

A. FORTE INFESTATION de VULPIN

Situation type / flore dominante	Intervention d'automne			
	prélevée	levée	1 à 2 F. du blé	2 à 3 F. du blé
Vulpins sensibles	Trooper 2.5 (15, 3)			
			Fosburi 0.6 (15, 12)	
	Quirinus 1 (15, 12)	ou	Quirinus 1 (15, 12)	
	Pontos 1 (15, 12)	ou	Pontos 1 (15, 12)	
	Battle Delta 0.6 (15, 12)	ou	Battle Delta 0.6 (15, 12)	
			Merkur 3 (15, 12, 3)	
	Mateno 2 (15, 12, 32)			
	Pontos 0.83 (15, 12) + Prowl 2.5 (3)			
	Bozeno 1.35 (32) + Codix* 2 (12, 3)			
	Mateno Duo 1.2 (32, 12) + Prowl Expert 2 (3)			
	Trooper 2.5 (15, 3) + DFF solo 0.2 (12)			
	Pontos 0.75 (15, 12) + Trinity 1.5 (5, 3, 12)			
			Fosburi 0.6 (15, 12) + CTU 1500 g (5)	
	Sunfire 0.48 (15) + Codix 2 (3, 12)			

* : ne pas appliquer sur sols drainés à plus de 45% d'argile

En cas de résistance aux FOPS, DIMES et DEN (groupe A), privilégier un rattrapage avec un groupe B (Atlantis ou Abak) et inversement en cas de résistances aux ALS.

Situation type / flore dominante	Intervention d'automne			
	prélevée	levée	1 à 2 F. du blé	2 à 3 F. du blé
Vulpins résistants FOPS, Dems et ALS	Codix 2 (3, 12)		Glosset 0.4 (15)) + CTU 1800g (5)	
	Codix 2 (3, 12)		Pontos 0.75 (15, 12) + CTU 1500 g (5)	
	Sunfire 0.48 (15) + Codix 2 (3, 12)		CTU 1800 g (5)	
	Bozeno 1.35 (32) + Codix* 2 (12, 3)		CTU 1800 g (5)	
	Mateno Duo 1.2 (32, 12) + Prowl Expert 2 (15)		CTU 1800 g (5)	
	Bozeno 1.35 (32) + Codix* 2 (12, 3)		Pontos 1 (15, 12)	
	Mateno Duo 1.2 (32, 12) + Prowl Expert 2 (15)		Pontos 1 (15, 12)	
	Celtic 2.5 (3, 12)		Fosburi 0.6 (15, 12) + CTU 1500 g (5)	
	Mateno 2 (15, 12, 32)		CTU 1800 g (5)	

Rattrapage au printemps	
tallage	Epi 1 cm
Troxos Pratic 1.2 (1) +H ou Levto 0.5 (2) +H+Actimum Atlantis Pro* 1.5 (2) +H+Actimum Atlantis Star* 0.33 (2) + H + Actimum Pacifica Xpert* 0.5 (2) +H+Actimum ou Pour les solutions sans DFF à l'automne : Othello* 1.5 (2, 12) +H+Actimum	

Rattrapage au printemps	
tallage	épi 1 cm
STRATEGIE TOUT AUTOMNE, les solutions de sortie d'hiver n'étant plus efficaces. Dans cette situation, il est urgent que le système mis en place soit repensé dans sa globalité (rotation, travail du sol).	

FORTES INFESTATIONS de RAY GRASS

Situation type / flore dominante	Intervention d'automne		
	prélevée	levée	1 à 2 F. du blé

Ray-grass sensibles	Mateno 2 (15, 12, 32)		
	Trooper 2 (15, 3) + Trinity 2 (5, 3, 12)		
	Pontos 0.75 (15, 12) + Trinity 1.5 (5, 3, 12)		
	Pontos 0.83 (K3, F1 - 15, 12) + Prowl 2.5 (K1 - 3)		
	Bozeno 1.35 (32) + Codix* 2 (12, 3)		
	Mateno Duo 1.2 (32, 12) + Prowl Expert 2 (3)		
	Trooper 2.5 (15, 3) + DFF solo 0.2 (12)		
		Trinity 2 (5, 3, 12) + Glosset 600 C 0.4 (15)	
		Fosburi 0.5 (15, 12) + CTU 1800 g (5)	

* : ne pas appliquer sur sols drainés à plus de 45% d'argile

En cas de résistance aux FOPS, DIMES et DEN (groupe A), privilégier un rattrapage avec un groupe B (Atlantis ou Abak) et inversement en cas de résistances aux ALS.

Rattrapage au printemps	
tallage	épi 1 cm

Axial Pratic 1.2 (1) +H ou Abak 0.25 (2) + H+Actimum ou Archipel Duo* 1 (2) +H+Actimum Cossack Star* 0.2 (2) +H+Actimum Pacifica Xpert* 0.5 (2) +H+Actimum ou Pour les solutions sans DFF à l'automne : Othello* 1.5 (2,12) +H+Actimum	
--	--

Situation type / flore dominante	Intervention d'automne		
	prélevée	levée	1 à 2 F. du blé

Ray-grass résistants FOPS, Dems et ALS	Codix 2 (3, 12)		Glosset 0.4 (15) + CTU 1800g (5)	
	Codix 2 (3, 12)		Pontos 0.75 (15, 12) + CTU 1500 g (5)	
	CTU 1800g (5) + Prowl 400 2 (3)		Fosburi 0.6 (15, 12)	
	Sunfire 0.48 (15) + Codix 2 (3, 12)		CTU 1800 g (5)	
	Bozeno 1.35 (32) + Codix* 2 (12, 3)		CTU 1800 g (5)	
	Mateno Duo 1.2 (32, 12) + Prowl Expert 2 (15)		CTU 1800 g (5)	
	Celtic 2.5 (3, 12)		Fosburi 0.6 (15, 12) + CTU 1500 g (5)	
	Mateno 2 (15, 12, 32)		CTU 1800 g (5)	

Rattrapage au printemps	
tallage	épi 1 cm

STRATEGIE TOUT AUTOMNE, les solutions de sortie d'hiver n'étant plus efficaces.	
Dans cette situation, il est urgent que le système mis en place soit repensé dans sa globalité (rotation, travail du sol).	

Solutions interdites en sols drainés

* Interdit sur sols drainés à plus de 45% d'argile

XXX Solutions non préconisées par les firmes

Attention les produits à base de flufénacet sont applicables uniquement jusqu'au 10 décembre 2026.

Prosulfocarbe : bien respecter les règles d'application pour désherber les céréales - Septembre 2026