

Orge d'hiver



FORTE INFESTATION de VULPIN

| Situation type<br>/ flore<br>dominante | Intervention d'automne                           |       |                                          |                    | Rattrapage au printemps  |          |  |  |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------|--|--|--|
|                                        | prélevée                                         | levée | 1 à 2 F. de l'orge                       | 2 à 3 F. de l'orge | tallage                  | épi 1 cm |  |  |  |
| Vulpins<br>sensibles                   |                                                  |       | Fosburi 0.6 (15, 12)                     |                    | Axial Pratic 1.2 (1) + H |          |  |  |  |
|                                        |                                                  |       | Battle Delta 0.6 (15, 12)                |                    |                          |          |  |  |  |
|                                        |                                                  |       | Quirinus 1 (15, 12)                      |                    |                          |          |  |  |  |
|                                        |                                                  |       | Pontos 1 (15, 12)                        |                    |                          |          |  |  |  |
|                                        |                                                  |       | Merkur 3 (15, 12, 3)                     |                    |                          |          |  |  |  |
|                                        | Pontos 0.75 (15, 12) +<br>Trinity 1.5 (5, 3, 12) |       |                                          |                    |                          |          |  |  |  |
|                                        | Pontos 0.83 (15, 12) +<br>Prowl 2.5 (3)          |       |                                          |                    |                          |          |  |  |  |
|                                        | Trooper 2.5 (15, 3)<br>(+ DFF solo 0.2 (12))     |       |                                          |                    |                          |          |  |  |  |
|                                        | Bozeno 1.35 (32) +<br>Codix** 2 (12, 3)          |       |                                          |                    |                          |          |  |  |  |
|                                        | Mateno Duo 1 (32, 12) +<br>Prowl Expert 2 (3)    |       |                                          |                    |                          |          |  |  |  |
|                                        | Sunfire 0.48 (15) +<br>Codix 2 (3, 12)           |       |                                          |                    |                          |          |  |  |  |
|                                        |                                                  |       |                                          |                    |                          |          |  |  |  |
|                                        |                                                  |       | Fosburi 0.5 (15, 12) + CTU<br>1500 g (5) |                    |                          |          |  |  |  |

En cas de forte infestation de vulpins, choisissez un programme double automne. Mise en œuvre obligatoire de leviers agronomiques pour éviter ce genre de situations.

| Situation type<br>/ flore<br>dominante | Intervention d'automne |                      |       |                      |                    | Rattrapage possible au printemps |          |
|----------------------------------------|------------------------|----------------------|-------|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------|
|                                        | présemis incorporé     | prélevée             | levée | 1 à 2 F. de l'orge   | 2 à 3 F. de l'orge | tallage                          | épi 1 cm |
| Vulpins<br>résistants<br>Fops, Dens*   |                        | Celtic 2.5 (3, 12)   |       | Fosburi 0.6 (15, 12) |                    | STRATEGIE TOUT AUTOMNE           |          |
|                                        |                        | Codix 2 (3, 12)      |       | Pontos 1 (15, 12)    |                    |                                  |          |
|                                        |                        | Trinity 2 (5, 3, 12) |       | Pontos 1 (15, 12)    |                    |                                  |          |
|                                        |                        | Trooper 2.5 (15, 3)  |       | CTU 1500 g (5)       |                    |                                  |          |

\* Ce type de programmes est plus risqué vis-à-vis de la sélectivité, notamment en sols limoneux/filtrants. Ne pas hésiter à adapter la dose dans de telles situations. Dans tous les cas, il conviendra de mettre en place de façon urgente des leviers agronomiques afin de diminuer l'infestation.

Prosulfocarbe : bien respecter les règles d'application pour désherber les céréales - Septembre 2026

**B FORTE INFESTATION de RAY GRASS** (situation sans résistance)

|                                        |                                                  | Intervention d'automne                   |                           |                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Situation type<br>/ flore<br>dominante | prélevée                                         | levée                                    | 1 à 2 F. de l'orge        | 2 à 3 F. de l'orge |
| Ray Grass<br>sensibles                 | Constel 4.5 (5, 12)**                            | ou                                       |                           |                    |
|                                        | Battle Delta 0.6 (15, 12)                        |                                          | Battle Delta 0.6 (15, 12) |                    |
|                                        |                                                  | Fosburi 0.6 (15, 12)                     |                           |                    |
|                                        | Trooper 2.5 (15, 3)<br>+ DFF solo 0.2 (12)       |                                          |                           |                    |
|                                        | Pontos 0.75 (15, 12) +<br>Trinity 1.5 (5, 3, 12) |                                          |                           |                    |
|                                        | Bozeno 1.35 (32) +<br>Codix** 2 (12, 3)          |                                          |                           |                    |
|                                        | Mateno Duo 1 (32, 12) +<br>Prowl Expert 2 (3)    |                                          |                           |                    |
|                                        | Pontos 0.83 (15, 12) +<br>Prowl 2.5 (3)          |                                          |                           |                    |
|                                        |                                                  | Fosburi 0.5 (15, 12) + CTU<br>1500 g (5) |                           |                    |

| Rattrapage possible au printemps |          |
|----------------------------------|----------|
| tallage                          | épi 1 cm |
| Axial pratic 1.2 (1) + H         |          |

| Situation type<br>/ flore<br>dominante           | Intervention d'automne |                      |       |                      |                    |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------|----------------------|--------------------|
|                                                  | présemis               | prélevée             | levée | 1 à 2 F. de l'orge   | 2 à 3 F. de l'orge |
| Ray grass<br>résistants fops<br>et dens et ALS * |                        | Celtic 2.5 (3, 12)   |       | Fosburi 0.6 (15, 12) |                    |
|                                                  |                        | Codix 2 (3, 12)      |       | Pontos 1 (15, 12)    |                    |
|                                                  |                        | Trinity 2 (5, 3, 12) |       | Pontos 1 (15, 12)    |                    |
|                                                  |                        | Trooper 2.5 (15, 3)  |       | CTU 1500 g (5)       |                    |

| Rattrapage possible au printemps |          |
|----------------------------------|----------|
| tallage                          | épi 1 cm |
| STRATEGIE TOUT AUTOMNE           |          |

\* Ce type de programmes est plus risqué vis-à-vis de la sélectivité, notamment en sols limoneux/filtrants. Ne pas hésiter à adapter la dose dans de telles situations. Dans tous les cas, il conviendra de mettre en place de façon urgente des leviers agronomiques afin de diminuer l'infestation.

Solutions interdites en sols drainés

\* Interdit sur sols drainés à plus de 45% d'argile  
 \*\* Possibilité de traiter en post levée d'automne sur sols drainés ayant moins de 45% d'argile

XXX Solutions non préconisées par les firmes

Attention les produits à base de flufénacet sont applicables uniquement jusqu'au 10 décembre 2026.

Prosulfocarbe : bien respecter les règles d'application pour désherber les céréales - Septembre 2026