

Blé dur



FORTE INFESTATION de VULPIN ou de RAY-GRASS

Situation type / flore dominante		Intervention d'automne		
		prélevée	levée	1 à 2 F. du blé
Ray-grass et vulpins	Très forte infestation ou présence de résistance	Trooper 2.5 (15, 3)		
				Battle Delta 0.4 (15, 12)
		Constel 4.5 (5, 12)**		
		Battle Delta 0.4 (15, 12)		CTU 1500g (5)
		Trooper 2.5 (15, 3)		CTU 1500g (5)

Rattrapage au printemps possible	
tallage	épi 1 cm
Traxos Pratic 1.2 (1) + H ou Levto WG 0.5 (2) + H + Actimum ou Atlantis Star* 0.33 (2)+ H + Actimum ou Atlantis Pro* 1.5 (2) + H	
STRATEGIE TOUT AUTOMNE SI RESISTANCES AUX GROUPES A <u>ET</u> B.	
EN CAS DE NON RESISTANCE A L'ENSEMBLE DES PRODUITS DE SORTIE HIVER, RATTRAPAGE POSSIBLE AVEC LES PRODUITS INDiques AU-DESSUS, NON CONCERNES PAR LA RESISTANCE.	
DANS CETTE SITUATION, IL EST URGENT QUE LE SYSTÈME MIS EN PLACE SOIT REPENSE DANS SA GLOBALITE.	

En cas de résistance avérée et / ou de forte infestation de graminées, il convient de repenser son système de cultures et d'intégrer de nouvelles pratiques agronomiques. Il est également indispensable les modes d'action à l'échelle de votre rotation.

 Solutions interdites en sols drainés

* Interdit sur sols drainés à plus de 45% d'argile

** Possibilité de traiter en post levée d'automne sur sols drainés ayant moins de 45% d'argile

XXX Solutions non préconisées par les firmes

Attention les produits à base de flufenacet sont applicables uniquement jusqu'au 10 décembre 2026.

Prosulfocarbe : bien respecter les règles d'application pour désherber les céréales - Septembre 2026