

Tableau 1 : Conditions d'application des herbicides sur céréales

		Humidité du sol (J* à J*+5)			Tempé- rature (J*-2 à J*+5)	Gelées (J-2 à J+5)	Amplitudes thermiques >15°C avec gel (J*-2 à J*+5)	Hygro- métrie (J*)
		sec	humide	Excès d'eau				
Herbicides racinaires prélevée (Aubaine, Atlhet)	Efficacité	--	++	-	> 0°C			
	Sélectivité			--	> 0°C			
Herbicides racinaires postlevée (Aubaine, Atlhet)	Efficacité	--	++	-	> 0°C			
	Sélectivité			--	> 5°C	--	--	
Sulfonylurées (Archipel, Atlantis, Allié, ...)	Efficacité	--	++		> 5°C			>60%
	Sélectivité					-	--	
Antigraminées foliaires (Célio, Puma ; Axial, Traxos,...)	Efficacité	--	++		> 7°C	--		>60%
	Sélectivité					-	-	
Antidicots de contact (First, Mextra, Foxpro, ...)	Efficacité				> 5°C			>60%
	Sélectivité				> 0°C	--	--	
Hormones (Starane, Bofix, Lonpar, ...)	Efficacité	--	++		> 10°C	-		>60%
	Sélectivité				< 25°C	-	-	

++ : Effet positif sur la sélectivité ou l'efficacité*

* : J = Jour du traitement

-/- : Effet négatif / très négatif sur la sélectivité ou l'efficacité