



Réponses des agriculteurs pour le **blé tendre** :
Pourcentage de **surface de la parcelle**
concernée par des **symptômes de JNO**


- 0%
- 1 - 5% (quelques plantes dans la parcelle)
- 5 - 10% (quelques foyers)
- 10 - 30%
- 30 - 50%
- Plus de 50%






Réponses des agriculteurs pour l'orge :
Pourcentage de **surface de la parcelle**
concernée par des **symptômes de JNO**

- 0%
- 1 - 5% (quelques plantes dans la parcelle)
- 5 - 10% (quelques foyers)
- 10 - 30%
- 30 - 50%
- Plus de 50%




Réponses de agriculteurs pour l'orge :
Intensité des symptômes de JNO :

- Aucun symptôme
- Plantes avec symptômes peu fréquents ou peu intenses
- Moutonnement dans la parcelle
- Foyers avec plantes naines
- Plantes disparues



Réponses des agriculteurs pour le **blé dur** :
Pourcentage de **surface de la parcelle**
concernée par des **symptômes de JNO**

- 0%
- 1 - 5% (quelques plantes dans la parcelle)
- 5 - 10% (quelques foyers)
- 10 - 30%
- 30 - 50%
- Plus de 50%



Réponses de agriculteurs pour le **blé dur** :
Intensité des symptômes de JNO :

- Aucun symptôme
- Plantes avec symptômes peu fréquents ou peu intenses
- Moutonnement dans la parcelle
- Foyers avec plantes naines
- Plantes disparues

