

# & CHOISIR & DÉCIDER

Préconisations régionales 2016



**Maïs**  
Variétés  
et interventions



Région  
**NORMANDIE**


# AVANT-PROPOS

Le présent document fait partie de notre collection « Choisir & décider – Préconisations régionales ». Ce document présenté ici est le :

- **Guide de préconisations régionales maïs 2016 – édition Normandie.**

Il reprend les principaux résultats et les conclusions utiles pour le producteur en termes de désherbage, de lutte contre les ravageurs et de variétés.

Vous y retrouverez nos préconisations relatives aux interventions de printemps, qu'il s'agisse de désherbage, de protection contre les ravageurs et de choix de variétés maïs Fourrage et maïs Grain adapté à votre région.



Ce document est rédigé par l'équipe ARVALIS – Institut du végétal des régions Ouest avec le concours des spécialistes d'ARVALIS – Institut du végétal.

Retrouvez également les « CHOISIR & DECIDER – Préconisations régionales » des autres régions en téléchargement gratuitement sur le site.

## Equipes régionales ARVALIS – Institut du végétal en NORMANDIE

### INTERLOCUTEURS REGIONAUX POUR LE MAÏS

B.CARPENTIER (Nord), B.POINTEREAU (Ouest)

Station de Rots (14), 02 31 11 73 93, [v.langlois@arvalisinstitutduvegetal.fr](mailto:v.langlois@arvalisinstitutduvegetal.fr)

Station d'Ecardenville la Campagne (27), 02 32 07 07 40, [j.jean@arvalisinstitutduvegetal.fr](mailto:j.jean@arvalisinstitutduvegetal.fr)


Nous remercions tous nos partenaires :

- **les participants au réseau Désherbage**, pour les Chambres d'Agricultures de Bretagne : Sylvain Le Floch et Pauline Courtey, essai à Pabu (Côtes-d'Armor), Olivier Laborde-Debat et Anne-Thérèse Bilcot, essai à Cast (Finistère), Michel Falchier (CRAB) et Emmanuel Maillet, essai à Argentré du Plessis (Ille-et-Vilaine) ; pour Arvalis institut du végétal : Dominique Millet + équipe Bignan, essai à Buléon (56), Jérôme Gorichon + équipe Rots, essai à St Romphaire (50), Albert Moineau + équipe La Jaillière, essai à Belligné (44). Coordination du réseau et synthèse réalisée par Arvalis : Michel Moquet
- **les participants au réseau Variétés Post Inscription ARVALIS-UFS** : Jacques Delaunay pour Agrial (14), Odile Ledu – Jean-Philippe Turlin pour la Chambre d'agriculture du Finistère (29), Jérôme Jacq pour la Chambre d'agriculture de la Vendée (85), Benoît Musset pour la SCA Herbauges (44) et l'ensemble des établissements semenciers,
- Ainsi que tous **les agriculteurs** qui ont contribué à la réalisation des essais à la base de nos préconisations.

# SOMMAIRE


|   |           |
|---|-----------|
| <b>AVANT-PROPOS .....</b>   | <b>1</b>  |
| <b>SOMMAIRE .....</b>   | <b>2</b>  |
| <b>BILAN DE CAMPAGNE 2015 .....</b>   | <b>3</b>  |
| LA QUALITE DES MAÏS FOURRAGE SOUVENT PRESERVEE .....                              | 5         |
| <b>VARIETES : EVALUATION ET PRECONISATIONS SUR MAÏS FOURRAGE ET MAÏS GRAIN ..</b> | <b>6</b>  |
| CRITERES DE CHOIX DES VARIETES DE MAÏS .....                                      | 7         |
| VARIETES FOURRAGE TRES PRECOCES (SA) .....  | 10        |
| VARIETES FOURRAGE PRECOCES (SB) .....   | 19        |
| VARIETES FOURRAGE DEMI-PRECOCES (SC) .....  | 22        |
| VARIETES GRAIN TRES PRECOCES (G10) .....  | 25        |
| VARIETES GRAIN PRECOCES (G11) .....   | 28        |
| <b>DESHERBAGE : NOS RESULTATS ET NOS RECOMMANDATIONS ..</b>                       | <b>31</b> |
| Réseau d'essais désherbage maïs ouest 2015 .....                                  | 32        |
| Une stratégie à priori à adapter au contexte de l'année .....                     | 38        |
| Nos recommandations régionales .....  | 40        |
| <b>PROTECTION CONTRE LES RAVAGEURS ..</b>   | <b>43</b> |
| LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS AU STADE JEUNE .....                                   | 44        |
| CORVIDES : DES DEGATS PLUTOT LOCALISES EN 2015 .....                              | 46        |
| LA PYRALE, UN RAVAGEUR EN RECRUDESCENCE DANS L'OUEST .....                        | 48        |

# BILAN DE CAMPAGNE 2015




| NORMANDIE       |  |  |   |
|-----------------|--|--|---|
| CLIMAT          | Semis à 8-10 Feuilles  | Panicules visibles à stade limite d'avortement des grains  | Maturité plante entière à récolte   |
|                 | <p>Dans la continuité de l'hiver doux, des <b>températures plus chaudes sur mars et avril sans excès de pluie</b> : les sols se sont plus vite ressuyés et réchauffés facilitant les interventions pour préparer les parcelles.</p> <p>Retour de la pluie du <b>25 avril au 10 mai</b> avec des <b>cumuls variables de 80 mm</b> à Alençon à <b>20 mm</b> à Caen.</p> <p>Le début de cycle au mois de <b>mai</b> s'est déroulé sous des <b>températures assez fraîches</b> avec peu de précipitations.</p>   | <p><b>Juin - juillet : chaud et orageux.</b></p> <p>Peu de <b>précipitations de début mai à fin juillet</b> provoquant des déficits hydriques précoces. Des <b>orages sur juin</b> avec notamment 60 mm sur Caen mi juin mais très hétérogène selon les secteurs.</p> <p>Des <b>températures &gt; à 30 ° C</b> enregistrées en juillet avec un gradient nord-sud, retour de températures plus tempérées autour de la floraison.</p>  | <p><b>Fin août : très pluvieux et froid.</b></p> <p><b>Fort coups de vent sur la dernière quinzaine aout</b></p> <p><b>Septembre : doux et sec.</b></p> <p>Retour de la pluie sur <b>octobre</b> mais sans perturber les récoltes. Des températures fraîches retardant les derniers chantiers de récolte.</p>   |
| PHYSIOLOGIE     | <p><b>Deux périodes de semis</b> : la première du <b>15 au 25 avril</b> puis la deuxième du <b>10 au 20 mai</b> : davantage de semis réalisés en avril.</p> <p>Une levée plus ou moins difficile selon les dates de semis avec <b>parfois des pertes de plantes</b> dans certains cas (reprise motteuse en condition séchante mi avril/ fortes pluie fin avril).</p> <p>Une <b>croissance sans excès en mai</b> avec des maïs peu poussants, la végétation s'est accélérée avec les températures plus chaudes début juin.</p>                                    | <p><b>Des gabarits parfois courts</b> avec un début de cycle en situation assez stressante. Maïs pouvant être en stress hydrique dès 10 F selon les types de sols et les secteurs.</p> <p><b>Floraisons à date normale</b> : Les floraisons ont donc eu lieu autour du 20/07 pour les semis d'avril et début août pour les semis de mai. Retour des conditions favorables à cette période, limitant l'impact des stress précoces.</p> <p>Mise en place des composantes de rendement (nombre de grains /m<sup>2</sup>, formation de l'épi et remplissage) en absence de stress.</p> | <p><b>Evolution plutôt normale</b> en fin de cycle avec une maturité fourrage sans trop d'avance excepté dans les quelques conditions plus séchantes. Les conditions plus froides sur octobre ont quelques peu retardé les derniers ensilages.</p> <p><b>Récoltes d'ensilage</b> débutées mi septembre et terminées fin octobre dans de bonnes conditions.</p> <p>→ Rendements <b>moyens</b> avec des récoltes souvent réalisées au <b>bon stade de maturité</b> (32%MS). La <b>valeur énergétique</b> des maïs semble être <b>très bonne</b> avec un profil équilibré (tige-feuille/amidon).</p> <p>Des récoltes en grain correctes avec parfois des déceptions en rendement (Perche).</p> |
| BILAN SANITAIRE | <p><b>Ravageurs : une pression contenue.</b> Attaque de <b>mouches des semis</b> parfois très présentes avec pertes de pieds. Présence localement d'oscinies et géomyza. Dégâts de <b>corbeaux</b> assez fréquents dans la manche l'orne et la vallée de la seine avec les semis décalés.</p> <p><b>Désherbage : une bonne maîtrise</b> dans l'ensemble avec des doubles passages. Les pré-levée ont parfois déçu dans des sols plus secs. Observation d'une présence plus importante de graminées estivales avec les semis courant avril sur sol réchauffé.</p> | <p><b>Les vols de pyrales ont débuté début juillet dans l'Orne</b>, déclenchant des protections insecticides.</p> <p>Des symptômes de dégâts de <b>cicadelles</b> sans nuisibilité sur les feuilles inférieures.</p>   | <p>Les coups de vents successifs de la fin d'été ont provoqué de la verre et surtout fortement révélé les attaques de <b>rhyzoccone</b> et de <b>pyrales</b>. Les dégâts de pyrales semblent observés plus fréquemment mais avec un impact plutôt insignifiant sur le rendement.</p> <p>Davantage de <b>charbon commun</b> observé avec le scénario climatique de l'année. Quelques attaques ponctuelles d'<b>helminthosporiose</b> fusiforme en fin de cycle .</p>   |

**BILAN CLIMATIQUE 2015 – Maïs Fourrage – Région OUEST**  
Météo CAEN (14) : profil de l'année 2015



**Evolution de l'état du déficit en eau du sol**



Calcul pour un semis  
d'une variété de maïs  
fourrage ½ précoce

Date de semis : 21/04/2015  
Floraison femelle : 20/07/2015  
50% d'humidité : 04/09/2015

## LA QUALITE DES MAÏS FOURRAGE SOUVENT PRESERVEE

La composition chimique des maïs fourrage 2015 est très variable, reliée aux conditions de végétation et au stade de récolte de la plante. Le retour des pluies en fin d'été a certainement sauvé la mise pour le remplissage des grains et finalement les valeurs alimentaires semblent assez bonnes voire très bonnes.

### Des valeurs alimentaires satisfaisantes des maïs à l'ouest de la ligne La Rochelle – Ardennes

A l'ouest, la composition chimique des maïs est assez proche de celles observées les années précédentes avec cependant une teneur en amidon en léger retrait (29,7%) et une digestibilité enzymatique historiquement élevée. En conséquence, les valeurs énergétiques relevées sont très élevées avec 0,93 UFL en moyenne et les valeurs d'encombrement particulièrement basses (0,94 UEL). Les teneurs en MAT observées, légèrement plus élevées que l'année dernière, ont relevé les valeurs PDI des maïs 2015 de 2,5 g PDI par rapport à 2014. Pour cette zone, la qualité des maïs fourrage est donc très bonne, du même niveau qu'en 2011, avec une valeur énergétique portée en grande partie par la très bonne digestibilité des tiges et feuilles (c'était l'inverse en 2011).

### Valoriser les maïs 2015 dans les rations lait et viande

Pour élaborer des rations avec les maïs 2015, on devra choisir les aliments complémentaires en fonction de la

digestibilité des tiges et feuilles et de leur teneur en amidon :

-Les maïs, avec une bonne valeur énergétique plutôt apportée par les fibres très digestibles mais une teneur assez faible en amidon (<27%) devront être complémentés avec des concentrés riches en amidon (céréales) et des fourrages fibreux (enrubannage, foin, paille).

-Les maïs, avec une bonne valeur énergétique plutôt apportée par une teneur en amidon élevée (>32%) mais des fibres assez peu digestibles nécessiteront l'ajout de fourrage fibreux très digestibles et des concentrés peu riches en amidon

Dans tous les cas, il est essentiel de ne pas dépasser le seuil des 22-23% d'amidon dans la ration des vaches laitières. Cela est d'autant plus vrai cette année que les teneurs en glucides solubles sont élevés ; ceux-ci étant rapidement fermentescibles dans le rumen (donc acidogènes).

■ Valeurs alimentaires moyennes des maïs fourrage Nord-Ouest – 2015

|                             | Moyenne 2015<br>Nord Ouest | Ecart-<br>type |
|-----------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>Matière sèche %.</b>     | <b>33.1</b>                | <b>3.2</b>     |
| <b>Mat. Az. Tot. %MS</b>    | <b>7.1</b>                 | <b>0.9</b>     |
| <b>Cell. Brute %MS</b>      | <b>19.1</b>                | <b>2.2</b>     |
| <b>NDF %MS</b>              | <b>42.7</b>                | <b>3.7</b>     |
| <b>Amidon %MS</b>           | <b>29.6</b>                | <b>5.0</b>     |
| <b>Gluc. Soluble %MS</b>    | <b>7.3</b>                 | <b>2.1</b>     |
| <b>DMO tiges-feuilles %</b> | <b>60.5</b>                | <b>3.4</b>     |
| <b>UFL /kgMS</b>            | <b>0.93</b>                | <b>0.04</b>    |
| <b>UFV /kgMS</b>            | <b>0.83</b>                | <b>0.04</b>    |
| <b>PDIN g/kgMS</b>          | <b>43.8</b>                | <b>5.5</b>     |
| <b>PDIE g/kgMS</b>          | <b>64.6</b>                | <b>3.0</b>     |
| <b>UEL /kgMS</b>            | <b>0.94</b>                | <b>0.06</b>    |

Source : News @alim, Alexis FERRARD, ARVALIS Institut du végétal

# **VARIETES : EVALUATION ET PRECONISATIONS SUR MAÏS FOURRAGE ET MAÏS GRAIN**

## CRITERES DE CHOIX DES VARIETES DE MAÏS

Les tableaux de synthèse fournissent des informations sur les variétés pour les principaux critères agronomiques de caractérisation et de choix des hybrides de maïs. Ils sont illustrés par des figures qui permettent de pondérer le rendement.

### ■ TABLEAU DE CARACTERISATION DES VARIETES

• le **rendement** est exprimé en pourcentage de la moyenne des rendements de tous les hybrides figurant dans la série. Cette moyenne, indiquée en bas des tableaux, est exprimée en quintaux/ha à l'humidité de référence (15 %) pour le grain, en tonnes de matière sèche/ha en fourrage, avec le nombre d'essais retenus dans la synthèse.

• la **régularité des rendements** est appréciée à l'aide des deux informations suivantes :

- les **résultats de rendement obtenus sur les 2 ou 3 années** d'expérimentation précédentes pour les variétés testées depuis deux et trois ans dans la zone agroclimatique.

- l'**écart-type résiduel** intra-variété exprimé en pour cent du rendement moyen du regroupement. Cet indicateur de variabilité des résultats des hybrides d'un essai à l'autre traduit le comportement des hybrides entre essais. Une valeur faible indique, indépendamment du niveau de rendement, une bonne régularité des performances.

• la **précocité** est évaluée par :

- la **date de floraison femelle**, exprimée en jour d'écart à la moyenne de la série

- l'**humidité du grain à la récolte**, exprimée en écart à la moyenne (%) pour les résultats d'essais maïs grain.

- la **teneur en matière sèche de la plante entière à la récolte**, exprimée en écart à la moyenne (%) pour les résultats d'essais maïs fourrage.

• la **vigueur au départ**, exprimée en relatif par rapport à la moyenne.

• la **tenue de tige**, exprimée par le pourcentage de tiges versées à la récolte.

• Pour les **séries fourrage**, la valeur **UFL** qui caractérise la valeur énergétique. Le **DINAG** qui estime la digestibilité de la partie tiges et feuilles et la **teneur en amidon** dans la matière sèche sont exprimés en pourcentage de la moyenne.

• la **sensibilité aux maladies** sur helminthosporiose fusiforme (selon séries et régions), fusarium graminéarum, tiges creuses, est exprimée en intensité de dégâts.

• les critères de **description des plantes** : hauteur (en classe), nombre de rangs, poids de 1000 grains (en classe).


## DES FIGURES DE PONDERATION DES CRITERES

Les figures présentées en illustration des tableaux sont destinées à compléter l'appréciation de la valeur agronomique des variétés par la prise en compte simultanée de différents critères

### MAÏS FOURRAGE :


Les figures « rendement et précocité » permettent d'apprécier les différences de rendement entre hybrides pour des teneurs en matière sèche comparables. Elles facilitent l'identification des variétés qui maximisent les

compromis entre les deux critères. Les droites représentent l'effet moyen de la tardivité sur le rendement (de l'ordre de 0.2 t MS pour 1%MS).



Les figures « valeurs alimentaires » comparent la valeur DMO non amidon en fonction de la concentration en Amidon. Ils montrent comment la valeur UFL de la

variété est construite. On recherche des variétés à forte valeur UFL, avec un bon équilibre entre la richesse en grain et la digestibilité de la partie tige + feuilles.




## MAÏS GRAIN :

Les figures de « rendement et précocité » intègrent des courbes de rendements nets équivalents, prenant en compte le coût de séchage du grain. Elles permettent de relativiser les rendements biologiques par les points de teneurs en eau du grain à la récolte selon une approche économique.

Les variétés sur un même axe de rendement net sont équivalentes du point de vue de la recette financière.

Les 3 droites représentent : la moyenne de rendement économique de l'essai (droite au centre du graphique) et de part et d'autre de cette moyenne, les rendements les plus élevés et les rendements les plus faibles.

Le prix de vente retenu en 2015 pour le calcul du rendement net de séchage est de 14 € par quintal.



## VARIETES FOURRAGE TRES PRECOCES (SA)

Pour les variétés maïs Fourrage Très Précoce (série SA), les besoins en somme de températures (base 6°C) entre le semis et la maturité à la récolte (32% MS en maïs fourrage) sont inférieurs à 1415°C. Cela correspond à des indices FAO entre 150 et 250 (estimation). L'objectif de peuplement pour les maïs fourrage SA est de 105000 plantes/ha. Ces variétés sont adaptées en Normandie. Elles conviennent particulièrement bien dans les secteurs plus froids de la région.

Sur la série SA, 26 variétés ont été évaluées dans le réseau VPI ARVALIS-UFS 2015 dont 12 pour la première année, les variétés de référence sur la série SA sont KONSENSUS / EMILY / CATHY. 12 essais SA constituent le regroupement Bretagne, Normandie et Nord en 2015, ils ont été récoltés en moyenne à 33,7%MS et produits 16.1 t/ha.

■ TABLEAU 1 : NOS PRECONISATIONS POUR 2016 (SA)

| SA                   | Points forts  | Points faibles   | Particularités        |
|----------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Valeurs sûres</b> |   |  |                       |
| <b>KONSENSUS</b>     | Précoce, régulière, Mixte                                   | Potentiel plus faible, Vigueur, Digestibilité tige-feuille, Helmintho. | Début de série        |
| <b>MILLESIM</b>      | Productive et régulière, Vigueur, Riche en amidon, Mixte.   | Digestibilité tige-feuille.  | Milieu-fin de série   |
| <b>LG 30220</b>      | Productive, Vigueur, Valeur énergétique,                    |  | Milieu-fin de série   |
| <b>MALLORY</b>       | Productive, Vigueur, Digestibilité tige-feuille, Helmintho. | Moins riche en amidon  | Milieu-fin de série   |
| <b>LG 30223</b>      | Vigueur, Valeur énergétique                                 |  | Fin de série          |
| <b>Confirmées</b>    |   |  |                       |
| <b>KUBITUS</b>       | Productive, très riche en amidon                            | Vigueur, Digestibilité tige-feuille, Helmintho. (AS)                   | Début-milieu de série |
| <b>LG 30212</b>      | Précoce, Vigueur, Valeur énergétique                        | Helmintho. (AS)  | Début-milieu de série |
| <b>MONCHERIE</b>     | Productive  | Tardive, valeur énergétique, verse, Helmintho.                         | Toute fin de série    |
| <b>A essayer</b>     |   |  |                       |
| <b>BELAMI</b>        | Très précoce et productive, Riche en amidon.                |  | Début de série        |
| <b>BANJO</b>         | Précoce et productive, Riche en amidon.                     | Vigueur, Digestibilité tige-feuille.                                   | Début de série        |
| <b>ENNEKA</b>        | Digestibilité tige-feuille.                                 | Moins riche en amidon, (Helmintho. (AS))                               | Fin de série          |
| <b>LG 30231</b>      | Vigueur   |  | Fin de série          |
| <b>RONNY</b>         | Vigueur   | (Helmintho. (AS))  | Fin de série          |

Parmi les variétés références de la série, MILLESIM a un rendement très régulier à 102.8 % sur 3 ans. Avec une floraison précoce, sa précocité tend vers le milieu de groupe cette année. Sa valeur énergétique est moyenne avec une teneur en amidon élevée. En variété très précoce, KONSENSUS reste régulière malgré son potentiel plus faible. COLISEE est plus irrégulière.


MALLORY est régulièrement très productive sur 3 ans à 104.7 %. Sa valeur énergétique est moyenne avec une teneur en amidon faible en 2015. Sur le même créneau de précocité LG 30220 est également régulière avec 103.5 % sur 3 ans et avec une valeur énergétique bien équilibrée. LG 30223 avec 102.4 % sur 3 ans, est un peu plus tardive.

En précocité de milieu de groupe, KUBITUS (102,3% sur 2 ans) confirme en rendement mais avec une vigueur au


départ un peu faible et une valeur énergétique moyenne. D'un même niveau, LG 30212 a une bonne vigueur au départ et un profil énergétique plus équilibré. MONCHERIE confirme sa productivité à 105.3 % sur 2 ans mais reste très tardive avec une valeur alimentaire moyenne et une tenue de tige parfois fragile.

Sur les variétés récentes, de nombreuses sont productives mais plus tardives que RONALDINIO : ENNEKA avec une bonne digestibilité tige-feuille, RONNY avec une teneur en amidon élevée et LG30231 avec une bonne vigueur au départ. Un peu moins productive mais plus précoce, BELAMI, très précoce, a une valeur énergétique supérieure et BANJO avec une vigueur faible au départ a une teneur élevée en amidon et une digestibilité tige feuille inférieure.

## GRAPHIQUE 1 : RENDEMENT ET PRECOCITE 2015 (SA)



## GRAPHIQUE 2 : EVALUATION DE LA VALEUR ENERGETIQUE 2015 (SA)



## MAIS FOURRAGE : Caractérissez votre variété d'un seul coup d'œil

Bretagne, Normandie, Nord



Institut du végétal

## VARIETES TRES PRECOCES (SA)

Source des données : Réseau d'essais de Post-Inscription ARVALIS Institut du végétal, partenaires et UFS Section maïs

Toutes les données présentées sont issues d'au moins 3 essais d'où des données indisponibles (vigeur, vers...

| Variétés<br>Très<br>Précoce<br>(SA) | Variété   | Représentant              | Année<br>Inscription | Type grain | Productivité (%) |       |       |                                   | Précocité                  |   |   | Qualité fourrage (Toutes zones) |              |                                  |
|-------------------------------------|---|---------------------------|----------------------|------------|------------------|-------|-------|-----------------------------------|----------------------------|---|---|---------------------------------|--------------|----------------------------------|
|                                     |   |                           |                      |            | 2013             | 2014  | 2015  | Ecart<br>type<br>(régu-<br>lanté) | Moy.<br>pluri-<br>annuelle | Floraison<br>(écart moy.<br>du regrou-<br>pement) | % MS<br>récolte<br>(écart moy.<br>du regrou-<br>pement) | UFL (%)                         | DINAG<br>(%) | % Amidon<br>dans la<br>MS<br>(%) |
| Témoins                             | CATHY   | Advanta/Limagraine Europe | 2012                 | cd         | 102.9            | 98.0  | 98.4  | 3.3                               | 99.7                       | -   | + 0.2 %   | 100.3                           | 102.1        | 99.4                             |
|                                     | EMILY   | Advanta/Limagraine Europe | 2011                 | c.ccd      | 100.6            | 99.5  | 99.0  | 2.1                               | 99.7                       | -   | - 0.0 %   | 100.2                           | 100.3        | 94.1                             |
|                                     | KONSENSUS   | KWS Mais France           | 2008                 | c.ccd      | 95.2             | 98.6  | 95.7  | 4.0                               | 96.5                       | -   | + 1.3 %   | 98.4                            | 93.8         | 103.3                            |
| Autres                              | RONALDINO   | Semences de France        | 2007                 | c.ccd      | -                | 98.2  | 97.9  | 4.5                               | 98.1                       | -   | - 0.6 %   | 100.6                           | 101.4        | 103.1                            |
|                                     | COLISEE   | Semences de France        | 2011                 | cc         | 101.9            | 100.5 | 96.5  | 2.2                               | 99.6                       | -   | + 2.1 %   | 99.5                            | 97.0         | 104.8                            |
|                                     | MILLESIM  | Semences de France        | 2011                 | cd         | 103.7            | 102.1 | 102.6 | 2.1                               | 102.8                      | -   | - 0.2 %   | 99.7                            | 96.6         | 106.6                            |
| 3ème année                          | TOURAN  | KWS Mais France           | DE-2006              | c.ccd      | -                | -     | 95.2  | 4.4                               | -                          | -   | + 0.2 %   | 100.4                           | 100.2        | 103.9                            |
|                                     | LG30220   | LG/Limagraine Europe      | 2012                 | c.ccd      | 104.6            | 103.3 | 102.5 | 2.7                               | 103.4                      | -   | - 0.7 %   | 101.1                           | 102.4        | 100.3                            |
|                                     | LG30223   | LG/Limagraine Europe      | 2012                 | cd         | 105.0            | 101.0 | 101.1 | 2.8                               | 102.3                      | -   | - 1.4 %   | 100.9                           | 102.5        | 97.5                             |
| 2ème année                          | MALLORY   | Advanta/Limagraine Europe | 2013                 | cc         | 104.7            | 104.4 | 105.1 | 2.6                               | 104.7                      | -   | - 0.7 %   | 99.6                            | 99.5         | 87.5                             |
|                                     | KUBITUS   | KWS Mais France           | 2014                 | c.ccd      | -                | 103.8 | 100.8 | 3.1                               | 102.3                      | -   | + 0.6 %   | 99.3                            | 97.6         | 102.8                            |
|                                     | LG30212   | LG/Limagraine Europe      | 2014                 | c.ccd      | -                | 101.5 | 102.2 | 3.4                               | 101.8                      | -   | + 0.3 %   | 99.5                            | 99.3         | 99.4                             |
| MONCHERIE                           | Momont  | MONCHERIE                 | Π-2012               | cd         | -                | 107.0 | 103.6 | 2.6                               | 105.3                      | -   | - 2.4 %   | 99.5                            | 99.8         | 98.7                             |
|                                     | RGT CINEXX  | R.A.G.T. Semences         | 2014                 | c.ccd      | -                | 100.2 | 100.5 | 3.8                               | 100.3                      | -   | + 0.1 %   | 100.5                           | 101.1        | 98.3                             |
|                                     | ATHOS   | Semences de France        | 2015                 | c.ccd      | -                | -     | 98.4  | 1.7                               | -                          | -   | + 0.3 %   | 99.7                            | 98.7         | 104.6                            |
| 1ère année                          | BANJO   | Semences de France        | 2015                 | cc         | -                | -     | 99.7  | 2.3                               | -                          | -   | + 1.3 %   | 100.7                           | 99.4         | 108.4                            |
|                                     | BELAMI  | Caussade Semences         | 2015                 | cc         | -                | -     | 98.3  | 2.2                               | -                          | -   | + 3.1 %   | 103.2                           | 105.9        | 111.8                            |
|                                     | DKC3343   | Semences Dekalb/Monsanto  | 2014                 | c.ccd      | -                | -     | 98.2  | 2.3                               | -                          | -   | + 0.7 %   | 100.7                           | 103.1        | 98.0                             |
| 1ère année                          | DKC3352   | Semences Dekalb/Monsanto  | 2015                 | c.ccd      | -                | -     | 97.5  | 2.1                               | -                          | -   | + 0.3 %   | 100.0                           | 100.2        | 99.9                             |
|                                     | DS1157A   | De Sangosse               | 2015                 | c.ccd      | -                | -     | 101.7 | 2.4                               | -                          | -   | - 0.8 %   | 99.9                            | 103.6        | 96.5                             |
|                                     | ENNEKA  | Jouffray - Drillaud Sem.  | 2014                 | c.ccd      | -                | -     | 103.7 | 3.6                               | -                          | -   | - 1.3 %   | 100.0                           | 100.6        | 92.0                             |
| 1ère année                          | L.G30231  | LG/Limagraine Europe      | 2015                 | c.ccd      | -                | -     | 103.5 | 3.6                               | -                          | -   | - 1.0 %   | 99.8                            | 101.6        | 94.2                             |
|                                     | MAS 12H*  | Maisaddor Semences        | 2014                 | c.ccd      | -                | -     | 93.5  | 4.2                               | -                          | -   | + 0.0 %   | 101.3                           | 101.3        | 105.9                            |
|                                     | RONNY   | Advanta/Limagraine Europe | 2015                 | c.ccd      | -                | -     | 102.7 | 2.5                               | -                          | -   | - 0.9 %   | 100.2                           | 99.6         | 104.2                            |
| 1ère année                          | SY AMBOSS   | Jouffray - Drillaud Sem.  | DE-2014              | cd         | -                | -     | 101.5 | 2.1                               | -                          | -   | - 0.7 %   | 99.0                            | 100.2        | 94.4                             |
|                                     | TONINIO   | Semences de France        | DE-2013              | cd         | -                | -     | 100.2 | 3.2                               | -                          | -   | - 1.1 %   | 95.8                            | 92.3         | 90.6                             |
|                                     | ORIGINE DES ESSAIS 2015 - Retenus pour rdt et prec. |                           |                      |            | 100 %            |       |       |                                   |                            |   |   |                                 | 100 %        |                                  |
| 14 BURCY                            |   | Moyenne du regroupement   | 16.1 tha             | 17.7 tha   | 16.1 tha         |       |       |                                   |                            |   |   |                                 | 54.1         | 35.0 %                           |
| 22 ST GILLES VIEUX MARCHE           |   |                           | 11 essais            | 12 essais  | 12 essais        |       |       |                                   |                            |   |   |                                 | 8 essais     | 8 essais                         |
| 22 ST JEAN KERDANIEL                |   |                           |                      |            |                  |       |       |                                   |                            |   |   |                                 |              |                                  |
| 22 TREGOMEUR                        |   |                           |                      |            |                  |       |       |                                   |                            |   |   |                                 |              |                                  |
| 29 PLOUDANIEL                       |   |                           |                      |            |                  |       |       |                                   |                            |   |   |                                 |              |                                  |
| 35 PARGNIE                          |   |                           |                      |            |                  |       |       |                                   |                            |   |   |                                 |              |                                  |
| 59 SAULTAIN                         |   |                           |                      |            |                  |       |       |                                   |                            |   |   |                                 |              |                                  |
| 61 SEES                             |   |                           |                      |            |                  |       |       |                                   |                            |   |   |                                 |              |                                  |
| 62 BUIRE AU BOIS                    |   |                           |                      |            |                  |       |       |                                   |                            |   |   |                                 |              |                                  |
| 76 SERVILLE SALMONVILLE             |   |                           |                      |            |                  |       |       |                                   |                            |   |   |                                 |              |                                  |
| 80 DOMART SUR LA LUCE               |   |                           |                      |            |                  |       |       |                                   |                            |   |   |                                 |              |                                  |

Echelle de  
notation :

% de la moyenne des essais

Retenus pour UFL et INDAG

14 BURCY pour UFL et INDAG

22 ST JEAN KERDANIEL pour UFL et INDAG

22 TREGOMEUR pour UFL et INDAG

35 PARGNIE pour UFL et INDAG

62 BUIRE AU BOIS pour UFL et INDAG

76 SERVILLE SALMONVILLE pour UFL et INDAG

80 DOMART SUR LA LUCE pour UFL et INDAG

X ≥ 104 % pour UFL et INDAG

101% ≤ X < 104% pour UFL et INDAG

99% ≤ X < 101% pour UFL et INDAG

96% ≤ X < 99% pour UFL et INDAG

X ≤ 96 % pour UFL et INDAG

## VARIETES FOURRAGE PRECOCES (SB)

Pour les variétés maïs Fourrage Précoce (série SB), les besoins en somme de températures (base 6°C) entre le semis et la maturité à la récolte (32% MS en maïs fourrage) varient de 1415 à 1485°C. Cela correspond à des indices FAO entre 240 et 290 (estimation). L'objectif de peuplement pour les maïs fourrage SB est de 95000 plantes/ha. Ces variétés sont adaptées à l'ensemble de la région Ouest, il faut veiller à ne pas les choisir sur des secteurs trop froids en cas de semis tardif.

Sur la série SB, 27 variétés ont été évaluées dans le réseau VPI ARVALIS-UFS 2015 dont 9 pour la première année, les variétés de référence sur la série SB sont RONALDINIO / LG 30275 / GEOX. 24 essais SB dans toute la France ont été regroupés en fonction du potentiel : 8 essais à potentiel élevé (18.8 t/ha à 34.2%), 8 essais à potentiel moyen (16.3 t/ha à 32.5%) et 8 essais à potentiel faible (12.5 t/ha à 36.2%).

■ TABLEAU 1 : NOS PRECONISATIONS POUR 2016

| SB                   | Points forts  | Points faibles  | Particularités |
|----------------------|---|---|----------------|
| <b>Valeurs sûres</b> |   |   |                |
| <b>ES TAROCK</b>     | Productive et régulière   | Verse (2014), Helmintho.  |                |
| <b>LG30260</b>       | Productive et régulière, Vigueur  | Inférieur en potentiel faible   |                |
| <b>LG 30275</b>      | Productive, Helmintho., Très bonne digestibilité tige feuille.                                | En retrait en 2015 surtout en potentiel faible, Moins riche en amidon |                |
| <b>JULIETT</b>       | Productive aussi en cas de stress hydrique, Très bonne digestibilité tige feuille, Helmintho. | En retrait en 2015  | Fin de série   |
| <b>Confirmées</b>    |   |   |                |
| <b>BELCANTO</b>      |   | Valeur énergétique, Helmintho. (AS)                                   |                |
| <b>KROQUIS</b>       | Très productive et régulière  | Valeur énergétique, Helmintho. (AS)                                   | Fin de série   |
| <b>SY FANATIC</b>    | Très régulière, Valeur énergétique  | Helmintho.  | Fin de série   |
| <b>A essayer</b>     |   |   |                |
| <b>LG 30248</b>      | Valeur énergétique, Précoce et productive   | inférieur en potentiel faible   | Début de série |
| <b>KALIDEAS</b>      | Régulière, Riche en amidon, (Helmintho.)  |   |                |
| <b>SY MADRAS</b>     | Très productive aussi en cas de stress hydrique   | Un peu irrégulière, (Helmintho.)                                      |                |
| <b>LG 30291</b>      | Très bonne digestibilité tige feuille, vigueur  | Peut verser   | Fin de série   |
| <b>NIKITA</b>        | Très productive, vigueur  |   | Fin de série   |

La rusticité des variétés peut se traduire par la productivité en condition de stress hydrique, ces caractéristiques ont pu être observées en 2015. Quelques variétés ont un comportement différent.

Parmi les références, LG 30275 est une des variétés qui se comporte moins bien cette année et surtout en potentiel faible mais reste très productive à 104,2% sur 3 ans. ES TAROCK est moins pénalisée et plus régulière à 104,7% sur 3 ans. La productivité de JULIETT (103,6% sur 3 ans) est inférieure en 2015 mais satisfaisante en condition de stress hydrique. Concernant la sensibilité à l'helminthosporiose fusiforme, la vigilance est de mise pour ES TAROCK alors que LG 30275 et JULIETT ont un très bon comportement. La digestibilité tiges-feuilles de LG30275 et JULIETT reste les meilleures de la série.


En milieu de série, LG30260 (103,3% sur 3 ans) est régulièrement productive mais inférieure en condition de stress hydrique. Plus précoce, NIKLAS (101,3% sur 3 ans) présente de meilleures performances en potentiel plus faible et possède une très bonne vigueur au départ. A l'inverse, ES ALBATROS (101,7% sur 3 ans), est peu

rustique avec un rendement inférieur en potentiel faible, comme en 2013. De précocité de milieu de groupe SUNSTAR et VEMSTAR confirment leur bonne valeur énergétique équilibrée mais un potentiel inférieur.

Sur 2 ans, KROQUIS (103,8%) en milieu de série et BELCANTO (102,2%) plus précoce, confirment leur productivité également en condition stressante. Ces deux variétés ont une valeur énergétique faible et une sensibilité à l'helminthosporiose fusiforme. Tout comme SY FANATIC (101,3% sur 2 ans) très régulière et avec une valeur énergétique équilibrée.

Parmi les récentes, LG30248 (101,0%) est la plus précoce et productive avec une bonne valeur énergétique équilibrée. En milieu de série, SY MADRAS (103,2%) est très productive mais un peu irrégulière. KALIDEAS (102,3%) avec sa très bonne valeur énergétique est plus régulière. En fin de série, NIKITA (102,1%) et LG30291 (102%) ont toutes les deux une bonne vigueur au départ et une bonne digestibilité tige feuille.

## GRAPHIQUE 1 : RENDEMENT ET PRECOCITE 2015 (SB)



## GRAPHIQUE 2 : EVALUATION DE LA VALEUR ENERGETIQUE 2015 (SB)




TABLEAU 2 : EVALUATION DES CARACTERISTIQUES VARIETALES ISSUES DU RESEAU ARVALIS - UFS

**MAIS FOURRAGE : Caractérissez votre variété d'un seul coup d'œil**

Bretagne, Pays de la Loire et Normandie

**VARIETES PRECOCES (SB)**

Source des données : Réseau d'essais de Post-Inscription ARVALIS Institut du végétal, partenaires et UFS Section maïs

| Variétés<br>Précoce<br>(SB)   | Variété   | Représentant  | Année d'<br>inscription   | Type grain  | Productivité (%)  |   |   |   |  |   | Précocité  |   |  | Qualité fourrage (Toutes zones)   |   |                         |           |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--|---|---|-------------------------|-----------|
|   |   |   |   |   | 2013  |   | 2014  |   | Rdt élévés   |   | 2015   |   | Moy. pluri-<br>annuelle  | Vigueur<br>au départ  | Verse (%)   | UFL (%)                 | DINAG (%) |
|   |   |   |   |   | Rdt élévés  | Rdt moyen   | Rdt élévés  | Rdt moyen   | Rdt élévés   | Rdt moyen   | Rdt faibles  | Rdt moyen   | Floraison (écart moy-<br>du regrou-<br>pement)   | % MS récolte  | % MS récolte (écart moy-<br>du regrou-<br>pement) | % Amidon dans la MS (%) |           |
| Témoins   | RONALDINIO GEOXX  | Semences de France R.A.G.T. Semences  | 2007  | ccd   | 97.3  | 101.0   | 97.0  | 93.9  | 92.5   | 98.3  | 6.4  | 98.3  | -4 j   | +1.7%   | +/-   | 99.6                    | 107.2     |
| Rappel séries adjacentes  | LG30275 EMLY ES CHARTER ES ALBATROS ESTAROCK JULIETT LG30260 NIKLAS | L.G/Limagrain Europe Advanta/Limagrain Europe Euralis Semences Euralis Semences Advanta/Limagrain Europe L.G/Limagrain Europe Advanta/Limagrain Europe Semences de France KWS Maïs France KWS Maïs France KWS Maïs France SUNSTAR SY FANATIC VENISTRIS DKK3553 DKK3640 KALIDEAS LG30248 LG30291 NIKITA RIVALDINIO KWS SY ALTITUDE SY MADRAS | 2010 2010 2011 2010 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 | ccd | 100.5 104.6 101.1 100.6 101.8 101.3 103.2 104.6 105.1 102.1 102.8 102.9 102.4 103.2 100.7 102.3 102.3 102.3 | 102.3 104.6 101.4 100.6 101.8 103.9 103.2 105.0 102.1 100.2 103.4 97.1 101.9 100.8 97.5 100.9 100.9 100.9 | 98.6 94.3 94.0 94.6 98.6 102.3 100.2 100.8 98.0 101.1 103.4 97.4 103.9 100.8 98.0 100.9 100.0 100.0 | 100.3 101.1 100.7 101.3 101.1 102.3 103.2 105.0 101.5 100.2 103.4 104.7 103.2 101.7 101.8 103.4 103.4 103.4 | 100.2 101.1 94.3 97.8 94.9 101.1 100.8 100.0 101.3 101.1 101.0 104.7 103.6 103.3 101.5 101.5 101.5 101.5 | 4.7 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 | -0 j +2 j +1 j +2 j +2 j +1 j +0 j +2 j +2 j +1 j +1 j +1 j +0 j +0 j +1 j +1 j +1 j | +1.4% -1.2% +2.0% -2.1% +0.2% +1.4% +0.1% +1.3% +0.1% +1.0% +0.1% +0.1% +0.1% +0.1% +0.1% +0.1% +0.1% +0.1% | 98.7 99.7 100.4 99.9 99.4 99.0 99.2 99.0 99.4 99.4 99.4 99.4 99.2 99.1 99.1 99.2 99.2 99.2 | 101.7 101.3 87.8 98.4 96.9 96.9 99.2 101.6 102.9 87.7 101.6 100.4 100.4 101.4 101.4 100.0 100.0 100.0 |   |                         |           |
| 3ème année  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| 2ème année  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| 1ère année  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| ORIGINE DES ESSAIS 2015 - Retenus pour rdt et préc.   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| 14 CROUAY Rdt E 62 DELETTES 62 ETERRIGNY Rdt M 14 FONTEVAY LE PESNEL Rdt M 62 VILLERS LES CAGNICOURT Rdt M 35 GRAND FOUGRAY Rdt F 51 BIEZELUX Rdt F 35 LA CHAPELLE JANSON Rdt M 35 ST BRIEUC DES OFFS Rdt E 56 NEULLAC Rdt E 56 NVULLAC Rdt E 35 LA FERMEVILLE SOUS LES COT Rdt F 35 FRESNES EN BIEZELUX Rdt F 35 MARCHEVAL EN WOEvre Rdt F 55 ROUROUX SUR MEUSE Rdt F 57 BOURGOGNE Rdt F 57 JUVELZE Rdt M 56 BIGNAN Rdt M 56 BIGNAN Rdt M 35 ST BRIEUC EN COGLES Rdt M 56 BIGNAN Rdt M |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| Moyenne du regroupement   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| 18.6 t/ha 7 essais 8 essais  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| 14.9 t/ha 23 essais   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| 18.7 t/ha 21-juil   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| 18.8 t/ha 24 essais   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| 18.0% 24 essais   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| 100% = 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| Rendement   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| % de la moyenne des essais  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| Rétention   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| Rétention pour verse  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| Rétention pour UFL  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| Rétention pour DINAG  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| Rétention pour la moyenne des essais  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| Rétention pour la moyenne des essais  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| Rétention pour la moyenne des essais  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| Rétention pour la moyenne des essais  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| Rétention pour la moyenne des essais  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| Rétention pour la moyenne des essais  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| Rétention pour la moyenne des essais  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| Rétention pour la moyenne des essais  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| Rétention pour la moyenne des essais  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| Rétention pour la moyenne des essais  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| Rétention pour la moyenne des essais  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| Rétention pour la moyenne des essais  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| Rétention pour la moyenne des essais  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| Rétention pour la moyenne des essais  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| Rétention pour la moyenne des essais  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| Rétention pour la moyenne des essais  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| Rétention pour la moyenne des essais  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| Rétention pour la moyenne des essais  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| Rétention pour la moyenne des essais  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| Rétention pour la moyenne des essais  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| Rétention pour la moyenne des essais  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| Rétention pour la moyenne des essais  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| Rétention pour la moyenne des essais  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| Rétention pour la moyenne des essais  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| Rétention pour la moyenne des essais  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| Rétention pour la moyenne des essais  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| Rétention pour la moyenne des essais  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| Rétention pour la moyenne des essais  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |
| Rétention pour la moyenne des essais  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |   |   |                         |           |

## VARIETES FOURRAGE DEMI-PRECOCES (SC)

Pour les variétés maïs Fourrage Demi-Précoces (série SC), les besoins en somme de températures (base 6°C) entre le semis et la maturité à la récolte (32% MS en maïs fourrage) varient de 1485 à 1555°C. Cela correspond à des indices FAO entre 280 et 330 (estimation). L'objectif de peuplement pour les maïs fourrage SC est de 95000 plantes/ha. Ces variétés peuvent être choisies pour les premiers semis sur les secteurs bénéficiant d'une offre climatique supérieure.

Sur la série SC, 15 variétés ont été évaluées dans le réseau VPI ARVALIS-UFS 2015 dont 7 pour la première année, les variétés de référence sur la série SC sont LG3264 / ES CHARTER / BALBOA. 15 essais SC dans toute la France ont été regroupés en fonction du potentiel : 9 essais à potentiel élevé (19.0 t/ha à 34.4%), 8 essais à potentiel moyen (16.3 t/ha à 32.5%) et 6 essais à potentiel faible (13.0 t/ha à 32.4%).

■ TABLEAU 1 : NOS PRECONISATIONS POUR 2016

| SC                   | Points forts   | Points faibles   | Particularités |
|----------------------|--|--|----------------|
| <b>Valeurs sûres</b> |  |  |                |
| <b>BALBOA</b>        | Vigueur, mieux stress hydrique, valeur énergétique   | Irrégulier, (Helmintho.)                                 |                |
| <b>LG 3264</b>       | Productive et régulière, Valeur énergétique, très bonne digestibilité tige feuille, (Helmintho.) |  |                |
| <b>IDALGO</b>        | Régulière, très riche en amidon, vigueur   | Surveiller la verse, Digestibilité tige feuille          | Début de série |
| <b>PYTAGOR</b>       | Productive.  | Décoit en 2015 en situation de stress hydrique           |                |
| <b>Confirmées</b>    |  |  |                |
| <b>AGRO-VITALLO</b>  | Précoce et productive aussi en cas de stress hydrique  | Valeur énergétique, Vigueur, Verse floraison, Helmintho. | Début de série |
| <b>A essayer</b>     |  |  |                |
| <b>SESAME</b>        | Très précoce et productive aussi en cas de stress hydrique, Riche en amidon, vigueur.            | Surveiller la verse, (Helmintho.)                        | Début de série |
| <b>BAMACO</b>        | Précoce et productive aussi en cas de stress hydrique, Riche en amidon, vigueur.                 |  |                |
| <b>ES PEPPONE</b>    | Très productive surtout en potentiel élevé, Digestibilité tige feuille.                          | Surveiller la verse, (Helmintho.), Amidon.               |                |


Sur cette série la rusticité des variétés peut être analysée avec des essais ayant subi un stress hydrique marqué en début de cycle notamment.

Sur cette série, les écarts entre variétés sont faibles, les variétés de référence sont moyennes. LG3264 (100.5% sur 3 ans) est productive et régulière, elle a aussi une bonne valeur énergétique avec une digestibilité tige feuille supérieure. BALBOA (100.2%) décoit en 2015 mais se comporte mieux en situation de stress hydrique. Sa valeur énergétique est supérieure et bien équilibrée. Un peu plus précoce, IDALGO (100.2%) est régulière, avec une bonne vigueur au départ et une teneur en amidon élevée. PYTAGOR (99.7%) est plus irrégulière et se comporte moins bien en situation de stress hydrique, sa valeur énergétique est moyenne. INDEXX (100.9%) a une vigueur au départ inférieure, une petite sensibilité à la verse et une faible valeur énergétique.

Plus précoce, AGRO-VITALLO (101.4% sur 2 ans) est productive aussi en situation de stress hydrique. Par contre, son comportement au champ peut décevoir avec une faible vigueur, une sensibilité à la verse à floraison et à l'helminthosporiose fusiforme. Sa valeur énergétique est inférieure.

Parmi les variétés récentes, beaucoup sont tardives et la plus productive est ES PEPPONE (103.9%), satisfaisante dans toutes les situations. Sa valeur énergétique est inférieure mais avec une digestibilité tige-feuille correcte. Sa tenue de tige et son comportement face à l'helminthosporiose sont à surveiller. Deux variétés BAMACO (101.8%) et une plus précoce, SESAME (101%), sont productives surtout dans les cas de stress hydriques. Leur valeur énergétique élevée provient de leur teneur en amidon. Elles ont toutes les deux une bonne vigueur au départ mais SESAME est un peu plus fragile en tenue de tige et sensible à l'helminthosporiose.

## GRAPHIQUE 1 : RENDEMENT ET PRECOCITE 2015 (SC)



## GRAPHIQUE 2 : EVALUATION DE LA VALEUR ENERGETIQUE 2015 (SC)

### SC Etude de la valeur énergétique des variétés de maïs fourrage du groupe Demi-précoces (SC)

Résultats 2015 de DMO non amidon et concentration en amidon




TABLEAU 2 : EVALUATION DES CARACTERISTIQUES VARIETALES ISSUES DU RESEAU ARVALIS - UFS



Institut du végétal

**MAIS FOURRAGE : Caractérissez votre variété d'un seul coup d'œil**  
Bretagne, Pays de la Loire et Normandie

Source des données : Réseau d'essais de Post-Inscription ARVALIS Institut du végétal, partenaires et UFS Section maïs

**VARIETES DEMI-PRECOCES (SC)**

| Variétés Demi-Précoce (SC)                                 | Variété                 | Représentant        | Année d'inscription | Type grain | Productivité (%)      |       |            |       |                    |       | Précoécité         |        |                     |       | Qualité fourrage (Toutes zones)        |       |   |       | UFL (%)           |       | DINAG (%) |       |         |       |           |  |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------|------------|-------|--------------------|-------|--------------------|--------|---------------------|-------|--|-------|---|-------|-------------------|-------|-----------|-------|---------|-------|-----------|--|
|  |                         |                     |                     |            | 2013                  |       | 2014       |       | 2015               |       | 2015               |        | Moy. pluri-annuelle |       | Floraison (écart moy. du regroupement) |       | % MS récolte (écart moy. du regroupement) |       | Vigueur au départ |       | Verse (%) |       | UFL (%) |       | DINAG (%) |  |
|  |                         |                     |                     |            | Rdt élevés            | Rdt   | Rdt élevés | Rdt   | Ecart type (réglé) | réglé | Ecart type (réglé) | réglé  | réglé               | réglé | réglé                                  | réglé | réglé                                     | réglé | réglé             | réglé | réglé     | réglé | réglé   | réglé |           |  |
| Témoins  | BALBOA                  | Semences de France  | 2012                | c.cd       | 101.4                 | 100.7 | 97.0       | 100.3 | 4.5                | 100.2 | -2 j               | -0.1 % | +/-                 | 8.9   | 101.3                                  | 102.2 | 100.9                                     | 100.1 | 4.2               | 100.1 | 96.0      | 97.9  |         |       |           |  |
| ES CHARTER   | Euraisi Semences        | 2010                | c.cd                | 100.7      | 97.3                  | 98.9  | 99.2       | 3.6   | 99.0               | +0 j  | +0.0 %             | +/-    | +/-                 | +/-   | 102                                    | 100.4 | 100.3                                     | 99.7  | 100.4             | 102   | 100.4     | 100.3 | 98.7    |       |           |  |
| LG3264   | LG/Linagrain Europe     | 2007                | c.cd                | 100.6      | 100.4                 | 100.0 | 101.2      | 4.3   | 100.5              | +0 j  | +0.5 %             | +/-    | +/-                 | +/-   | 15.0                                   | 101.3 | 102.9                                     | 98.7  | 101.3             | 102.9 | 101.3     | 102.9 | 98.7    |       |           |  |
| Rappel SB  | LG30275                 | LG/Linagrain Europe | 2010                | c.cd       | 101.3                 | 101.8 | 99.6       | 96.5  | 3.5                | 98.4  | -0 j               | +1.5 % | +/-                 | +/-   | +/-                                    | 13.2  | 98.8                                      | 98.4  | 100.2             | 98.8  | 13.2      | 98.8  | 98.4    | 100.2 |           |  |
| Autres   | INDEX                   | R.A.G.T. Semences   | 2011                | c.cd       | 102.4                 | 100.3 | 100.0      | 99.5  | 4.4                | 100.9 | +1 j               | -0.1 % | +/-                 | +/-   | +/-                                    | 5.8   | 99.2                                      | 100.4 | 98.7              | 99.2  | 5.8       | 99.2  | 99.2    | 100.4 |           |  |
| 3ème année   | IDALGO                  | Semences de France  | 2012                | c.cd       | 98.4                  | 102.0 | 99.5       | 97.4  | 3.1                | 99.7  | -1 j               | +0.5 % | +/-                 | +/-   | +/-                                    | 12.3  | 101.3                                     | 101.0 | 111.2             | 101.3 | 12.3      | 101.3 | 98.2    | 100.4 |           |  |
| 2ème année   | AGRO-VITALLO            | KWS Mais France     | 2013                | c.cd       | 101.9                 | 99.1  | 99.6       | 99.3  | 3.9                | 100.2 | -0 j               | +0.4 % | +/-                 | +/-   | +/-                                    | 12.3  | 99.4                                      | 98.2  | 100.4             | 99.4  | 12.3      | 99.4  | 98.2    | 100.4 |           |  |
| KWS Mais France  | DE-2013                 | c.cd                | -                   | -          | 101.0                 | 101.1 | 102.8      | 3.0   | 101.4              | -0 j  | +1.4 %             | +/-    | +/-                 | +/-   | +/-                                    | 101.5 | 103.4                                     | 106.9 | 106.9             | 101.5 | 101.5     | 101.5 | 106.9   |       |           |  |
| BAMACO   | Semences de France      | 2015                | c.cd                | -          | -                     | -     | 100.8      | 103.2 | 3.4                | 101.8 | -1 j               | +0.0 % | +/-                 | +/-   | +/-                                    | 7.5   | 101.5                                     | 103.4 | 106.9             | 101.5 | 7.5       | 101.5 | 96.3    | 95.0  |           |  |
| ES PEPPONE   | Euraisi Semences        | DE-2014             | cd                  | -          | -                     | -     | 105.4      | 101.6 | 5.1                | 103.9 | +1 j               | -0.7 % | +/-                 | +/-   | +/-                                    | 13.5  | 98.8                                      | 98.8  | 95.0              | 98.8  | 13.5      | 98.8  | 96.3    | 95.0  |           |  |
| KALORIAS   | KWS Mais France         | SK-2014             | cd                  | -          | -                     | -     | 101.5      | 97.3  | 4.9                | 99.8  | -1 j               | -1.3 % | +/-                 | +/-   | +/-                                    | 8.7   | 98.6                                      | 97.8  | 98.6              | 98.6  | 8.7       | 98.6  | 97.8    | 98.6  |           |  |
| SESAME   | Semences de France      | 2015                | c.cd                | -          | -                     | -     | 100.2      | 102.3 | 2.7                | 101.0 | +0 j               | +1.2 % | +/-                 | +/-   | +/-                                    | 12.1  | 100.6                                     | 103.0 | 105.8             | 100.6 | 12.1      | 100.6 | 103.0   | 105.8 |           |  |
| SIRIANI CS   | Caussade Semences       | IT-2014             | c.cd                | -          | -                     | -     | 98.7       | 101.0 | 4.9                | 99.6  | +2 j               | -1.1 % | +/-                 | +/-   | +/-                                    | 96.5  | 93.9                                      | 92.5  | 92.5              | 93.9  | 12.1      | 96.5  | 93.9    | 92.5  |           |  |
| SY CAMPONIA  | Syngenta France SAS     | DE-2014             | c.cd                | -          | -                     | -     | 100.6      | 98.4  | 5.1                | 99.7  | +1 j               | -0.5 % | +/-                 | +/-   | +/-                                    | 24.6  | 101.0                                     | 101.3 | 98.2              | 101.0 | 24.6      | 101.0 | 101.3   | 98.2  |           |  |
| SY MASSYTOP  | Jouffray -Drillaud Sem. | 2014                | c.cd                | -          | -                     | -     | 97.0       | 100.0 | 4.5                | 98.2  | +0 j               | -1.2 % | +/-                 | +/-   | +/-                                    | 3.7   | 101.3                                     | 102.9 | 101.2             | 101.3 | 3.7       | 101.3 | 102.9   | 101.2 |           |  |
| <b>ORIGINE DES ESSAIS 2015 - Retenus pour rdt et préc.</b> |                         |                     |                     |            | 16.1 t/ha             |       |            |       |                    |       | 17.1 t/ha          |        |                     |       |  |       | 19.0 t/ha                                 |       |                   |       |           |       |         |       |           |  |
|  |                         |                     |                     |            | 16 essais             |       |            |       |                    |       | 9 essais           |        |                     |       |  |       | 9 essais                                  |       |                   |       |           |       |         |       |           |  |
|  |                         |                     |                     |            | 100 % =               |       |            |       |                    |       | 100 % =            |        |                     |       |  |       | 10.9 %                                    |       |                   |       |           |       |         |       |           |  |
|  |                         |                     |                     |            | 16 essais             |       |            |       |                    |       | 10-juill           |        |                     |       |  |       | 33.6 % MS                                 |       |                   |       |           |       |         |       |           |  |
|  |                         |                     |                     |            | 15 essais             |       |            |       |                    |       | 15 essais          |        |                     |       |  |       | 7.0                                       |       |                   |       |           |       |         |       |           |  |
|  |                         |                     |                     |            | Rdt E                 |       |            |       |                    |       | Rdt F              |        |                     |       |  |       | Rdt E                                     |       |                   |       |           |       |         |       |           |  |
|  |                         |                     |                     |            | 2. FORESTE            |       |            |       |                    |       | 53 DENAZE          |        |                     |       |  |       | 53 MELLESSE                               |       |                   |       |           |       |         |       |           |  |
|  |                         |                     |                     |            | Rdt E                 |       |            |       |                    |       | Rdt F              |        |                     |       |  |       | 41 ST LEONARD EN BEAUC                    |       |                   |       |           |       |         |       |           |  |
|  |                         |                     |                     |            | 35 JAVEINE            |       |            |       |                    |       | Rdt F              |        |                     |       |  |       | 41 ST LEONARD EN BEAUC                    |       |                   |       |           |       |         |       |           |  |
|  |                         |                     |                     |            | 35 MELESSE            |       |            |       |                    |       | Rdt F              |        |                     |       |  |       | 49 DAIMERAY                               |       |                   |       |           |       |         |       |           |  |
|  |                         |                     |                     |            | 41 ST LEONARD         |       |            |       |                    |       | Rdt F              |        |                     |       |  |       | 49 DAIMERAY                               |       |                   |       |           |       |         |       |           |  |
|  |                         |                     |                     |            | 49 DAIMERAY           |       |            |       |                    |       | Rdt F              |        |                     |       |  |       | 53 DEVAUC                                 |       |                   |       |           |       |         |       |           |  |
|  |                         |                     |                     |            | 56 NIVILLAC           |       |            |       |                    |       | Rdt F              |        |                     |       |  |       | 53 DEVAUC                                 |       |                   |       |           |       |         |       |           |  |
|  |                         |                     |                     |            | 68 RUSTENHART         |       |            |       |                    |       | Rdt E              |        |                     |       |  |       | 68 RUSTENHART                             |       |                   |       |           |       |         |       |           |  |
|  |                         |                     |                     |            | 85 LA TARDIERE        |       |            |       |                    |       | Rdt E              |        |                     |       |  |       | 85 LA TARDIERE                            |       |                   |       |           |       |         |       |           |  |
|  |                         |                     |                     |            | 85 NAILLERS           |       |            |       |                    |       | Rdt F              |        |                     |       |  |       | 85 NAILLERS                               |       |                   |       |           |       |         |       |           |  |
|  |                         |                     |                     |            | Echelle de notation : |       |            |       |                    |       | ++                 |        |                     |       |  |       | +/-                                       |       |                   |       |           |       |         |       |           |  |
|  |                         |                     |                     |            | +                     |       |            |       |                    |       | -                  |        |                     |       |  |       | -   |       |                   |       |           |       |         |       |           |  |
|  |                         |                     |                     |            | -                     |       |            |       |                    |       | --                 |        |                     |       |  |       | --  |       |                   |       |           |       |         |       |           |  |
|  |                         |                     |                     |            | --                    |       |            |       |                    |       | X < 0.75 %         |        |                     |       |  |       | X > 0.75 %                                |       |                   |       |           |       |         |       |           |  |
|  |                         |                     |                     |            | X > 104 %             |       |            |       |                    |       | X < 104 %          |        |                     |       |  |       | X > 104 %                                 |       |                   |       |           |       |         |       |           |  |
|  |                         |                     |                     |            | 98 % < X < 101 %      |       |            |       |                    |       | 101 % < X < 104 %  |        |                     |       |  |       | 101 % < X < 104 %                         |       |                   |       |           |       |         |       |           |  |
|  |                         |                     |                     |            | 98 % < X < 99 %       |       |            |       |                    |       | 98 % < X < 99 %    |        |                     |       |  |       | 98 % < X < 99 %                           |       |                   |       |           |       |         |       |           |  |
|  |                         |                     |                     |            | X ≤ 96 %              |       |            |       |                    |       | X ≤ 96 %           |        |                     |       |  |       | X ≤ 96 %                                  |       |                   |       |           |       |         |       |           |  |
|  |                         |                     |                     |            | X ≤ 0.75              |       |            |       |                    |       | X > 0.75           |        |                     |       |  |       | X > 0.75                                  |       |                   |       |           |       |         |       |           |  |
|  |                         |                     |                     |            | X > 104 %             |       |            |       |                    |       | X < 104 %          |        |                     |       |  |       | X < 104 %                                 |       |                   |       |           |       |         |       |           |  |
|  |                         |                     |                     |            | X <                   |       |            |       |                    |       |                    |        |                     |       |  |       |   |       |                   |       |           |       |         |       |           |  |

## VARIETES GRAIN TRES PRECOCES (G10)

Pour les variétés maïs Grain Très Précoce (série G10), les besoins en somme de températures (base 6°C) entre le semis et la maturité à la récolte (35% Hum. en maïs grain) sont inférieurs à 1625°C. Cela correspond à des indices FAO entre 150 et 250 (estimation). L'objectif de peuplement pour les maïs Grain G10 est de 100000 plantes/ha. Ces variétés sont adaptées en Normandie.

Sur la série G10, 21 variétés ont été évaluées dans le réseau VPI ARVALIS-UFS 2015 dont 8 pour la première année, les variétés de référence sur la série G10 sont KONSENSUS / COLISEE / NK FALKONE / SPHINXX. 10 essais G10 constituent le regroupement Bretagne, Normandie et Nord en 2015, ils ont été récoltés en moyenne à 33,3% Humidité et produits 107,4 q/ha.

■ TABLEAU 1 : NOS PRECONISATIONS POUR 2016

| G10                  | Points forts                      | Points faibles                                    | Particularités |
|----------------------|-----------------------------------|---|----------------|
| <b>Valeurs sûres</b> |                                   |   |                |
| <b>COLISEE</b>       | Productive et régulière, mixte    | En retrait en 2015 lié à sa précocité à floraison | Début de série |
| <b>IDOLL</b>         | Régulière, Vigueur (inf en 2015)  | En retrait en 2015                                |                |
| <b>KIPARIS</b>       | Très productive, régulière        | Vigueur,<br><i>Fusarium gramininearum</i> (AS)    | Fin de série   |
| <b>Confirmées</b>    |                                   |   |                |
| <b>RAMSES</b>        | Productive, Vigueur (inf en 2015) | Helmintho. (AS)                                   |                |
| <b>A essayer</b>     |                                   |   |                |
| <b>LG 30215</b>      | Très productive, Vigueur          | Verse (un peu)                                    |                |
| <b>JUVENTO</b>       | Productive, Mixte                 |   |                |
| <b>KATARSIS</b>      | Productive                        |   |                |
| <b>KOLOSSALIS</b>    | Très productive, (Helmintho.)     |   | Fin de série   |

Les variétés témoins sont toutes inférieures aux variétés récentes. En début de série, KONSENSUS et COLISEE sont d'autant plus pénalisées par les conditions climatiques de 2015 avec leur floraison précoce arrivée bien avant le retour des pluies. Malgré cette contreperformance, COLISEE reste productive avec un rendement à 101,7 % sur 3 ans. IDOLL est également en retrait mais reste régulière à 100,7%.

Davantage en milieu de série en 2015, KIPARIS est très productive à 105,1% sur 3 ans. A surveiller sa vigueur au départ et sa sensibilité à *Fusarium graminearum* en fin de cycle.

RAMSES est la seule variété qui confirme bien ses performances avec 103,7% sur 2 ans. Tout comme IDOLL, sa bonne vigueur au départ a été observée irrégulière cette année. Sa sensibilité à l'helminthosporiose fusiforme est à surveiller. CASEY

est inférieure en 2015 et sa tenue de tige fragile à la récolte pénalise ses performances.

Sur les variétés récentes, LG30215 est très productive avec 105,4% et une précocité de milieu de groupe. Sa bonne vigueur au départ est à noter tout comme sa petite sensibilité à la verse. JUVENTO est aussi productive à 102,3% avec une meilleure tenue de tige et présente également un intérêt pour sa mixité avec des performances correctes dans la série fourrage SB en début de groupe. KATARSIS (102,9%) est productive en milieu de série tout comme KRITERES (101,2%) plus régulière mais avec une vigueur plus faible au départ. KOLOSSALIS (105,3%) est très productive mais beaucoup plus tardive. Sa bonne tolérance à l'helminthosporiose fusiforme est à confirmer.




TABLEAU 2 : EVALUATION DES CARACTERISTIQUES VARIETALES ISSUES DU RESEAU ARVALIS - UFS



Institut du végétal

**MAIS GRAIN : Caractérissez votre variété d'un seul coup d'œil**  
Bretagne, Normandie, Nord

**VARIETES TRES PRECOCES (G10)**

Source des données : Réseau d'essais de Post-Inscription ARVALIS Institut du végétal, partenaires et UFS Section maïs

Toutes les données présentées sont issues d'au moins 3 essais d'où des données indisponibles (vigueur, versée...)

| Variétés<br>Très<br>précoce<br>(G10)                       | Variété                    | Représentant       | Année<br>d'inscription               | Type grain | Productivité (%)                   |                                    |           |       |           | Précoécité | Vigueur<br>au<br>départ | Verse<br>(%) |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|-----------|------------|-------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |                            |                    |                                      |            | 2013                               |                                    | 2014      |       | 2015      |            |                         |              |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                            |                    |                                      |            | Ecart<br>type<br>(régu-<br>larité) | Ecart<br>type<br>(régu-<br>larité) | 2014      | 2015  |           |            |                         |              |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLISEE  | Semences de France         | 2011               | g f                                  | cc         | 103.7                              | 106.2                              | 95.1      | 3.4   | 101.7     | -          | -1.2 pts                | 96.3         | -         |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KONSENSUS  | KWS Maïs France            | 2008               | g f                                  | c.ccd      | 97.2                               | 98.4                               | 96.1      | 3.0   | 97.3      | -          | -1.6 pts                | 97.7         | +         |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NK FALKONE   | Syngenta France            | 2007               | g f                                  | c.ccd      | 91.8                               | 103.2                              | 94.7      | 4.7   | 97.1      | -          | 0.4 pts                 | 94.3         | +         |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPHINXX  | R.A.G.T. Semences          | 2008               | g f                                  | c.ccd      | 101.7                              | 98.9                               | 99.0      | 2.6   | 99.7      | -          | 0.2 pts                 | 98.8         | +         |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rappel G11   | MILLESIM                   | Semences de France | 2011                                 | g f        | cd                                 | -                                  | -         | 102.5 | 2.8       | -          | -                       | 1.1 pts      | 101.4     | -                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HOXXMANN   | R.A.G.T. Semences          | 2012               | g f                                  | cd         | 99.0                               | 105.9                              | 101.5     | 4.5   | 102.5     | -          | 1.0 pts                 | 100.5        | +         |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDOLL  | Semences de France         | 2012               | g f                                  | c.ccd      | 102.5                              | 101.4                              | 98.6      | 4.0   | 100.7     | -          | -0.5 pts                | 99.1         | -         |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BENETTO  | Semences de France         | 2013               | g f                                  | cc         | 102.3                              | 99.9                               | 97.0      | 3.8   | 99.6      | -          | 0.1 pts                 | 96.9         | -         |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KIPARIS  | KWS Maïs France            | 2013               | g f                                  | cc         | 105.1                              | 107.6                              | 102.3     | 2.8   | 105.1     | -          | 0.5 pts                 | 101.8        | -         |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TTTOXX   | R.A.G.T. Semences          | 2012               | g f                                  | c.ccd      | 102.6                              | 98.8                               | 97.4      | 3.1   | 99.4      | -          | -0.1 pts                | 97.6         | +         |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CASEY  | Advential/Limagrain Europe | 2014               | g                                    | c.ccd      | -                                  | 103.2                              | 99.1      | 4.9   | 101.3     | -          | -1.6 pts                | 100.7        | +         |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DKC2931  | Semences Dekab/Monsanto    | 2013               | g                                    | c.ccd      | -                                  | 99.3                               | 98.4      | 2.0   | 98.9      | -          | -0.7 pts                | 99.1         | -         |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAMSES   | Semences de France         | 2014               | g f                                  | c.ccd      | -                                  | 105.7                              | 101.5     | 3.9   | 103.7     | -          | -1.4 pts                | 103.0        | -         |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAMENTO   | Semences de France         | 2015               | g                                    | c.ccd      | -                                  | -                                  | 99.8      | 5.9   | -         | -          | 1.0 pts                 | 98.8         | +         |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUVENTO  | Semences de France         | 2014               | f g                                  | c.ccd      | -                                  | -                                  | 102.3     | 4.3   | -         | -          | -0.2 pts                | 102.6        | +         |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KATARSIS   | KWS Maïs France            | 2015               | g                                    | c.ccd      | -                                  | -                                  | 102.9     | 4.3   | -         | -          | -0.1 pts                | 103.1        | +         |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOLOSSALIS   | KWS Maïs France            | 2015               | g                                    | cc         | -                                  | -                                  | 105.3     | 2.6   | -         | -          | 1.7 pts                 | 103.5        | +         |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRITTERS   | KWS Maïs France            | 2015               | g                                    | cc         | -                                  | -                                  | 101.2     | 3.1   | -         | -          | 0.2 pts                 | 101.0        | -         |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LG30215  | LG/Limagrain Europe        | 2015               | g                                    | c.ccd      | -                                  | -                                  | 105.4     | 3.1   | -         | -          | -0.1 pts                | 105.6        | +         |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SYFANATIC  | Syngenta France            | 2014               | f g                                  | c.ccd      | -                                  | -                                  | 99.8      | 4.7   | -         | -          | 1.4 pts                 | 98.4         | ++        |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ORIGINE DES ESSAIS 2015 - Retenus pour rdt et préc.</b> |                            |                    |                                      |            |                                    |                                    |           |       |           |            |                         |              |           |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 ST QUENTIN LE PETIT                                      | g : grain / f : fourrage   |                    | 100.8 q/ha   112.4 q/ha   107.4 q/ha |            | -   -   -                          |                                    | 100 % =   |       | 10 assais |            | 100 % =                 |              | 6 assais  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 ST GABRIEL BRECY  | 8 essais                   |                    | 11 essais                            |            | 10 essais                          |                                    | 10 essais |       | 10 assais |            | 33.3 % H20              |              | 85.8 q/ha |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 LA CHEZEE   | 11 essais                  |                    | 10 essais                            |            | 10 essais                          |                                    | 10 essais |       | 10 assais |            | 7.1                     |              | 6.7%      |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 SQUIFFIEC   | 10 assais                  |                    | 10 assais                            |            | 10 assais                          |                                    | 10 assais |       | 10 assais |            | 7.1                     |              | 6.7%      |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 TREGOMEUR   | 10 assais                  |                    | 10 assais                            |            | 10 assais                          |                                    | 10 assais |       | 10 assais |            | 7.1                     |              | 6.7%      |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 LANDELEAU   | 10 assais                  |                    | 10 assais                            |            | 10 assais                          |                                    | 10 assais |       | 10 assais |            | 7.1                     |              | 6.7%      |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 NEULLIAC  | 10 assais                  |                    | 10 assais                            |            | 10 assais                          |                                    | 10 assais |       | 10 assais |            | 7.1                     |              | 6.7%      |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 SEES  | 10 assais                  |                    | 10 assais                            |            | 10 assais                          |                                    | 10 assais |       | 10 assais |            | 7.1                     |              | 6.7%      |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 VILLERS LES CAGNICOURT                                  | 10 assais                  |                    | 10 assais                            |            | 10 assais                          |                                    | 10 assais |       | 10 assais |            | 7.1                     |              | 6.7%      |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Retenus pour la moyenne des essais                       |                            |                    |                                      |            |                                    |                                    |           |       |           |            |                         |              |           | * Retenus pour la moyenne des essais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Rendement   |                            |                    |                                      |            |                                    |                                    |           |       |           |            |                         |              |           | ** Rendement                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X = Moyenne  |                            |                    |                                      |            |                                    |                                    |           |       |           |            |                         |              |           | X = Moyenne                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X > 104 %  |                            |                    |                                      |            |                                    |                                    |           |       |           |            |                         |              |           | X > 104 %                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101% ≤ X < 104 %   |                            |                    |                                      |            |                                    |                                    |           |       |           |            |                         |              |           | 101% ≤ X < 104 %                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99% ≤ X < 101 %  |                            |                    |                                      |            |                                    |                                    |           |       |           |            |                         |              |           | 99% ≤ X < 101 %                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96% ≤ X < 99%  |                            |                    |                                      |            |                                    |                                    |           |       |           |            |                         |              |           | 96% ≤ X < 99%                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X ≤ 96 %   |                            |                    |                                      |            |                                    |                                    |           |       |           |            |                         |              |           | X ≤ 96 %                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## VARIETES GRAIN PRECOCES (G11)

Pour les variétés maïs Grain Précoces (série G11), les besoins en somme de températures (base 6°C) entre le semis et la maturité à la récolte (35% Hum. en maïs grain) varient de 1630 à 1650°C. Cela correspond à des indices FAO entre 240 et 290 (estimation). L'objectif de peuplement pour les maïs Grain G11 est de 95000 plantes/ha. Ces variétés sont adaptées à l'ensemble de la Normandie, il faut veiller à ne pas les choisir sur des secteurs trop froids en cas de semis tardif.

Sur la série G11, 20 variétés ont été évaluées dans le réseau VPI ARVALIS-UFS 2014 dont 4 pour la première année, les variétés de référence sur la série G11 sont MILLESIM / KOHERENS / ADEVEY. 9 essais G11 constituent le regroupement Bretagne, Normandie et Ouest en 2015, ils ont été récoltés en moyenne à 33.5% Humidité et produits 121.5 q/ha.

■ TABLEAU 1 : NOS PRECONISATIONS POUR 2016

| G11                   | Points forts                   | Points faibles   | Particularités |
|-----------------------|--------------------------------|--|----------------|
| <b>Valeurs sûres</b>  |                                |  |                |
| <b>KANDIS</b>         | Productive et régulière, Mixte | Vigueur et verse (un peu)                              |                |
| <b>MILLESIM</b>       | Régulière, Vigueur, Mixte      | En retrait en 2015,<br><i>Fusarium graminéarum (S)</i> |                |
| <b>KROISSANS</b>      | Régulière, Vigueur, Productive | Verse (un peu)   | Fin de série   |
| <b>Confirmées</b>     |                                |  |                |
| <b>RIVALDINIO KWS</b> | Précoce et productive          | Vigueur  | Début de série |
| <b>DKC 3730</b>       | Régulier, Helmintho.           | Verse (2015)   | Fin de série   |
| <b>A essayer</b>      |                                |  |                |
| <b>FIGARO</b>         | Précoce et productive          |  | Début de série |
| <b>BELCANTO</b>       | Vigueur, Mixte                 |  | Début de série |
| <b>ACROPOLE</b>       |                                | (Surveiller tenue tige)                                |                |
| <b>ES CREATIVE</b>    |                                | Irrégulière, Vigueur                                   |                |
| <b>KONFLUENS</b>      |                                |  |                |
| <b>KROQUIS</b>        | Vigueur, Mixte                 | Tardive  | Fin de série   |

Les variétés témoins sont toutes inférieures aux variétés récentes. Cette année, les performances des variétés ayant fleuries précocement sont davantage impactées compte tenu du retour des pluies fin juillet dans l'Ouest. KOHERENS et KONKORDANS affichent ainsi des performances inférieures. Egalement dans ce cas, MILLESIM est nettement en retrait en 2015 mais son rendement sur 3 ans est de 100,3%. Avec une bonne vigueur au départ, sa sensibilité à *Fusarium graminearum* doit être surveillée, ses performances en fourrage en font une bonne variété mixte.

Avec une vigueur moyenne mais précoce à floraison, KANDIS est très régulière avec 99,6% sur 3 ans. Etre vigilant sur sa petite sensibilité à la verse.

Le comportement de KROISSANS avec une floraison précoce a quelque peu été modifié en 2015 avec une humidité à la récolte en milieu de série. Ses performances sont légèrement en retrait mais restent très bonnes à 101,7% sur 3 ans. Avec une bonne vigueur au départ, sa tenue de tige peut être un peu fragile.

Parmi les variétés en 2<sup>ème</sup> année, RIVALDINIO confirment ses bons rendements avec 101,6% sur 2


ans. En début de série à maturité, sa vigueur au départ est un peu faible. Plus tardive, DKC 3730 est régulière avec 101,5% sur 2 ans. Sa vigueur au départ est meilleure cette année mais un peu de verse a été observée en 2015.

Dans les variétés récentes, nombreuses sont plus productives.

Parmi les plus précoces, FIGARO à 102,1%, avec une bonne tenue de tige mais une vigueur au départ un peu faible et BELCANTO à 101,1% avec une bonne vigueur au départ mais des performances inférieures en valeur énergétique pour la production de maïs fourrage.

En milieu de série, ACROPOLE (104,9%) et KONFLUENS (102,9%) sont productives. Plus irrégulière et avec une vigueur inférieure, ES CREATIVE (101,0%) est plus productive en région centre (105,3%).

En toute fin de série, KROQUIS (106,7%) est très performante. En production de maïs fourrage sa valeur énergétique est inférieure. DKC3939 (102,8%) est intéressante avec une bonne tenue de tige mais une faible vigueur au départ.



## MAIS GRAIN : Caractérissez votre variété d'un seul coup d'œil

### Bretagne, Normandie et Ouest

Source des données : Réseau d'essais de Post-Inscription ARVALIS Institut du végétal, partenaires et UFS Section maïs

## VARIETES PRECOCES (G11)



g : grain / f : fourrage

Moyenne du regroupement

100 % =

108.8 q/ha

122.9 q/ha

121.5 q/ha

-

9 essais


9 essais

9 essais

9 essais

TABLEAU 2 : EVALUATION DES CARACTERISTIQUES VARIETALES ISSUES DU RESEAU ARVALIS - UFS

| Variétés<br>Précoce<br>(G11)                        | Variété        | Réprésentant              | Année<br>Inscription | Type grain | 2013                     | 2014  | 2015  | Productivité (%)      | 2015                            |                            |  | Vigueur<br>au<br>départ | Verse<br>(%) |     |
|---|----------------|---------------------------|----------------------|------------|--------------------------|-------|-------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|--------------|-----|
|   |                |                           |                      |            |                          |       |       |                       | Écart<br>type<br>(regroupement) | Moy.<br>pluri-<br>annuelle | Floraison<br>(écart moy.<br>du regroupement) | 1.2 pts                 | 96.8         | +   |
| Témoins   | ADEVVEY        | Advental/Limagrain Europe | 2011                 | g          | cd                       | 100.4 | 101.4 | 98.0                  | 4.5                             | 99.8                       | +1 j   | -0.9 pts                | 95.4         | +   |
|   | KOHERENS       | KWS Maïs France           | 2008                 | gf         | cd                       | 97.7  | 98.6  | 94.5                  | 4.3                             | 96.8                       | -3 j   | -1.7 pts                | 98.6         | +   |
|   | MILLESIM       | Semences de France        | 2011                 | g f        | cd                       | 102.6 | 102.0 | 97.0                  | 4.8                             | 100.3                      | -3 j   | -2.2 pts                | 97.5         | +-  |
| Rappel G12  | PR38N86 (1)    | Pioneer Semences          | AT-2007              | c g        | d                        | -     | -     | 99.8                  | 4.5                             | -                          | +1 j   | -0.4 pts                | 98.6         | +-  |
| Autres  | KANDIS         | KWS Maïs France           | 2010                 | f g        | cd                       | 100.1 | 100.7 | 98.2                  | 5.2                             | 99.6                       | -2 j   | -1.1 pts                | 97.1         | ++  |
|   | KONKORDANS     | KWS Maïs France           | 2012                 | g          | cd                       | 100.9 | 98.8  | 96.1                  | 3.2                             | 98.4                       | -3 j   | -0.2 pts                | 100.4        | +   |
|   | KROISSANS      | KWS Maïs France           | 2013                 | g f        | cd                       | 102.6 | 102.6 | 100.2                 | 3.6                             | 101.7                      | -1 j   | -0.2 pts                | 97.5         | ++  |
|   | LINDSEY        | Advental/Limagrain Europe | 2011                 | g          | cc                       | -     | 100.3 | 97.7                  | 3.0                             | 98.9                       | -1 j   | -0.7 pts                | 100.0        | ++  |
|   | DKC3730        | Semences Dekalb/Monsanto  | HU-2012              | c g        | d                        | -     | 102.3 | 100.8                 | 2.8                             | 101.5                      | +2 j   | 0.7 pts                 | 98.9         | 7.6 |
| 2ème année  | MAS 297        | Maïsadour Semences        | 2013                 | g g        | d                        | -     | 101.5 | 99.5                  | 4.6                             | 100.4                      | +3 j   | 0.6 pts                 | 101.9        | -   |
|   | RIVALDINO KWS  | KWS Maïs France           | DE-2013              | c gf       | cd                       | -     | 102.3 | 100.9                 | 3.2                             | 101.6                      | +0 j   | -1.0 pts                | 101.9        | --  |
|   | ACROPOLE       | Semences de France        | 2015                 | g          | cd                       | -     | -     | 104.9                 | 3.2                             | -                          | +1 j   | 0.5 pts                 | 104.3        | +-  |
|   | BELCANTO       | Semences de France        | 2014                 | f g        | cc                       | -     | -     | 101.1                 | 3.4                             | -                          | -2 j   | -0.8 pts                | 101.9        | ++  |
|   | DKC3350        | Semences Dekalb/Monsanto  | 2015                 | g          | cd                       | -     | -     | 100.3                 | 3.1                             | -                          | +2 j   | 0.1 pts                 | 100.2        | --  |
|   | DKC3440        | Semences Dekalb/Monsanto  | IT-2014              | c g        | cd                       | -     | -     | 97.4                  | 4.1                             | -                          | -2 j   | -0.7 pts                | 98.1         | -   |
|   | DKC3939        | Semences Dekalb/Monsanto  | IT-2014              | c g        | cd                       | -     | -     | 102.8                 | 3.7                             | -                          | +2 j   | 1.6 pts                 | 101.1        | --  |
| 1ère année  | ES CREATIVE    | Euralis Semences          | 2015                 | g          | cd                       | -     | -     | 101.0                 | 4.8                             | -                          | +3 j   | -0.1 pts                | 101.0        | --  |
|   | ES METRONOM    | Euralis Semences          | 2015                 | g          | cc                       | -     | -     | 100.1                 | 3.2                             | -                          | -1 j   | -0.9 pts                | 101.0        | +   |
|   | FIGARO         | Semences de France        | 2015                 | g          | cd                       | -     | -     | 102.1                 | 3.8                             | -                          | +1 j   | -1.4 pts                | 103.5        | -   |
|   | KONFLUENS      | KWS Maïs France           | 2015                 | g          | cd                       | -     | -     | 102.9                 | 3.5                             | -                          | +0 j   | -0.1 pts                | 103.0        | +   |
|   | KROQUIS        | KWS Maïs France           | 2014                 | f g        | cd                       | -     | -     | 106.7                 | 1.8                             | -                          | +0 j   | 1.6 pts                 | 104.9        | +   |
|   | R.G.T. PLANOOX | R.G.T. Semences           | 2015                 | g          | cd                       | -     | -     | 97.9                  | 2.6                             | -                          | +2 j   | -0.4 pts                | 98.2         | -   |
| ORIGINE DES ESSAIS 2015 - Retenus pour rdt et préc. |                | Moyenne du regroupement   |                      |            | g : grain / f : fourrage |       |       | 100 % =               |                                 |                            | 9 essais                                     |                         |              |     |
| 14 ST GABRIEL BRECY                                 |                | 108.8 q/ha                |                      |            | 122.9 q/ha               |       |       | 121.5 q/ha            |                                 |                            | 9 essais                                     |                         |              |     |
| 22 TRÉGOMEUR  |                | -                         |                      |            | -                        |       |       | -                     |                                 |                            | 9 essais                                     |                         |              |     |
| 29 MELGIVEN   |                | 7 essais                  |                      |            | 8 essais                 |       |       | 9 essais              |                                 |                            | 9 essais                                     |                         |              |     |
| 35 LUTRE  |                | Rendement                 |                      |            | %                        |       |       | 13 juil               |                                 |                            | 90 % =                                       |                         |              |     |
| 35 PACE   |                | Moyenne                   |                      |            | 33.5 % H20               |       |       | 96.9 tha              |                                 |                            | 6.2  |                         |              |     |
| 35 ST GILLES  |                | %                         |                      |            | 9 essais                 |       |       | 9 essais              |                                 |                            | 3.5 %  |                         |              |     |
| 53 ARON   |                | Vigueur                   |                      |            | X = Moyenne              |       |       | *                     |                                 |                            | %  |                         |              |     |
| 56 BIGNAN   |                | X > 0.75 %                |                      |            | Retenus                  |       |       | Retenus               |                                 |                            | %  |                         |              |     |
| 56 LOCMARIA GRAND CHAMP                             |                | 0.25 < X < 0.75 %         |                      |            | 56 BIGNAN                |       |       | 56 BIGNAN             |                                 |                            | < 2.5 %                                      |                         |              |     |
|   |                | 0.25 < X < 0.75 %         |                      |            | 28 GOUILLONS             |       |       | 28 GOUILLONS          |                                 |                            | 2.5 % < X < 5 %                              |                         |              |     |
|   |                | 0.25 < X < 0.75 %         |                      |            | 28 RECLAINVILLE          |       |       | 28 RECLAINVILLE       |                                 |                            | 5 % < X < 7.5 %                              |                         |              |     |
|   |                | 0.25 < X < 0.75 %         |                      |            | 60 ST VAAST LES MELLO    |       |       | 60 ST VAAST LES MELLO |                                 |                            | > 7.5 %                                      |                         |              |     |
|   |                | 0.25 < X < 0.75 %         |                      |            | 80 DOMART SUR LA LUCE    |       |       | 80 DOMART SUR LA LUCE |                                 |                            | > 10 %                                       |                         |              |     |
|   |                | X < -0.75 %               |                      |            | X < -0.75 %              |       |       | X < -0.75 %           |                                 |                            | 10 % < X                                     |                         |              |     |
|   |                | X < -0.75 %               |                      |            | X < -0.75 %              |       |       | X < -0.75 %           |                                 |                            | X < -0.75 %                                  |                         |              |     |



Échelle de Rendement

7 essais

8 essais

9 essais

10 essais

11 essais

12 essais

13 essais

14 essais

15 essais

16 essais

17 essais

18 essais

19 essais

20 essais

21 essais

22 essais

23 essais

24 essais

25 essais

26 essais

27 essais

28 essais

29 essais

30 essais

31 essais

32 essais

33 essais

34 essais

35 essais

36 essais

37 essais

38 essais

39 essais

40 essais

41 essais

42 essais

43 essais

44 essais

45 essais

46 essais

47 essais

48 essais

49 essais

50 essais

51 essais

52 essais

53 essais

54 essais

55 essais

56 essais

57 essais

58 essais

59 essais

60 essais

61 essais

62 essais

63 essais

64 essais

65 essais

66 essais

67 essais

68 essais

69 essais

70 essais

71 essais

72 essais

73 essais

74 essais

75 essais

76 essais

77 essais

78 essais

79 essais

80 essais

81 essais

82 essais

83 essais

84 essais

85 essais

86 essais

87 essais

88 essais

89 essais

90 essais

91 essais

92 essais

93 essais

94 essais

95 essais

96 essais

97 essais

98 essais

99 essais

100 essais

101 essais

102 essais

103 essais

104 essais

105 essais

106 essais

## **DESHERBAGE : NOS RESULTATS ET NOS RECOMMANDATIONS**

# RESEAU D'ESSAIS DESHERBAGE MAÏS OUEST 2015

## PARTENAIRES ET SITES D'ESSAIS

### Chambres d'Agricultures de Bretagne :

- Côtes-d'Armor : Sylvain Le Floch et Pauline Courtey, essai à Pabu
- Finistère : Olivier Laborde-Debat et Anne-Thérèse Bilcot, essai à Cast
- Ille-et-Vilaine : Michel Falchier (CRAB) et Emmanuel Maillet, essai à Argentré du Plessis


### ARVALIS Institut du végétal :

- Dominique Millet + équipe Bignan, essai à Buléon (56)
  - Jérôme Gorichon + équipe Rots, essai à St Romphaire (50)
  - Albert Moineau + équipe La Jaillière, essai à Belligné (44)
- Coordination du réseau et synthèse réalisée par Arvalis : Michel Moquet



### Localisation des essais du réseau 2015

6 essais en zone de polyculture – élevage



## PROTOCOLE :

**Objectifs :** intérêt des programmes de post-précoce avec dose réduite d'herbicide à action racinaire

**Flore recherchée :** dominante dicotylédones. Objectif dicots difficiles : R. oiseaux et R. liseron, mercuriale, arroche, et véronique de perse, linaire, fumeterre...

### ■ Protocole d'applications sur le réseau d'essais 2015

| N°                        | PRE LEVEE (T) | POST LEVEE PRECOCE (T1) | POST LEVEE (T2) | POST-LEVEE RATTRAPAGE (T3)<br>sur 1/2 parcelle | g/ha chloro-acétamide | Prix indicatif € par ha   | IFT |
|---------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------------|---|-----|
| stade maïs                |               | 2-3 feuilles            | 4-5 feuilles    | 5 - 6 feuilles                                 |                       | <i>hors rattrapage<br/>(Elumis 0.4+Cadeli 0.3<br/>= 28€ et 0.5 IFT)</i> |     |
| stade adventices          |               | 1 à 3 feuilles          | 3 à 4 feuilles  | T1 + 10 à 15 j                                 |                       |   |     |
| <b>prélevée</b>           |               |                         |                 |  |                       |   |     |
| 1                         | Adengo 1.5    |                         |                 |  | 504                   | 63  | 1.3 |
|                           | Isard 0.7     |                         |                 |  |                       |   |     |
| 2                         | Adengo 1.5    |                         |                 |  | 0                     | 70  | 1.3 |
|                           | Atic Aqua 1.5 |                         |                 |  |                       |   |     |
| <b>post-levée précoce</b> |               |                         |                 |  |                       |   |     |
| 3                         |               | Camix 2.5               |                 |  | 1000                  | 49  | 0.9 |
|                           |               | Pampa* 0.3              |                 |  |                       |   |     |
| 4                         |               | Adengo 1.5              |                 |  | 504                   | 63  | 1.3 |
|                           |               | Isard 0.7               |                 |  |                       |   |     |
| 5                         |               | Monsoon Active 1.0      |                 |  | 504                   | 54  | 1.2 |
|                           |               | Isard 0.7               |                 |  |                       |   |     |
| 6                         |               | Elumis 0.75             |                 |  | 504                   | 53  | 1.0 |
|                           |               | Isard 0.7               |                 |  |                       |   |     |
| <b>post-levée</b>         |               |                         |                 |  |                       |   |     |
| 7**                       |               |                         | Elumis 0.75     |  | 0                     | 46  | 0.7 |
|                           |               |                         | Cadeli 0.3      |  |                       |   |     |

\* Modalité 3 : Pampa ou autre nicosulfuron 40 g/l SC

\*\* Modalité 7 : à faire en même temps que les modalités 3 à 6 si traitement à 3 feuilles des adventices

\*\*\* Programme de rattrapage : à adapter à la situation (espèces d' adventices présentes et densités)

### ■ Caractéristiques des produits utilisés

|                | Prix indicatif €/L ou kg | dose AMM L ou kg/ha | Composition   |
|----------------|--------------------------|---------------------|---|
| ADENGO         | 31.5                     | 2                   | isoxaflutole 50 g/l + thiencarbazone -méthyl 20 g/l + cyprosulfamide 33 g/l   |
| ATIC AQUA      | 15                       | 2.6                 | pendiméthaline 455 g/l  |
| CADELI         | 27                       | 1.5                 | bromoxynil octanoate 225 g/l  |
| CAMIX          | 17                       | 3.75                | s-métolachlore 400 g/l + mésotrione 40 g/l + bénoxacor 20 g/l                 |
| ELUMIS         | 50                       | 1.5                 | mésotrione 75 g/l + nicosulfuron 30 g/l                                       |
| ISARD          | 22                       | 1.4                 | diméthénamid-P 720 g/l  |
| MONSOON Active | 39                       | 1.5                 | foramsulfuron 31.5 g/l + thiencarbazone-méthyl 10 g/l + cyprosulfamide 15 g/l |
| PAMPA          | 23                       | 1.5                 | nicosulfuron 40 g/l   |

# CONDITIONS DE REALISATION

## ■ Descriptif des parcelles d'essais

| Site                                 | Buléon   | St Romphaire   | Belligné  | Argentré du Plessis   | Pabu  | Cast   |
|--------------------------------------|--|--|---|---|---|--|
|                                      | 56   | 50   | 44  | 35  | 22  | 29   |
| réalisateur                          | Arvalis  | Arvalis  | Arvalis   | CRAB  | CRAB  | CRAB   |
| station météo                        | 5695<br>Bignan   | 5056<br>Condé s/Vire   | 4499<br>La Jaillière  | 3508<br>Vitré   | 2280<br>Louargat                              | 2951<br>St Ségal   |
| Sol                                  | limon sur schiste  | limon sur schiste  | limon sur schiste   | limon sur schiste   | Limon   | limon argileux/schiste   |
| Travail sol                          | labour   | labour   | TSL   | TSL   | TSL   | labour   |
| Précédent                            | maïs grain   | maïs fourrage  | blé   | blé   | maïs grain                                    | blé  |
| Date semis                           | 22/04/2015   | 13/05/2015   | 21/04/2015  | 25/04/2015  | 27/05/2015                                    | 13/05/2015   |
| Variété                              | A 277  | Konnectio  | Juliett   |   | Klamas  | LG 30248   |
| Flore adventice (nb/m <sup>2</sup> ) | véronique de Perse (128), renouée liseron (52), chénopode polysperme (50), stellaire (21), renouée persicaire (17), morelle (14), chénopode blanc (11), renouée ois.... (total > 17 espèces) | mercuriale (30), renouée liseron (8), chénopode blanc (5), fumeterre (5), RG (25), sétaire glauque | renouée oiseaux (61), mercuriale (42), chénopode blanc (35), renouée liseron (11), véronique de Perse (5) | véronique de Perse (137), pensée (11), renouée oiseaux, géranium, fumeterre, gaillet, stellaire, chénopode blanc, morelle, lychnis,... (total 21 espèces) | véronique de Perse, chénopode blanc (20 à 50) | pensée (>5), renouée liseron (>5), aroche (>5), repousses colza, chénopode polysperme, véronique de Perse, shéardie, fumeterre,... |

### Conditions de réalisation :

Globalement, de bonnes conditions d'interventions avec des traitements réalisés sur adventices jeunes et bonnes conditions climatiques (températures, hygrométrie). Sauf pour l'application de post-levée précoce à Pabu (22) le 15 juin, qui n'a pas bénéficié d'une humidité suffisante (seulement 2 mm de pluie dans les 10 jours).

Volume de pulvérisation compris entre 120 l/ha et 220 l/ha selon les sites.


L'essai de Cast (29) n'a pas été retenu dans la synthèse (problèmes de pulvérisation).

### Notations :

Notation avant rattrapage entre T1 + 20 jours et T1 + 30 jours, notation finale entre T3 + 28 jours et T3 + 36 jours. Tous les essais n'ont pas fait l'objet d'une notation par adventice.


# RESULTATS D'EFFICACITE

## ■ Note d'efficacité globale avant rattrapage



Sur flore dicots complexe, tous les programmes (prélevée ou post-précoce) nécessitent un rattrapage. Il manque un complément anti-dicots au programme Camix + Milagro.

## ■ Note d'efficacité globale et finale, après rattrapage




Après rattrapage (Elumis 0.4 à 0.5 + Cadéli 0.3 à 0.5), l'efficacité reste moyenne (entre 7 et 8), note moyenne sur 4 essais.

Les programmes les plus performants sont : Adengo 1.5 + Isard 0.7 (un peu mieux en prélevée) et Elumis 0.75 + Cadéli 0.3 en post levée.


## Efficacité avant rattrapage, notations par adventice

### ■ Note d'efficacité sur véronique perse et renouée des oiseaux




**Véronique de Persé** (1 site très infesté) et **renouée des oiseaux** (1 site): avantage aux solutions de prélevée. Adengo + Isard a également une bonne efficacité sur renouée des oiseaux en post levée précoce.

### ■ Note d'efficacité sur mercuriale, renouée liseron et fumeterre



**Renouée liseron** (3 sites), **mercuriale** (2 sites) et **fumeterre** (1 site) : les programmes de prélevée ne sont pas efficaces. Les programmes de post levée sont plus performants, mais nécessitent un rattrapage.



**Ray-Grass (1 site):** efficacité juste correcte en 1 passage avec Adengo + Isard (en prélevée ou post levée). Dans cette situation, le rattrapage avec Elumis 0.4 permet d'obtenir un niveau d'efficacité acceptable sur toutes les modalités.

# UNE STRATEGIE A PRIORI A ADAPTER AU CONTEXTE DE L'ANNEE

## Choisir une stratégie en fonction de la flore attendue

Pour choisir à priori la stratégie de désherbage à mettre en œuvre, la première question à se poser est le type de flore attendu sur la parcelle. Le temps disponible pour intervenir en fonction des autres travaux à effectuer sur l'exploitation à cette période est également à intégrer dans le choix. Dans tous les cas, positionner les interventions sur adventices non levées ou à des stades très jeunes. Cette précaution assure un désherbage efficace et l'absence de concurrence sur la culture donc de pénalisation du rendement.

Dans un objectif de gestion durable du désherbage et de prévention des résistances aux herbicides on veillera à diversifier et alterner les modes d'actions des produits utilisés. Cette règle est valable à l'échelle annuelle sur les programmes mis en œuvre sur maïs, ainsi qu'à l'échelle de la rotation des cultures sur une parcelle donnée. Sur maïs, des possibilités existent en combinant les produits à action racinaire et les produits foliaires issus de différentes familles chimiques. Les programmes n'utilisant que des herbicides inhibiteurs d'ALS (nicosulfuron, tritosulfuron, prosulfuron ...), mode d'action parmi les plus exposés au phénomène de résistances, sont à proscrire.

### - La post-levée si la flore dicotylédone est dominante :

En flore simple, à dominante dicotylédones, un désherbage de post-levée en un ou 2 passages selon le niveau de salissement est le meilleur compromis technico-économique.

En présence de dicotylédones dites « difficiles » - renouées des oiseaux, mercuriales ... - la post-levée est également recommandée en choisissant les produits les plus performants vis-à-vis de ces adventices.

### - La pré-levée en présence de graminées et/ou de véroniques.

### - La pré-levée ou la post-levée très-précoce (associant produits foliaires et racinaires) rattrapées en présence de graminées.


Dans ces deux derniers cas, un rattrapage de post-levée, piloté en fonction des relevées est bien souvent nécessaire.

## Adapter les interventions selon les conditions climatiques de la campagne

Cette stratégie « à priori » sera à adapter ensuite aux conditions de l'année. Ainsi, la réussite de la pré-levée ou de la post-levée très précoce associant modes d'action racinaires et foliaires, est conditionnée par une bonne humidité du sol au moment de l'application. Il

faudra renoncer à ces interventions si le sol est trop sec à la période où elles doivent être réalisées et opter alors pour l'application de produits foliaires en post-levée du maïs.

### Différentes possibilités de positionnement des désherbages sur maïs : on choisira la plus adaptée à la flore des parcelles, aux conditions climatiques de l'année et au temps disponible pour intervenir



## Les stratégies à double passage restent les plus sécurisantes et les plus régulières pour une bonne maîtrise de la flore adventice

La stratégie de **pré-levée**, en application en plein, relayée par une intervention de **post – levée** est à privilégier dans les situations de **flore graminée dominante** ou de flore mixte, graminées + dicotylédones lorsque la densité d'adventice attendue est élevée.

La post-levée très précoce à base de produits racinaires et foliaires relayée par une post-levée pour maîtriser les relevées tardives est une alternative à cette stratégie « pré + post ». Elle est toutefois délicate à mettre en œuvre car la fenêtre de positionnement est très étroite : il faut intervenir sur adventices très jeunes (1 à 2 feuilles

maximum) pour bénéficier de l'ensemble des potentialités de l'association de produits.

La stratégie de **double post-levée** est adaptée aux **flores dicotylédones ou à faible pression graminées**.

Dans tous les cas de figure, le rattrapage de post-levée peut être réalisé soit par désherbage chimique, soit par binage(s). Les stratégies « combinées », associant intervention chimique et binage(s) procurent des niveaux d'efficacité et de sélectivité proches des stratégies « tout chimique » dans la mesure où les facteurs de réussite du binage sont réunis (voir tableau ci-après).

### Facteurs de réussite des stratégies combinées, désherbage chimique puis binage

|            |   |
|------------|---|
| FLORE      | - absence de vivaces,<br>- levées groupées, pas de levées tardives (attention aux préparations motteuses)<br>- intervention sur adventices jeunes |
| SOL        | - état de surface affiné, absence d'éléments grossiers en surface,<br>- terre s'émiétant facilement pour permettre le buttage du rang             |
| METEO      | - absence ou faibles pluies suite au binage pour éviter les rattrapages   |
| CULTURE    | - maïs « poussant », fermeture rapide du couvert  |
| REACTIVITE | - renouveler le binage si relevées durant la période de sensibilité de la culture (avant fermeture du couvert végétal : levée à 8 feuilles)       |

## NOS RECOMMANDATIONS REGIONALES

- ⇒ LES PRODUITS CITES DANS LES PAGES SUIVANTES NE SONT PAS EXCLUSIFS ET LES COMBINAISONS PROPOSEES NON EXHAUSTIVES.
- ⇒ ALTERNER LES SUBSTANCES ACTIVES POUR DIVERSIFIER LES MODES D'ACTION AFIN DE PREVENIR L'APPARITION D'ADVENTICES RESISTANTES
- ⇒ APPLIQUER EXCLUSIVEMENT DES MELANGES AUTORISES, consultables sur le site arvalis-infos.fr.

### Flore dominante :

#### DICOTYLEDONES CLASSIQUES (chénopodes, morelle, amarantes ...), PAS OU PEU DE GRAMINEES :

##### ► privilégier une stratégie de double post - levée

NB : cette situation est de moins en moins fréquente dans notre région. Les flores dicotylédones sont souvent composées d'adventices plus difficiles.

Intervenir sur des dicotylédones jeunes (3-4 paires de feuilles maximum).

| POST LEVEE à 2-3 feuilles du maïs (T2) ; 1-2 feuille des adventices | coût indicatif<br>1er passage<br>€ / ha | POST-LEVEE à 4-6 feuilles du maïs (T3) | coût indicatif<br>rattrapage<br>€ / ha            |    | coût indicatif<br>totalité du<br>programme<br>€ / ha |
|---|---|--|---|----|--|
|   |   |  | ou  | ou |  |
| - CALLISTO 0.3 à 0.5 l + nicosulfuron 12 à 20 g                     | ou                                      | 17-25 €                                | - CALLISTO 0.3 à 0.4 l + (nicosulfuron 12 g)      | ou | 12 à 22 €  |
| - ELUMIS 0.5 à 0.7 l  | ou                                      | 25-35 €                                | - ELUMIS 0.5 l                                    | ou | 25 €   |
| - SOUVERAIN 0.75 à 1 L  | ou                                      | 25-35 €                                | - SOUVERAIN 0.5 à 0.75 l                          | ou | 20 à 25 €  |
| - AUXO 0.5 à 0.75 l + huile + nicosulfuron 12 à 20 g                | ou                                      | 30-42 €                                | - AUXO 0.5 l + huile + (nicosulfuron 12 g)        | ou | 23 à 30 €  |
| - LAUDIS WG 0,15 à 0.25 kg + nicosulfuron 12 à 16 g + huile 1 l     | ou                                      | 25-35 €                                | - LAUDIS WG 0,15 kg + huile (+ nicosulfuron 12 g) | ou | 18 à 25 €  |
|   |   |  | - binage(s) (Stade limite passage tracteur)       |    | 40 à 70 €  |

La dose pivot de tricétone - sulfonylurée est à adapter au stade des adventices le jour de l'intervention et aux conditions climatiques.

#### DICOTYLEDONES DIFFICILES (renouées; mercuriales ...), PEU DE GRAMINEES :

##### ► privilégier une stratégie de double post – levée renforcée

Intervenir sur des dicotylédones jeunes (3-4 paires de feuilles maximum) ; Cette stratégie n'est pas adaptée en présence de véronique.

| POST LEVEE à 2-3 feuilles du maïs (T2) ; 1-2 feuille des adventices               | coût indicatif<br>1er passage<br>€ / ha | POST-LEVEE à 4-6 feuilles du maïs (T3) | coût<br>rattrapage<br>€ / ha   |    | coût indicatif<br>totalité du<br>programme<br>€ / ha |
|---|---|--|--|----|--|
|   |   |  | ou   | ou |  |
| - CALLISTO 0.3 à 0.5 l + nicosulfuron 12 à 20 g + PEAK 6 à 15 g                   | ou                                      | 27-40 €                                | - CALLISTO 0.3 à 0.4 L + nicosulfuron 12 à 16 g +PEAK 6 g                    | ou |  |
| - ELUMIS 0.5 à 0.7 l + PEAK 6 à 15 g  | ou                                      | 30-50 €                                | - ELUMIS 0.5 à 0.6 l + PEAK 6 g  | ou |  |
| - SOUVERAIN 0.75 à 1 l + PEAK 6 à 15 g  | ou                                      | 30-50 €                                | - SOUVERAIN 0.5 à 0.75 l + PEAK 6 g  | ou |  |
| - CALLISTO 0.3 à 0.5 l + nicosulfuron 12 à 20 g + BIATHLON 35 à 50 g + DASH 0.5 l | ou                                      | 33-45 €                                | - CALLISTO 0.3 à 0.4 l + nicosulfuron 12 à 16 g + BIATHLON 35 g + DASH 0.5 l | ou |  |
| - CALLISTO 0.3 à 0.5 l + nicosulfuron 12 à 20 g + RAJAH 0.5 l                     | ou                                      | 31-38 €                                | - CALLISTO 0.3 à 0.4 l + nicosulfuron 12 à 16 g + RAJAH 0.5 l                | ou |  |
| - AUXO 0.75 l + nicosulfuron 12 à 20 g + adjuvant                                 | ou                                      | 44-46 €                                | - AUXO 0.5 à 0.75 l + nicosulfuron 12 à 16 g + adjuvant                      | ou |  |
| - LAUDIS WG 0,15 à 0.25 kg + nicosulfuron 12 à 20 g + huile 1 l + PEAK 6 à 15 g   | ou                                      | 35-45 €                                | - LAUDIS WG 0,15 kg + nicosulfuron 12 à 16 g + Actirob 1 l + PEAK 6 à 10 g   | ou |  |
| - MONSOON 0.75 + CALLISTO 0.3   | ou                                      | 43 €                                   | - MONSOON 0.5 + CALLISTO 0.3 L   | ou |  |
|   |   |  | - binage(s) (Stade limite passage tracteur)                                  |    | 25 à 45 € 50 à 95 €                                  |

## GRAMINEES et DICOTYLEDONES :

### ► privilégier une stratégie de pré - levée + post - levée

Cette stratégie sera également recommandée en cas de forte pression en véronique.

En cas de forte pression graminées, privilégier les doses les plus fortes et les programmes contenant du S-métolachlore.

| PRE - LEVEE  | coût indicatif<br>1er passage<br>€ / ha                             | POST - LEVEE 4 à 6 feuilles du maïs   | coût indicatif<br>totalité du<br>programme<br>€ / ha |
|--|---|---|--|
| - DUAL GOLD 1.6 à 2.1 l (si forte pression séaires)<br>ou<br>- ISARD 1.2 à 1.4 l   | 34 à 66 €   |   |  |
| (+ anti- dicotylédones de complément : ATIC AQUA 1.75 l ou PROWL 400 2.5 l ou MERLIN FLEXX 1.4 à 1.7 l)  |   |   |  |
| - CAMIX 2.5 à 3.75 l<br>ou<br>- DAKOTA-P 3 à 4 l<br>ou<br>- ADENGO 1.5 l + DUAL GOLD 1.2 l (à privilégier en forte pression graminées)<br>- ADENGO 1.5 l + ISARD 0.8 l<br>ou<br>- ADENGO 1.5 l + ATIC AQUA 1.8 à 2 l (flore graminée modérée et véronique)<br>- ADENGO 2 l | 31 à 56 €<br>35 à 53 €<br>36 à 48 €<br>57 €<br>65 €<br>64 €<br>63 € | - rattrapage à calibrer selon le type de flore dicotylédone et les relevées de graminées (voir ci-dessus).<br><br>- En cas de forte pression graminées, la dose de nicosulfuron sera de 20g/ha minimum. | 25 à 45 €<br><b>55 à 110 €</b>                       |
|  | puis  |   |  |

### ► post-levée très précoce + rattrapage

Si les conditions ne sont pas optimales pour la pré-levée, opter pour des produits pouvant être appliqués en post-levée précoce du maïs (stade 2-3 feuilles), sur adventices tout juste levées ou non encore levées. L'application de post-levée très précoce combine des produits à spectre anti-graminées et anti-dicotes à action racinaire et foliaire.

Cette stratégie a tout son intérêt sur les semis très précoce (fin mars - début avril), pour gagner en persistance par rapport à un programme à base de pré-levée. Attention, un rattrapage est souvent nécessaire. Attention, comme la pré-levée, cette stratégie nécessite de réaliser la 1<sup>ère</sup> intervention sur sol frais et avec une pluviométrie suffisante post-application.

| POST-LEVEE PRECOCE 2-3 feuilles du maïs   | coût indicatif<br>1er passage<br>€ / ha | POST - LEVEE 5-6 feuilles du maïs   | coût indicatif<br>totalité du<br>programme<br>€ / ha |
|---|---|---|--|
| - ADENGO 1.5 l + PAMPA 0.3 l *  | 55 €                                    |   |  |
| - CAMIX 2.5 à 3 l + nicosulfuron 12 g + PEAK 10 g                                     | 55-65 €                                 | - rattrapage à calibrer selon le type de flore dicotylédone et les relevées de graminées (voir ci-dessus).<br><br>- En cas de forte pression graminées, la dose de nicosulfuron sera de 20g/ha minimum. | 25 à 45 €<br><b>70 à 110 €</b>                       |
| - ADENGO 1.5 l + ISARD 0.8 l  | 65 €                                    |   |  |
| - ADENGO 1.5 l + DUAL GOLD 1.2 l (à privilégier en forte pression séaires)            | 75 €                                    |   |  |
| - MONSOON 1 + ISARD 0.8 (à réservé aux situations sans trop forte pression graminées) | 56 €                                    |   |  |

\* attention, la sélectivité de cette association est réduite en cas d'amplitude thermique marquée.

Ne pas appliquer ADENGO après 3 feuilles du maïs.

## ► double post - levée :


En présence de graminées moyenne ou si les conditions sont défavorables à l'efficacité des produits racinaires (sol sec, absence de pluie), il est possible d'opter pour une stratégie de double post – levée.

| POST LEVÉE à 2-3 feuilles du maïs (T2)                                | coût indicatif 1er passage €/ha | POST-LEVEE à 4-6 feuilles du maïs (T3)                     | coût indicatif rattrapage €/ha | coût indicatif totalité du programme €/ha |
|---|---------------------------------|--|--------------------------------|---|
| - CALLISTO 0.5 l + nicosulfuron 20 g +PEAK 6 à 15 g                   | ou 40 à 50 €                    | - CALLISTO 0.5 l + nicosulfuron 12 à 16 g ou               |                                |   |
| - CALLISTO 0.5 l + nicosulfuron 20 g +BIATHLON 35 à 50 g + DASH 0.1 l | ou 50-55 € puis 45 €            | - CALLISTO 0.5 l + nicosulfuron 12 à 16 g +PEAK 6 g ou     |                                |   |
| - CALLISTO 0.5 l + nicosulfuron 20 g + RAJAH 0.5 l                    | ou 35-45 €                      | - CALLISTO 0.5 l + nicosulfuron 12 à 16 g + RAJAH 0.5 l ou |                                |   |
| - ELUMIS 0.6 à 0.7 l + PEAK 6 à 15 g                                  | ou 35-45 €                      | - ELUMIS 0.6 à 0.7 l + PEAK 6 g ou                         |                                |   |
| - SOUVERAIN 0.75 à 1 l + PEAK 6 à 15 g                                | ou 35-45 €                      | - SOUVERAIN 0.5 à 0.75 l + PEAK 6 g ou                     |                                |   |
| - AUXO 0.75 l + nicosulfuron 20 g +adjuvant                           | 49 €                            | - AUXO 0.5 à 0.75 l + nicosulfuron 12 à 16 g +adjuvant     | 35 à 50 €                      | 70 à 100 €                                |

## GRAMINEES, DICOTYLEDONES DIFFICILES et VIVACES

En présence de liseron des haies, les produits de "compléments" (PEAK, BIATHLON, RAJAH) peuvent être associés à des produits spécifiques vivaces : BANVEL 4S 0.4 l/ha ou KART 0.8 l/ha ou CAMBIO 1.5 l/ha, ou remplacés par les compléments anti-dicots associant du dicamba : CASPER (200 g) ou CONQUERANT (250 g). On veillera à intervenir sur liserons suffisamment développés (20-30 cm environ), généralement avant 6 feuilles du maïs. A noter que CASPER et CONQUÉRANT offrent un spectre particulièrement intéressant sur dicotylédones difficiles (renouée des oiseaux en particulier). En cas de forte pression de liseron des haies, ré-intervenir sur des repousses de 10 à 15 cm, après 6 feuilles du maïs avec BANVEL 4S 0.2 l/ha , KART 0.4 l/ha.ou CAMBIO 1.0 l/ha

*N B : Pour des raisons de sélectivité, nous déconseillons le mélange Tricétone + Sulfonylurée + Dérivé auxinique (par exemple, Callisto + Milagro + Banvel). Si toutefois ce mélange doit être pratiqué, il convient de respecter le stade de la culture (intervenir avant 6 feuilles) et les conditions climatiques autour de l'application.*



# PROTECTION CONTRE LES RAVAGEURS

# LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS AU STADE JEUNE

## Des taupins relativement discrets contrairement aux vers gris et à la mouche des semis

Cette année, des attaques de taupins ont été signalées à partir de fin mai, début juin. Mais pour la deuxième année consécutive, les gros dégâts ont été relativement rares. Des dégâts de mouche de semis ont été observés sur les semis de fin avril, réalisés juste avant les fortes pluies. Dans ces situations, la présence de mouche de semis était le plus souvent associée à des problèmes agronomiques (battance, reprise en masse du lit de semences trop fin). Du côté des ravageurs de début de cycle, ce sont surtout les géomyzès et oscinies, petites mouches qui pondent sur les jeunes maïs, qui ont été remarquées sur les semis d'avril. Les attaques sont souvent localisées en bordure des parcelles, mais dans le cas d'attaques plus généralisées, la réduction de

densité peut être importante et affecter le rendement de manière significative.

Le vers gris, un autre ravageur imprévisible, a également causé quelques dégâts sur les maïs au début du mois de juin, comme l'an dernier. L'hiver doux a probablement favorisé la survie des populations locales. Même si sa présence ne passe pas inaperçue dans les parcelles, avec des plants de maïs qui sèchent à 8-10 feuilles, l'impact final reste le plus souvent assez faible.

Enfin, la pyrale semble poursuivre sa progression au nord de la Loire. Sa présence est maintenant visible dans toute la région, même si les situations avec des dégâts importants restent encore peu fréquentes.

## La gamme de produits insecticides continue de s'étoffer

Les solutions de protection insecticide des semis ont été globalement satisfaisantes dans les conditions d'attaques modérées par les taupins en 2015. Les efficacités des produits oscillent entre 50 et 70% selon les conditions d'application et la dynamique d'attaque des taupins. Dans nos essais du Sud-Ouest de la France, les solutions à base de pyréthrinoïdes en microgranulés apportent des niveaux de protection comparables entre elles. Nos essais bretons en revanche révèlent que le Force 1,5G confirme son intérêt supérieur par rapport aux autres solutions microgranulés.



Pour les prochains semis, de nouvelles solutions à base de lambda-cyhalothrine (famille des pyréthrinoïdes) viendront compléter la panoplie des solutions

microgranulés déjà sur le marché (Force 1,5G, Belem 0.8Mg, Fury Géo) : il s'agit des produits Karaté 0.4Gr (homologué depuis fin 2015) et Trika Expert (en attente d'une homologation).

En cas d'attaques précoce par les taupins, le traitement de semences Sonido apporte un niveau de protection équivalent aux microgranulés. En revanche, l'efficacité de ce traitement de semence décroît lorsque les attaques de taupins s'intensifient après le stade 6 feuilles du maïs.

Les expérimentations conduites en 2015 confirment le manque de pertinence de la double protection associant un traitement de semence à un produit en microgranulés.

### ■ Protection du maïs contre les attaques de taupins : Résultats d'expérimentations



# Etre proactif pour éviter les attaques dévastatrices de vers gris

## **Les vers gris encore présents cette année**

Cette chenille a encore fait parler d'elle à l'ouest des Pays de la Loire (Vendée, sud Loire Atlantique, façade océanique) et jusqu'en Bretagne. Comme l'an dernier, les attaques se sont manifestées début juin. Les maïs les plus jeunes à cette période étaient les plus exposés. Dans la majorité des cas, les dégâts sont faibles – quelques cas sévères ont conduit au re-semis.

## **Comment reconnaître une attaque ?**

Les premiers symptômes sont difficiles à observer et ils passent inaperçus la plupart du temps :

Au début, petits trous, à l'emporte-pièce, sur les premières feuilles de la plantule de maïs.

Puis, jeunes plantes sectionnées à la base, flétrissement généralisé des plantes de 4-6 feuilles, voire plus jusqu'à 10 feuilles. Souvent, lorsque l'attaque est déclarée, plusieurs plantes successives sont touchées.

## **Pourquoi des attaques en 2015 : les hypothèses**

- Présence du ravageur en 2014 + conditions hivernales (sans excès de pluie, ni de températures basses) favorables à la survie des chenilles de l'espèce sédentaire (*Agrotis segetum*, noctuelle des moissons).
- Conditions du printemps favorables à la survie des pontes (humidité régulière).
- Période ventée début juin : favorable aux déplacements des papillons. Ce phénomène a pu favoriser la mobilité des 2 espèces – sédentaire et migratrice (*Agrotis ipsilon*).

## **Faut-il agir ? Comment agir ?**

Dans les situations où les attaques sont significatives, dégâts visibles et en progression, avec des larves de taille inférieure à 2.5 – 3 cm, une intervention peut s'envisager.

En cas d'attaque à des stades précoce du maïs (jusqu'à 5-6 feuilles), les microgranulés à base de pyréthrinoides apportent un réel bénéfice pour la protection contre les vers gris.

En cas d'attaque tardive par rapport à la date de semis, ce type de protection ne suffit pas et seule l'application d'un produit insecticide en végétation autorisé pour cet usage peut permettre d'endiguer l'attaque à condition que celle-ci soit détectée suffisamment tôt pour que l'insecticide soit appliqué avant que les plantes ne soient détruites (!) et avant que les larves ne soient trop développées. En effet, l'action de contact de l'insecticide est vite mise en défaut lorsque la larve atteint un stade de développement plus avancé.

Les produits insecticides sur appâts ne sont plus disponibles sur le marché. Il est donc nécessaire d'intensifier la surveillance en début d'attaque pour envisager une intervention sur jeunes larves, si nécessaire.

Il est alors conseillé d'intervenir en fin de journée, au moment où les larves ont une activité en surface du sol (alors que leur activité reste essentiellement sous la surface du sol lorsque les conditions sont chaudes et sèches) et avec un volume de bouillie élevé pour augmenter l'efficacité.

Pour plus d'information, consulter la fiche accident : [vers gris](#)

## CORVIDES : DES DEGATS PLUTOT LOCALISES EN 2015

Les oiseaux provoquant le plus de dégâts sur les semis de maïs sont des corvidés (Source : Enquête dégâts d'oiseaux en grandes cultures, récolte 2009). Deux principales espèces sont identifiées, la corneille noire, espèce sédentaire et territoriale à bec noir et le corbeau freux, reconnaissable par son bec blanc grisâtre, qui se comporte aussi bien comme un oiseau migrateur que comme un oiseau sédentaire. Ces corbeaux consomment les graines de maïs depuis la germination et généralement jusqu'au stade 4-5 feuilles. Les attaques peuvent exceptionnellement se poursuivre jusqu'au stade 7-8 feuilles certaines années. En suivant la ligne de semis, les corbeaux peuvent provoquer des dégâts importants pouvant conduire à un resemis.



Corneille noire

Les corbeaux sont fortement présents dans les vallées avec des refuges à proximité (bois, grands arbres, nidification dans les parcs...). Ils n'apprécient pas d'être dérangés. Ainsi les parcelles les plus à risques sont celles où la présence humaine est moindre (grandes parcelles, parcelles en hauteur avec vue dégagée, parcelles isolées).



La présence des corbeaux dans un secteur géographique est souvent peu maîtrisable mais certains facteurs peuvent permettre de limiter – dans une certaine mesure – les dégâts qu'ils occasionnent aux cultures. Un secteur avec seulement quelques parcelles de maïs semées est davantage exposé qu'un autre secteur où les semis seraient simultanés sur de larges surfaces (dilution de l'offre). C'est pourquoi les parcelles de maïs situées dans des régions où cette culture est minoritaire sont souvent attaquées. Dans la mesure du possible, il est préférable de ne pas semer ses parcelles trop en décalé – c'est-à-dire trop précocement ou trop

tardivement – par rapport à l'environnement proche. Le semis superficiel (2-3 cm) est aussi une pratique à risque favorisant la préhension des graines, il est préférable de respecter une profondeur de semis de 4 à 5 cm. Un lit de semence trop motteux avec présence de nombreux résidus peut aussi faciliter les déprédatrices de plantules par les corbeaux. La biologie du ravageur est également déterminante : l'intensité des attaques est fortement liée à la coïncidence entre les besoins alimentaires de ces volatils et l'offre alimentaire que représentent les semis de maïs.

| Facteurs favorables   | Facteurs défavorables   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Semis décalés (précoce, tardif)</li><li>- Présence de résidus en surface (couvert végétal, graines...)</li><li>- Sol motteux</li><li>- Vitesse de levée lente</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Semis simultanés dans un même secteur géographique</li><li>- Roulage du lit de semence</li><li>- Profondeur de semis adaptée (4-5 cm)</li><li>- Passage humain régulier sur la parcelle</li></ul> |


De nombreux systèmes d'effaroucheurs existent (épouvantails, canons...). Leur efficacité peut parfois être décevante suite à une accoutumance souvent rapide des oiseaux. Un passage humain régulier reste souvent le plus efficace pour éviter une installation des corbeaux dans la parcelle.

Dans les secteurs régulièrement affectés, les déclarations des dégâts chaque année peut permettre la mise en place d'un plan de régulation des populations. Le piégeage d'individus grâce à des cages – qui nécessite d'obtenir l'agrément piégeur – permet de réguler les populations et réduire ainsi les dégâts.

Des traitements de semences sont disponibles sur le marché pour un usage répulsif corbeaux. Ces spécialités chimiques autorisées appartiennent à la famille des carbamates. Ces solutions ont été testées sur plusieurs années. Dans le cas d'une attaque forte (seulement 20% de plantes présentes dans les témoins), le produit Korit 420 FS (à base de zirame, 250 g SA/q) présente une efficacité légèrement mieux que la référence Gustafson 42S (à base de thirame, 160 g SA/q). En cas de très fortes attaques, les solutions chimiques ne présentent pas une efficacité satisfaisante et évitent rarement de devoir procéder à un nouveau semis. Dans ces situations, seule la modification de l'itinéraire technique et la régulation des populations de freux et/ou corneilles dans l'environnement proche de la parcelle peuvent permettre de diminuer les risques pour la culture.

■ Protection du maïs contre les attaques de corvidés : Résultats d'expérimentations – 8 essais réalisés au champ (7 essais avec corneilles noires, 1 essai avec freux) – 2011-2015

% Plantes présentes



■ Lutte contre les ravageurs au stade jeune : Quelle protection choisir ?

| Spécialités commerciales (produit de référence)<br>Dose maximum / hectare               | SONIDO   | FORCE 20CS  | FORCE 1,5G<br>12.2 kg        | BELEM 0.8MG<br>12 kg | FURY GEO<br>15 kg                                | KARATE 0.4GR<br>15 kg                            |
|---|--|---|------------------------------|----------------------|--|--|
| Type de produit   | Traitement de semences   |   |                              |                      |  |  |
| Diffuseur recommandé  | Non concerné   |   | Diffuseur Syngenta           | Diffuseur DXP        | Tous diffuseurs                                  | Diffuseur Syngenta                               |
| Conditions d'application optimales  | Pour un positionnement optimal des microgranulés, éviter les préparations grossières (avec mottes, cailloux, résidus, lit de semence soufflé, sol trop sec...) |   |                              |                      |  |  |
| Homologués pour les usages :  | Ravageurs du sol, mouches  |   |                              |                      |  | Ravageurs du sol                                 |
| Intérêts techniques pour la protection contre :   | Taupins  | ①   |                              | ①                    | ①  | *  |
|   | Scutigerelle   | ▲   |                              | ▲                    | ▲  | *▲②  |
|   | Vers gris  | ▲   | ▲                            | ▲①                   | ①  | *①   |
|   | Mouche des semis   | *▲  | ?                            | +                    | +  | *+   |
|   | Oscinie Géomyze  | *   | ?                            | +                    | -  | -  |
|   | Pucerons, cicadelles au stade jeune  | -   | -                            | -                    | -  | -  |
| Principales contraintes réglementaires  | Densité maxi. de semis : 110 000 gr./ha  |   | Autorisé une année sur trois |                      | ZNT 20 m Dispositif végétalisé permanent de 20 m | ZNT 20 m Dispositif végétalisé permanent de 20 m |
| Prix indicatif / Ha (dose homologuée)   | 50 à 70 € selon densité de semis   | ~30 à 46 € selon densité de semis   | ~68-70 €                     | ~44-46 €             | ~58-60 €   | ~63-65 €   |
| <b>Légendes :</b><br>Usage homologué<br>Usage non homologué pour lutter contre la cible |  | <b>Efficacité :</b><br>Bonne<br>Moyenne<br>Irrégulière<br>Insuffisante<br>Manque d'information  |                              |                      |  |  |
|   |  | ① Efficacité plus limitée en cas d'attaques tardives. Meilleure efficacité lors d'attaques précoces<br>② Protection insecticide à accompagner de mesures agronomiques adaptées<br>* à confirmer   |                              |                      |  |  |
|   |  | ▲ La firme phytopharmaceutique ne conseille pas l'utilisation du produit pour protéger la culture contre la cible. Le produit peut être appliqué sous la responsabilité de l'agriculteur.<br>Les appréciations concernant les efficacités sont renseignées à titre indicatif. |                              |                      |  |  |

## LA PYRALE, UN RAVAGEUR EN RECRUDESCENCE DANS L'OUEST

Ce papillon foreur était particulièrement présent cette année probablement favorisé par la douceur hivernale et les conditions du printemps (vent, humidité). Bien connus au sud de la Loire, les dégâts dus à la pyrale dans les maïs sont de plus en plus souvent signalés au nord de la Loire depuis quelques années. L'intensité des attaques reste encore assez faible en moyenne et il convient à ce stade d'insister surtout sur les mesures préventives à adopter.

### Une intensité de dégâts encore relativement faible

En production de maïs grain, l'impact sur la production peut être à la fois quantitatif et qualitatif. En creusant des galeries dans les tiges, les larves de pyrale entraînent la casse des tiges et la verse, parfois des épis tombées au sol, causant des pertes directes. En cas d'attaque de forte intensité, une baisse du poids des grains peut aussi être observée. L'autre aspect est la dégradation de la qualité sanitaire des grains de maïs. En effet les galeries provoquées par les larves constituent des portes d'entrées pour des champignons fusarium, entraînant le développement de mycotoxines.

En maïs fourrage, l'impact est moins important compte tenu de la précocité de la date de récolte, mais des dégâts directs avec des épis au sol peuvent parfois être observés. Les seuils de nuisibilité mesurés dans le sud de la France indiquent une perte significative de rendement à partir de 1 larve par plante. Sauf cas particulier et localisé, ces intensités ne sont pas atteintes aujourd'hui au nord de la Loire.



*Les dégâts dus à la pyrale sont devenus fréquents, mais restent en général d'intensité modérée.*

### Broyage et incorporation des cannes de maïs : la prévention avant tout

La pyrale hiverne à l'état de diapause dans le bas des tiges de maïs et passe très bien l'hiver, surtout lorsque les températures restent douces et l'hiver pas trop pluvieux. Pour réduire les populations, il est donc indispensable de bien gérer les cannes de maïs grain après récolte. Cela passe par un broyage systématique fin et au ras du sol pour atteindre les larves réfugiées en bas de tige. L'incorporation des résidus est la seconde étape indispensable qui réduit encore les chances de survie des larves. Le labour, permettant d'enfouir à une plus grande profondeur, sera plus efficace que les autres techniques de travail du sol. La mise en œuvre de cet itinéraire, efficace pour la destruction des larves de pyrale, est également très utile pour réduire le risque de fusariose et de mycotoxines si la culture suivante est un blé. En cas de succession maïs/maïs, cela réduit également le risque de développement de maladies foliaires (helminthosporiose et kabatiellose) dans les régions concernées. C'est également une exigence

réglementaire dans le cadre de la Directive Nitrates pour réduire les fuites d'azote.



*Les résidus de récolte doivent être broyés finement et au ras du sol, suivi d'une bonne incorporation (au premier plan : galerie de pyrale)*

## Quels sont les outils de protection en végétation ?

Dans un secteur à risque, comportant des parcelles de maïs très touchées les années précédentes, avec une gestion des résidus de récolte insuffisante à l'échelle du secteur, certaines parcelles peuvent justifier d'une protection insecticide, notamment en succession maïs grain/maïs grain.


L'efficacité de l'intervention dépendra de l'adéquation entre le mode d'action du produit (œuf, larve) et du stade de développement du ravageur au moment de son application (cf. schéma).

Pour optimiser le positionnement de l'intervention, le suivi de la dynamique des vols est indispensable pour intervenir au bon moment. Il est recommandé pour cela de s'appuyer sur les avertissements régionaux (réseaux de piégeage mis en œuvre dans le cadre de la surveillance biologique du territoire par exemple).

- Trichogrammes : Action ovicide efficace uniquement sur la pyrale du maïs. L'application doit être réalisée en début de vol des papillons de pyrale pour viser les premières pontes. Cette solution est efficace sur des pressions d'intensité moyenne.
- Les solutions insecticides liquides sont à positionner au « pic » du vol de papillons afin de toucher une majorité de jeunes larves. Après leur éclosion et avant que celles-ci ne se réfugient dans la plante. La solution Coragen offre un peu plus de souplesse en termes de positionnement par son action à la fois ovicide et larvicide.

NB : Lorsque les larves sont à l'abri dans la plante, elles ne peuvent plus être atteintes.

### Se repérer dans le cycle du ravageur pour intervenir



Pour plus d'information, consulter la fiche accident : [pyrale](#)

