

Tableau 1 : Adaptation des espèces de cultures intermédiaires aux dates de semis

	Post-moisson (avant le 15/8) (avec risque de stress hydrique et thermique)	Mi-août à Début sept. (date habituelle de semis du colza)	Date ultérieure (Sommes de T° limitantes pour obtenir un développement correct en entrée d'hiver)
Graminées			
Avoine de printemps	Assez bonne	Bonne	Moyenne
Avoine d'hiver	Bonne	Bonne	Moyenne
Avoine rude	Assez bonne	Bonne	Moyenne
Blé ou orge	Bonne	Bonne à moyenne	Faible
Moha	Bonne	Faible	Faible
Ray grass d'Italie	Bonne	Bonne	Moyenne
Seigle	Bonne	Bonne	Moyenne
Crucifères			
Caméline	Moyenne	Bonne	Faible
Colza	Bonne	Bonne	Faible
Moutarde blanche	Moyenne	Bonne	Faible
Moutarde brune	Assez bonne	Bonne	Faible
Navette fourragère	Bonne	Bonne	Moyenne
Radis chinois	Bonne	Bonne	Faible
Radis fourrager	Bonne	Bonne	Faible
Légumineuses			
Féverole de printemps	Bonne	Moyenne	Moyenne à faible
Gesse cultivée	Bonne	Moyenne à faible	Faible
Lentille noirâtre	Bonne	Moyenne	Faible
Pois fourrager	Bonne	Moyenne	Faible
Trèfle d'Alexandrie	Bonne	Moyenne à faible	Faible
Trèfle incarnat	Bonne	Moyenne	Faible
Vesce commune de printemps	Bonne	Moyenne à faible	Faible
Vesce du Bengale ou Vesce pourpre	Bonne	Moyenne	Faible
Vesce velue	Bonne	Moyenne à faible	Faible
Autres familles			
Niger	Bonne	Faible	Faible
Tournesol	Bonne	Moyenne	Faible
Sarrasin	Bonne	Faible	Faible
Phacélie	Assez bonne	Bonne	Faible
Lin	Moyenne	Bonne	Faible