

(liste non exhaustive ; pour les conditions d'utilisation des produits, lire leur notice et étiquette)

Complexe d'adventices « classiques »		Stade des adventices	Herbicides et doses (PC/ha sauf mention contraire)
Dicotylédones seules	Chénopode, Morelle, Renouée persicaire, seules ou associés	4 - 6 f	bromoxynil* bentazone* Onyx 0,75 l Decano 0,5 l Callisto 0,5 l Calaris 0.7 l Laudis WG 0.2 kg + Actirob B 1 l Auxo 0.5 à 0.75 l + adjuvant Capreno 0.2 l + Actirob B 1.5 l
		8 - 10 f	Decano 0,75 l Callisto 0,75 l Calaris 1 l Laudis WG 0.25 kg + Actirob B 1 l Auxo 0.75 à 1 l + adjuvant Capreno 0.25 l + Actirob B 1.5 l
	Amarante seule ou Amarante associée à Chénopode ou/et Morelle ou/et Renouée persicaire	4 - 6 f	bromoxynil* Onyx 0,75 l Decano 0,5 l Callisto 0,5 l Calaris 0.7 l Laudis WG 0.2 kg + Actirob B 1 l Auxo 0.5 à 0.75 l + adjuvant Auxo 0.5 l + nicosulfuron*** 12 g sa + adjuvant Capreno 0.2 l + Actirob B 1.5 l
		8 - 10 f	Callisto 0,75 l Calaris 1 l Laudis WG 0.25 kg + Actirob B 1 l Auxo 0.75 à 1 l + adjuvant Auxo 0.75 l + nicosulfuron*** 12 g sa + adjuvant Capreno 0.25 l + Actirob B 1.5 l
Dicotylédones + Graminées	Panic pied de coq, Sétaire sp, Digitale sanguine Amarante, Chénopode, Morelle, Renouée persicaire	2 - 3 f des graminées et 4 - 6 f des dicots	Callisto 0,5 l + nicosulfuron*** 20 g sa Calaris 0,5 l + nicosulfuron*** 20 g sa Laudis WG 0.2 kg + Actirob B 1 l + nicosulfuron 12 g sa Auxo 0.75 l + nicosulfuron *** 20g sa + adjuvant Elumis 0.7 l Decano 0,5 l + nicosulfuron*** 20 g sa Souverain OD 1 l Monsoon Active 0.75 l + Laudis WG 0.2 kg Capreno 0.2 l + Actirob B 1.5 l

		<i>3 f – 1 talle des graminées et 4 – 6 f des dicots</i>	<p>Callisto 0,75 l + nicosulfuron*** 30 g sa Elumis 0.6 l + Calaris 0.6 l Decano 0,75 l + nicosulfuron*** 30 g sa Souverain OD 1.5 l Auxo 1 l + nicosulfuron *** 20 g sa + adjuvant Capreno 0.25 l + Actirob B 1.5 l</p>
<p>Graminées seules (pour la prévention de l'apparition de résistances, bien adapter la dose au stade des graminées, et traiter dans des conditions optimales)</p>	<p>Panic pied de coq, Sétaire sp, Digitale sanguine, Pâturin</p>	<i>2 - 3 f</i>	<p>nicosulfuron*** 20 g sa Tarot**30 g + Trend90 0.25 l Laudis WG 0.2 à 0.25 kg + Actirob B + [Equip 1.2 l ou nicosulfuron*** 30 g sa] Capreno 0.2 l + Actirob B 1.5 l</p> <p>sur variété Duo System uniquement : Stratos Ultra 0,8 l + Dash 0,8 l</p>
		<i>3 f – 1 talle</i>	<p>Capreno 0.25 l + Actirob B 1.5 l Elumis 1 l nicosulfuron*** 30 g sa Tarot** 40 g + Trend90 0.25 l</p> <p>sur variété Duo System uniquement : Stratos Ultra 1 l + Dash 1 l</p>
		<i>2-3 talles</i>	<p>Capreno 0.29 l + Actirob B 1.5 l Elumis 1.2 l nicosulfuron*** 40g à 50g sa Tarot** 50 g + Trend90 0.25 l</p> <p>sur variété Duo System uniquement : Stratos Ultra 1,2 l + Dash 1 l</p>

* Pour bromoxynil et bentazone, la modulation de dose ne peut pas être précisée dans ce tableau, car elle est différente suivant la formulation (cf dépliant protection du maïs ARVALIS 2020).

** Tarot toujours avec un mouillant non ionique par exemple, Trend 0,25 l/ha.

***Dose de nicosulfuron indiquée en g de substance active par hectare.