



FREDON
NORMANDIE

Animatrice référente

Laura EPINEAU
FREDON NORMANDIE
02 31 46 96 50
06 77 59 25 02
laura.epineau@fredon-normandie.fr

Animatrice suppléante

Valérie PATOUX
CA 14
02 31 53 55 09
valerie.patoux@normandie.chambagri.fr

L'essentiel de la semaine

METEO :

Comme la semaine dernière, ces prochains jours restent ensoleillés et secs avec une augmentation des températures en cette fin de semaine.

STADES :

Secteur Calvados : les pommes de terre sont majoritairement levées ou en cours de levées dans les parcelles du réseau.

Secteur Manche, Seine-Maritime et Eure : les parcelles ne sont pas levées.

MALADIE :

Mildiou : Présence de mildiou sur tas de déchet.

RAVAGEUR :

Pucerons : Présence de pucerons ailés sur des parcelles à différents stades de développement et de coccinelles adultes.

→ Les culturales 2023 en région Centre Val de Loire le 14 et 15 juin



Après 10 ans, le salon au champ organisé par ARVALIS est de retour dans la région Centre - Ile de France à **Congerville-Thionville** (91) ! 25 ha consacrées à l'**innovation et la performance en grandes cultures** : 250 exposants, un espace technique, des vitrines végétales, des conférences et de nombreux experts vous attendent. Venez découvrir le dispositif technique organisé autour de quatre thématiques : changement climatique, santé des plantes, sécurité alimentaire, nutrition des plantes. Que vous soyez technicien ou agriculteur,

rendez-vous les **14 et 15 juin 2023**.

→ Pour plus d'informations, cliquez sur l'image ci-contre.



Carte des parcelles du réseau BSV Pomme de terre sur Vigicultures
(En blanc : parcelles avec observations, en noir : parcelles sans observations)


Les parcelles lèvent dans le département du Calvados. Dans ce dernier, deux parcelles sont au stade « début du développement des feuilles » et une parcelle est au stade « apparition inflorescence ». Les pommes de terre des parcelles restantes du réseau ne sont pas levées ou sont en cours de levées. La carte ne reflète donc pas encore l'ensemble des parcelles du réseau pomme de terre de Normandie (15 parcelles inscrites dans Vigicultures).

Les conditions météorologiques prévues sont favorables à la levée des pommes de terre.

Pour rappel, le stade de levée sur une parcelle est atteint lorsque l'on voit les rangs, ce qui équivaut à 30 à 50% de plantes définies comme étant levées.



Parcelle au stade « apparition des inflorescences », secteur Calvados (Chambre d'agriculture de Normandie)



Parcelle au stade « début de développement » des feuilles, secteur Calvados

Maladie

* MILDIOU

Observation :

La présence de mildiou est notée sur tas de déchets sur le secteur du Calvados.

Il est important de gérer les tas de déchets et les repousses pour limiter les risques d'inoculum primaire.



Taches de mildiou sur tas de déchets (COMITE
NORD)

Seuil de nuisibilité :

Pour que le seuil de nuisibilité du mildiou soit atteint, il faut entre autres qu'il existe un potentiel de sporulation (« quantité de maladie qui pourrait apparaître ») et que les conditions climatiques soient favorables à la contamination puis à l'expression de la maladie.

Les conditions favorables à la sporulation sont, pour une hygrométrie à 87%, d'une durée de :

- ◇ 6 heures à une température de 21°C
- ◇ 8 heures à une température de 15°C
- ◇ 17 heures à une température de 10°C

Éléments de biologie :

Le mildiou de la pomme de terre est provoqué par *Phytophthora infestans*. Les conditions favorables à son développement sont : une température comprise entre 3 et 26°C, une hygrométrie supérieure à 87% et une végétation dense. Pendant l'hiver, il se conserve sous forme de mycélium dans les tubercules laissés au champ, les tas de déchets ou les repousses. Ainsi, au printemps, les spores d'hiver constituent des réserves de spores et peuvent infecter les nouvelles cultures grâce à leur dissémination par le vent ou par la pluie.

Analyse du risque mildiou réalisée avec l'Outil d'Aide à la Décision MILEOS®, mis à disposition par ARVALIS Institut du végétal.

Interprétation du tableau de risque Mildiou :

Le niveau de risque Mildiou : tient compte de la réserve de spores et du potentiel de sporulation. La réserve de spores correspond à la quantité de spores théoriquement présentes dans l'environnement qui pourront être contaminants si les conditions climatiques sont favorables. Le potentiel de sporulation est la quantité de spores prête à sporuler, il alimente la réserve de spores. Ainsi l'importance du potentiel de sporulation et donc de la réserve de spore caractérise le niveau de risque qui peut être :

Faible Moyen Elevé Très élevé

Le seuil indicatif de risque atteint : indique en fonction de la sensibilité variétale si le seuil indicatif du risque est atteint (OUI) ou pas (NON). Pour qu'il soit atteint, il faut entre autres que les conditions météorologiques (température et hygrométrie) soient favorables à la libération des spores = seuil de production de spores atteint.



Les risques donnés dans le tableau ci-dessous sont valables pour ce **jeudi 25 mai** et pour des parcelles non irriguées. L'irrigation peut augmenter le risque en fonction des heures où elle est positionnée.

Situation au 25 mai 2023

	Stations météorologiques (Données Weather Measures)	Dates de dépassement du seuil de nuisibilité durant depuis le 18 mai	Niveau de risque Mildiou	Seuil indicatif de risque atteint au 25 mai			Pluviométrie depuis le 18/05/2023
				Variété sensible	Variété intermédiaire	Variété résistante	
Seine-Maritime	ALLOUVILLE-BELLEFOSSE	Aucune	Elevé	NON	NON	NON	0,4
	ANCRETIEVILLE-SAINT-VICTOR	Aucune	Elevé	NON	NON	NON	0,3
	BARENTIN	Aucune	Elevé	NON	NON	NON	0,4
	BOLBEC	Aucune	Elevé	NON	NON	NON	0,1
	LUNERAY	Aucune	Très élevé	NON	NON	NON	0,3
	NORMANVILLE	Aucune	Très élevé	NON	NON	NON	0,1
Orne	SEES	Aucune	Très élevé	NON	NON	NON	0
Manche	BEAUVOIR	Aucune	Très élevé	NON	NON	NON	0,2
	SAINTE-GENEVIEVE	Aucune	Très élevé	NON	NON	NON	0,2
Eure	BOUQUETOT	Aucune	Elevé	NON	NON	NON	0,1
	CHAMBORD	Aucune	Faible	NON	NON	NON	0,2
	EPREVILLE-PRES-LE-NEUBOURG	Aucune	Elevé	NON	NON	NON	0
	SURTAUVILLE	Aucune	Elevé	NON	NON	NON	0,3
Calvados	DOUVRES-LA-DELIVRANDE	Du 20 au 21 mai	Très élevé	NON	NON	NON	0,2
	ROTS	Le 21 mai	Très élevé	NON	NON	NON	0,2
	SAINT-SYLVAIN	Aucune	Elevé	NON	NON	NON	0,2
	VENDEUVRE	Aucune	Très élevé	NON	NON	NON	0,2

*Niveau de risque = Potentiel de sporulation

Evolution du risque :

Les conditions météorologiques relativement sèches à venir sont défavorables au développement des cycles du mildiou, même si l'hygrométrie nocturne et matinale peuvent être favorables à son développement.

Gestion du risque :**Prophylaxie :**

Utilisez des plants sains

Détruisez ou bâchez les tas de déchets et les repousses de pomme de terre. [Cf BSV n°01 du 06/04/2023](#)

Effectuez un bon buttage


Favorisez les rotations culturales

Ravageurs

* PUCERONS

Observation :

Quel que soit le secteur, la présence de pucerons ailés a été observée sur les jeunes feuilles. Aucune colonie n'a été vue.

 On note cette semaine la présence de coccinelles adultes.



Puceron ailé, *Myzus persicae* (Chambre d'agriculture de Normandie)

Seuil de nuisibilité :

Sur une feuille de pomme de terre située sur la moitié inférieure de la plante, choisir une des folioles latérales. Le seuil est de 20 folioles porteuses de pucerons sur 40 folioles observées soit 50% des folioles porteuses de pucerons ou 5 à 10 pucerons par feuille.



Evolution du risque :

Les conditions climatiques sont favorables au développement des pucerons. Surveillez l'installation et l'action de la faune auxiliaire.

Gestion du risque :**Prophylaxie :**

Observez vos parcelles, les pucerons peuvent transmettre des virus notamment aux variétés sensibles.

B**Méthodes alternatives : Des produits de biocontrôle existent**

Le **biocontrôle** vise la protection des plantes en privilégiant l'utilisation de mécanismes et d'interactions naturels. A l'inverse de la lutte chimique, il est fondé sur la gestion des équilibres des populations d'agresseurs plutôt que sur leur éradication.
<https://ecophytopic.fr/reglementation/protger/liste-des-produits-de-biocontrole>

Afin d'informer et de sensibiliser les partenaires du plan Ecophyto normand, les 5 fiches techniques de biocontrôle conçues par l'IBMA (Association Internationale des Producteurs de Produits de Biocontrôle) ont été « labellisées Ecophyto », avant d'être rééditées et diffusées en région :

- ❖ Biocontrôle
- ❖ Macro-organismes
- ❖ Micro-organismes
- ❖ Médiateurs chimiques
- ❖ Substances naturelles

Il existe des produits de biocontrôle autorisés pour différents usages

Retrouvez la liste actualisée régulièrement sur le site : <http://www.ecophytopic.fr/>

Crédit photos : FREDON Normandie sauf mention particulière

Le BSV est un outil d'aide à la décision, les informations données correspondent à des observations réalisées sur un échantillon de parcelles régionales. Le risque annoncé correspond au risque potentiel connu des rédacteurs et ne tient pas compte des spécificités de votre exploitation. Par conséquent, les informations renseignées dans ce bulletin doivent être complétées par vos propres observations avant toute prise de décision.

Informations supplémentaires

→ La base de données ABAA



Base de données **ABAA**

La base de données ABAA : Auxiliaires, BioAgresseurs et Accidents, rassemble des informations sur les organismes utiles, nuisibles ainsi que les accidents physiologiques et climatiques.

A retrouver sur Ecophytopic, une base de données qui recense des informations concernant différents organismes (BioAgresseurs et auxiliaires) ainsi que les accidents physiologiques et climatiques : <https://ecophytopic.fr/search/base-abaa>

→ Abeilles et pollinisateurs : des auxiliaires à préserver !



Pour en savoir plus : <https://agriculture.gouv.fr/nouvelles-dispositions-reglementaires-pour-la-protection-des-abeilles-et-des-insectes>

Foire aux questions sur l'arrêté abeille : [FAQ arrêté abeilles](#)

Note nationale :

[Projet note nationale abeille réglementation version consolidée V4 \(agriculture.gouv.fr\)](#)

Les notes nationales BIODIVERSITE

