



A RETENIR (CTRL – CLIC POUR SUIVRE LE LIEN) :

Colza : stade C2 « entre-nœuds visibles » à E « boutons dégagés ». Forte augmentation des captures de charançons de la tige du colza. Début des observations de méligèthes, présents localement en nombre important.

Blé : décollement de l'épi en cours à stade épi 1 cm dépassé.

Orge d'hiver : décollement de l'épi en cours à stade épi 1 cm dépassé

Orge de printemps : semis en cours.

METEO

STATION DE LIEUSAIN (77)

	mar. 3	mer. 4	jeu. 5	ven. 6	sam. 7	dim. 8	lun. 9
	0	0	0	0	0	0	0
	48 / 89	46 / 91	45 / 95	47 / 93	52 / 91	49 / 97	43 / 91
	5 / 17	6 / 18	5 / 19	7 / 20	9 / 19	7 / 18	8 / 18

Source : Sencrop - Modèle : METEOBLUE

COLZA

22 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES

Les conditions climatiques sont favorables au développement des colzas.

La majorité des parcelles du réseau est au stade D2 « inflorescence principale dégagée ». 27 % des parcelles sont déjà au stade E « boutons dégagés ». La parcelle la plus tardive est encore au stade C2 « entre-nœuds visibles ».

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Région Île de France sur la base d'observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, il ne peut se substituer à une observation personnelle dans sa parcelle.

Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.

Pour vous abonner faites votre demande à ecophyto@idf.chambagri.fr en spécifiant la filière.


Financé dans le cadre de la stratégie **écophyto**

GOVERNEMENT
Liberté
Égalité
Fraternité



**La stratégie
écophyto 2030**
Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

Répartition des stades (%) par semaine d'observation dans le réseau BSV IDF - printemps 2026



RAVAGEURS

Charançon de la tige du colza



Le charançon de la tige du colza est le premier ravageur à surveiller en sortie d'hiver.


Les insectes quittent les parcelles de colza de l'année précédente, dès que la température de l'air dépasse les 9 °C.

Lorsque la température atteint 12 à 13 °C, le nombre de charançons pouvant se déplacer peut-être important. Dans tous les cas, les insectes migrent vers le champ de colza le plus proche, se posant rapidement avant de se répartir dans la parcelle.

Cette semaine, 12 parcelles sur les 21 observées capturent au moins un charançon de la tige du colza soit 57 % des parcelles observées. Le nombre moyen de captures est en forte augmentation, à 10,1 individus par piège.

5 parcelles ont capturé plus de 20 individus : 25 à Courtacon (77), 35 à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux (77), 27 à Yèbles (77), 73 à Etampes (91) et 35 à Guillerval (91).

Evolution des captures moyennes de charançons de la tige du colza au printemps 2026



A ne pas confondre avec le charançon de la tige du chou, qui est peu à pas nuisible en région.

Le charançon de la tige du chou

Le corps est noir il est recouvert d'une abondante pilosité rousse. Il possède une tache blanchâtre entre le thorax et l'abdomen ainsi que le bout des pattes rousses.



Le charançon de la tige du colza

C'est le plus gros, son corps est gris cendré, avec le bout des pattes noires.



Terres Inovia a développé un outil de prédiction des vols de charançon de la tige du colza : <https://www.terresinovia.fr/-/outil-prediction-des-vols-de-ravageurs>

A RETENIR

Risque : fort.

Stade de sensibilité : du stade C2 (entre-nœuds visibles) au stade E (boutons séparés).

Seuil indicatif de risque : il n'y a pas de seuil quantitatif, le risque démarre 8 jours après les premières captures significatives dans la parcelle, lorsque les femelles commencent à être apte à pondre dans les tiges.

• Meligèthes



96% des parcelles du réseau sont au stade sensible aux méligèthes, stade D1 « boutons accolés encore cachés » jusqu'au stade E « boutons séparés ».

Le dénombrement sur plante à la parcelle est le seul moyen pour définir le risque et il doit se combiner avec le stade de la culture. Faire la notation à plusieurs endroits en observant des plantes consécutives (ne pas observer que les plantes les plus avancées qui peuvent être attaquées).

15 parcelles ont été observées, dont 14 remontent des méligèthes par plante en bordure et / ou en parcelle :

Parcelle	Stade	Nombre / plante en parcelle	Nombre / plante en bordure
Aubepierre-Ozouer-le-Repos (77)	D1		1
Congis-sur-Thérouanne (77)	D2	0,3	
Pécharches (77)	D2	5	16
Vallery (77)	E	1	2
Fontenay-Mauvoisin (78)	D2	12	15
Lommoye (78)	D2	5	6
Méré (78)	D2	10	18
Richebourg (78)	D2	7	12
Abbéville-la-Rivière (91)	E	0,85	
Corbreuse (91)	D2	1,8	
Gironville-sur-Essonne (91)	E	0,05	
Saint-Vrain (91)	D2	4,65	
Magny-en-Vexin (95)	D1	5	7
Vallangoujard (95)	D1	0,5	1,5

Le seuil indicatif de risque (quelle que soit la vigueur du colza) est atteint pour 7 parcelles, soit la moitié des parcelles signalant des méligèthes

Les conditions climatiques des prochains jours seront favorables au maintien voire le renforcement de l'activité des méligèthes.

A RETENIR

Risque : moyen à fort.

Stade de sensibilité : du stade D1 à début floraison, 96 % des parcelles sont au stade de sensibilité.

Seuil indicatif de risque : tableau ci-dessous.

La nuisibilité de ce ravageur sera fonction de l'état du colza et de la dynamique de croissance des tiges.



Le couple « méligèthe / pyrèthrinoïdes » est exposé à un risque de résistance

Seuils indicatifs de risque		Stades	
Etat du colza		Colza au stade D1-D2 (boutons accolés)	Colza au stade E (boutons séparés)
			
Seuil 1	Colza stressé ou peu développé (climat stressant, déficit hydrique, peuplement trop faible ou trop important, vigueur faible des plantes, autres dégâts, ...)	1 méligèthe par plante	2 à 3 méligèthes par plante
Seuil 2	Colza vigoureux (sol profond, bonne vigueur des plantes, peuplement optimal, pas d'autres dégâts)	3 à 4 méligèthes par plante	7 à 8 méligèthes par plante

MALADIES

• Cylindrosporiose

Pas de signalement cette semaine.

Symptômes source Terre INOVIA :

- **Plage de décoloration légère (bleuté, vert pâle)**
- **Localisation où l'eau stagne sur le limbe**
- **Tache beige à fauve de type « brûlures » à aspect liégeux, tissu cassant**
- **Présences, d'acervules (pustules blanches) autour de la tache.**




Photo : Terres Inovia

Il n'existe pas de seuil de risque pour cette maladie, qui est considérée comme peu nuisible en région Ile-de-France. La cylindrosporiose est naturellement freinée à l'approche de la floraison ou à partir du moment où la protection contre le sclérotinia intervient.

Exemples de variétés et sensibilité aux symptômes de cylindrosporiose sur feuilles dans le réseau Ile-de-France :

BLACKJACK : assez sensible (1 parcelle)

BLACKPANTHER : assez sensible (1 parcelle)

CEOS : peu sensible (4 parcelles)

COLLECTOR : pas d'infos (1 parcelle)

GENEROSO : peu sensible (1 parcelle)

HEDEN : peu sensible (1 parcelle)

KWS ARIANOS : peu sensible (1 parcelle)


KWS DOMINGOS : peu sensible (1 parcelle)

KWS FELICIANO : peu sensible (1 parcelle)

BLE

23 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES




Pour rappel :

Le stade épi 1 cm est atteint lorsque la distance entre la base du plateau de tallage et le sommet de l'épi est de 1 cm, ceci pour plus de 50 % des maîtres-brins.


Cette semaine sur le réseau BSV le décollement de l'épi est toujours en cours pour plus de 90 % des parcelles.

31 % des parcelles dépassent déjà le stade épi 1 cm avec des hauteurs de l'épi comprise entre 1 et 1,4 cm.



MALADIES

Rappel des périodes de sensibilité des maladies sur blé (Source Arvalis) :



• Septoriose


Nous observons de la septoriose cette semaine dans le réseau. Deux parcelles sont concernées par la maladie hors période de sensibilité mais cela confirme que la maladie est déjà présente dans certaines situations.

Les observations ont été réalisées à Maisse (91) sur du CHEVIGNON semé le 16/10 et à Pézarches (77) sur du THERMIDOR semé le 13/10. Les deux parcelles signalent 100% de présence sur les F3 actuelles.

ORGE D'HIVER

10 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES




Les orges d'hiver continuent leur croissance. Une parcelle est encore au stade tallage.

Les autres parcelles sont au stade décollément de l'épi avec des hauteurs comprises entre 0.5 à 0.8 cm.

3 parcelles dépassent le stade épi 1 cm avec des décolléments de l'épi de plus de 1,3 à 1,6 cm.

Rappel des périodes de sensibilité maladie de l'orge d'hiver (Source Arvalis) :



Vous trouverez sur le site de la DRIAf les fiches des Organismes Réglementés de la filière :

<https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-grandes-cultures-r739.html>,

<https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-pomme-de-terre-r737.html>

Les notes nationales de biodiversité sont consultables sous <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/notes-nationales-biodiversite-r607.html>

Pour en savoir plus sur :

-Les résistances : <https://www.r4p-inra.fr/fr/home/>

-Les produits de biocontrôle : <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/liste-officielle-biocontrôle-avril-2023-a1709.html>

-Les adventices : <https://www.infloweb.fr/>

- **Observations :**

AGRICULTEURS, COOP 110 BOURGOGNE, CERESIA, ARVALIS, CARIDF, CENTREXPPE, COOPERATIVE ILE DE FRANCE SUD, COOP SEVEPI, COOP VALFRANCE, Ets MARCHAIS Ets SOUFFLET AGRICULTURE, FREDON IDF, ITB IDF, SRAL, SUCRERIE CRISTAL UNION, SUCRERIE DE TEREOS, TERRES INOVIA.

- **Rédaction :**

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE : Franck GAUDICHAU, Nicolas GREAUME, Mathilde GUILLOUX, Clément LECLERCQ, Claire TURILLON.

FREDON Ile de France : Céline GUILLEM.

- **Comité de relecture :**

ARVALIS, Chambre d'Agriculture de Région Île de France, TERRES INOVIA, ITB, SRAL.