



Normandie - Hauts-de-France

BSV n°2 – 17 mars 2026

Animateurs référents

Elodie GAGLIARDI
ARVALIS
06.30.65.55.03
e.gagliardi@arvalis.fr

Hervé GEORGES
CA80
06.86.37.56.41
h.georges@somme.cha
mbagri.fr

A RETENIR :

Lin fibre d'hiver :

- Les stades ont peu évolué par rapport à la semaine dernière.
- Surveillance courbure toujours d'actualité
- Quelques signalements d'oïdium, principalement en Normandie

Lin fibre de printemps :

- Pas d'urgence pour les semis qui attendront des conditions plus favorables

AGRO-METEO et SITUATIONS SUR LE TERRAIN

La dernière semaine, les températures relativement fraîches ont ralenti la croissance des lins d'hiver. Les prévisions météo annoncent des températures plus douces cette semaine qui seront à nouveau favorables à leur développement.

LIN FIBRE D'HIVER

LE RESEAU D'OBSERVATION CETTE SEMAINE

Le réseau de lin d'hiver est constitué cette semaine de 22 parcelles réparties sur la Normandie et les Hauts-de-France.

Calvados (14)	Eure (27)	Seine Maritime (76)	Oise (60)	Pas-de- Calais (62)	Nord (59)	Somme (80)	Aisne (02)
1	4	5	1	2	1	7	1

Directeur de la publication
Sébastien WINDSOR
Président des Chambres
d'agriculture de Normandie

BSV consultable sur les sites
de la DRAAF, des Chambres
d'agriculture et des partenaires
du programme

A consulter sur
normandie.chambres-agriculture.fr

Action de la Stratégie Écophyto 2030
pilotee par les ministères chargés de
l'Agriculture, de l'Environnement, de
la Santé et de la Recherche, avec le
soutien financier de l'Office Français
de la Biodiversité

Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**



GOVERNEMENT

Liberté
Égalité
Fraternité

ARVALIS



Avec le soutien financier de



Ce bulletin est une publication gratuite, réalisée en partenariat avec

Chambres d'agriculture, FREDON, DRAAF Normandie, DRAAF Hauts-de-France, producteurs, GRCEA 27,
coopératives et teillages privés impliqués dans le réseau d'observation

STADES

Cette semaine, sur les 22 parcelles observées en lin d'hiver :

- 5 sont au stade D1 : 10 cm ; semis effectués autour du 10 octobre en général.
- 9 sont au stade D2 : 20 cm, souvent des semis du 10 octobre.
- 8 sont au stade D3 : 30 cm, souvent des semis assez précoces, fin septembre, début octobre, en tout secteur de production.

Les stades sont toujours en avance par rapport à l'année dernière où les semis avaient été plus tardifs.

OBSERVATIONS

OIDIUM

Les symptômes d'oïdium observés la semaine dernière ont peu évolué compte tenu des conditions pluvieuses et fraîches de la semaine passée.



Sur les 22 parcelles observées :

- En Hauts-de-France, l'oïdium est signalé faiblement sur 2 parcelles sur les 11 observées et une parcelle avec feutrage blanc dans l'Aisne.
- En Normandie, 6 parcelles sur les 11 observées présentent des symptômes avec 56% de pieds touchés, dont 3 parcelles à plus de 95% de pieds touchés (2 parcelles de Jade dans le 27 et 1 parcelle de Olga dans le 76).



Oïdium sur feuilles (H.GEORGES CA 80)

Seuil de nuisibilité : dès apparition des premières étoiles

Analyse du risque :

Une hygrométrie forte au sol et une végétation luxuriante (fortes densités, fertilisation azotée excessive, ...) sont des facteurs à risque. La pression oïdium est bien là mais devrait baisser si des pluies surviennent comme annoncé.

Méthodes alternatives :

- **Prophylaxie :**
 - **Respect d'un intervalle d'au moins 6 ans entre deux lins**
 - **Lutte variétale**
 - **La densité de semis**
 - **Raisonnement de la fertilisation azotée**

THRIPS

Les conditions climatiques cette semaine sont moins favorables aux thrips qui sont signalés uniquement sur 3 parcelles sur les 22 parcelles observées (de 1 à 4 thrips), ce qui reste inférieur au seuil de nuisibilité.



Seuil de nuisibilité : 5 thrips par balayage

Analyse du risque :
Le risque serait de nouveau présent si des conditions orageuses se confirment.

Méthodes alternatives :
Aucune méthode alternative n'existe à ce jour

KABATIELLA LINI – COURBURE DE LA TIGE

C'est la principale maladie à surveiller à la sortie d'hiver. Sur 19 observations, il y a 15 parcelles où la courbure de la tige est signalée, allant de 5 à 55% (moyenne 14%) de pieds touchés, ce qui est stable par rapport à la semaine dernière. Remarquons que plus les sols sont filtrants, moins la courbure est signalée en général.



Seuil de nuisibilité : Sur septoriose et Courbure de la tige, il n'existe pas de « réel seuil »

Analyse du risque :
Les risques d'expression de la courbure sont plus importants en conditions très poussantes (terre réchauffée, humidité) car sont à l'origine de déchirements de l'épiderme, voies d'entrée possible de l'agent pathogène. La vigilance est donc recommandée lors du retour de conditions pluvieuses.

Méthodes alternatives :
La lutte est essentiellement préventive :

- Respect d'un intervalle d'au moins 6 ans entre deux lins
- Raisonnement des apports d'azote
- Nettoyage méticuleux des matériels de récolte
- Destruction des débris végétaux et des adventices

LIN FIBRE DE PRINTEMPS

Aucune parcelle enregistrée cette semaine. Les semis n'ont pas avancé par rapport à la semaine dernière, et il n'y a toujours pas d'urgence, rien ne presse entre des sols peu ressuyés et encore peu réchauffés.

Ce bulletin est une publication gratuite, réalisée en partenariat avec

Chambres d'agriculture, FREDON, DRAAF Normandie, DRAAF Hauts-de-France, producteurs, GRCETA 27, coopératives et teillages privés impliqués dans le réseau d'observation