Bulletin de Santé du Végétal

Lorraine

grandes cultures

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est et de la DRAAF

BSV n°5 – 11 mars 2026

À RETENIR CETTE SEMAINE

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement au paragraphe

DONNÉES MÉTÉO

CÉRÉALES À PAILLE

COLZA

NOTES BIODIVERSITÉ

Stade : Majoritairement aux stades fin tallage à épi 1cm.

Maladies : L'observation des maladies (oïdium, piétin verse) s'effectue à partir du stade épi 1 cm.

Stade : Inflorescence principale dégagée. Stade D2 (BBCH 53) majoritaire.

Bilan des dégâts larvaires d'altises en sortie d'hiver : Une parcelle sur deux avec des dégâts significatifs

Charançon de la tige du colza : Le risque a déjà dû être maitrisé.

Méligèthe : Infestation en hausse, évaluer le risque à l'échelle de la parcelle.

Ce logo est un indicateur sur les résistances aux substances actives couplées à un bioagresseur.

Vous trouverez des éléments complémentaires dans le lien ci-dessous :

Rapports techniques sur les résistances en France – R4P (r4p-inra.fr)

Parcelles observées cette semaine :

48 BTH, 39 OH, 48 Colza.

Prévisions météo à 7 jours :

(Source : Météo France, ville de Nancy, 10/03/2026 à 14h00. Retrouvez les données météo actualisées ici)

1 Stades phénologiques

Pour cette reprise d'observation BSV - sortie d'hiver 48 parcelles de blé et 39 d'orge d'hiver ont été observées. Ces parcelles sont majoritairement à mi-tallage à épi 1cm (BBCH 22-30).





Comment mesurer le stade épi 1cm ?

Sur une dizaine de plantes, observer seulement le maitre brin. Couper la tige en 2 dans le sens de la longueur et mesurer la distance entre le plateau de tallage et le haut de l'épi (à ne pas confondre avec des feuilles). Le stade épi 1 cm est prévu dans la majorité des situations mi-mars, soit en avance, d'après le modèle de prévision des stades Visiofarm Arvalis.



L'observation des maladies (oïdium, piétin verse) s'effectue à partir du stade épi 1 cm. Sur les quelques parcelles observées, la présence de piétin verse n'est pas signalée. Il en est de même pour l'oïdium avec une absence de la maladie sur la majorité des parcelles observées.

1 Stades phénologiques

Les stades continuent d'évoluer rapidement à la faveur des températures douces. Cette semaine, le stade majoritaire est à D2 (Inflorescence principale dégagée – stade BBCH 53).

Les toutes premières fleurs commencent à être observées dans les parcelles où des variétés pièges à méligèthes sont implantées. Dans ces situations, les règles de l'arrêté Abeilles-Pollinisateurs s'appliquent.

Répartition des stades du colza



Localisation des parcelles observées



2 Bilan des dégâts larvaires d'altises en sortie d'hiver

Sur les 15 parcelles ayant fait l'objet d'une observation spécifique pour ces dégâts, on note :

- 7 % des cas avec des dégâts rares ou nuls,
- 40 % des cas avec des dégâts faibles (sans gravité),
- 33 % des cas avec des dégâts assez élevés (gravité moyenne),
- 20 % des cas avec des dégâts élevés (gravité élevée).

3 Charançon de la tige du colza (*Ceutorhynchus napi*)

a. Observations

Le vol est généralisé sur le territoire lorrain et le pic de vol a été atteint fin de semaine dernière. Cette semaine, l'insecte est repéré dans 89 % des pièges avec en moyenne 13,5 insectes par piège actif. Cette moyenne assez élevée est tirée par l'enregistrement de fortes captures dans quelques parcelles et en particulier dans l'ouest vosgien et le nord de la région (voir carte).



Les dissections opérées par FREDON Grand Est indiquent que les femelles ont déjà pondu.



b. Seuil indicatif de risque

Il n'existe pas de seuil indicatif de risque en Lorraine. On considère qu'il y a un risque dès lors que sa présence est relevée sur la parcelle et après un délai de 8 à 10 jours (nécessaire à la maturation des femelles) du stade C2 à E (boutons séparés) inclus.

c. Analyse de risque

Le vol est généralisé sur le territoire. Le pic de vol a été atteint fin de semaine dernière et les dissections indiquent que les femelles ont déjà pondu. Le risque a déjà dû être maitrisé.



4 **Méligèthes** (*Meligethes sp.)*

a. Observations

L'insecte est repéré dans 25 parcelles sur 27 ayant fait l'objet d'une observation spécifique. Les niveaux d'infestation ont fortement augmenté, allant de 0,52 à 27 méligèthes par plante et avec entre 15 et 100 % de plantes porteuses. Les seuils indicatifs de risque pour des colza vigoureux (6 méligèthes/plante) sont atteints ou dépassés dans 64 % des cas.

b. Seuil indicatif de risque

La période de sensibilité aux méligèthes commence au stade D1 et s'étend jusqu'au stade E (boutons séparés).

Le risque se raisonne en fonction du stade de la culture, de sa capacité à compenser d'éventuelles pertes de boutons et de l'infestation du ravageur. Le tableau précise le seuil indicatif de risque pour chaque cas.

État de la culture	Stade boutons accolés (D1-BBCH50)	Stade boutons séparés (E-BBCH57)
Colza handicapé, peu vigoureux conditions peu favorables aux compensations	1 méligèthe/plante ou 50% plantes infestées	2-3 méligèthes/plante ou 65 à 75% plantes infestées
Colza sain et vigoureux bien implanté, sol profond et en absence de stress printanier significatif	En général pas d'intervention. Attendre stade E avant d'intervenir, si le seuil est dépassé.	6-9 méligèthes/plante

Le dénombrement des méligèthes sur plante est essentiel dans le raisonnement de la lutte : compter le nombre de méligèthes sur 5 x 5 plantes consécutives, puis calculer le nombre moyen de méligèthe par plante et le pourcentage de plantes infestées.
Attention, n'intégrez pas les plantes pièges (variétés précoces associées en mélange) dans votre comptage car vous risquez de surestimer la population présente.
Attention également, dès lors que des plantes sont en fleurs, l'arrêté Abeilles-Pollinisateurs s'applique.

c. Analyse de risque

La majorité des colzas est désormais sensible aux dégâts potentiels de méligèthes (présence de boutons floraux). L'insecte est présent en parcelle avec, dans certains cas, de fortes infestations, néanmoins les plantes pièges devraient entrer en floraison et ainsi jouer leur rôle. Le risque est à évaluer à l'échelle de la parcelle en fonction de l'état des colzas et du niveau d'infestation. Le risque est moyen à fort.



Les méligèthes sur colza sont exposés à un risque de résistance aux pyréthrinoïdes de synthèse.

d. Gestion alternative du risque

Dans les situations où les attaques de méligèthes sont généralement modérées l'association d'une variété haute et très précoce à floraison en mélange à 5-10 % avec la variété d'intérêt peut permettre de rester en-deçà des seuils indicatifs de risque.
Retrouver toutes les informations sur cette technique alternative dans la fiche Méligèthes sur colza.

NOTES BIODIVERSITÉ

Sommaire

Ces notes Biodiversité sont produites dans le cadre du projet global de réorientation du Bulletin Santé Végétal : BSV 2.0.

Vous pouvez également les retrouver sur le site EcophytoPIC.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles.
S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Observations : Alter Agro, Arvalis Institut du végétal, Avenir Agro, la Chambre d'Agriculture de Meurthe-et-Moselle, la Chambre d'Agriculture de la Meuse, la Chambre d'Agriculture de Moselle, la Chambre d'Agriculture des Vosges, la Coopérative Agricole Lorraine, El Marjollet, EMC2, EstAgri, EPL Agro, FREDON Grand Est, GPB Dieuze-Morhange, Hexagrain, LORCA, Sodipa Agri, Soufflet Agriculture, Terres Inovia, Vivescia.

Rédaction : Arvalis Institut du Végétal, FREDON Grand Est et Terres Inovia.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.
Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV.

Coordination et renseignements : Joliane BRAILLARD - joliane.braillard@grandest.chambagri.fr

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
OFB OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ
La stratégie écophyto 2030 Réduire et améliorer l'utilisation des phytos
CHAMBRE D'AGRICULTURE GRAND EST
ARVALIS
FREDON GRAND EST
Terres Inovia