



Grandes cultures

N°7
17/03/2026



Animateur filières
Céréales à paille / Maïs
Khalid KOUBAÏTI
FREDON Nouvelle-Aquitaine
khalid.koubaiti@fredon-na.fr

Oléagineux - Protéagineux
Solana VERA / Terres Inovia
s.vera@terresinovia.fr

Animateurs délégués

Céréales à paille / Maïs
Clément GRAS / ARVALIS
c.gras@arvalis.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre Régionale
Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

Supervision site de Poitiers

La stratégie

écophyto 2030

Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

**Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.**

**Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Grandes
cultures N°7 du 17/03/26 »**

Edition **Poitou-Charentes**

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT**
en cliquant sur [formulaire d'abonnement au BSV](#)

Ce qu'il faut retenir

Blé tendre

- **Stade** : épi 1cm ou 1 nœud (BBCH 30-31), les plus précoces sont à 2 nœuds (BBCH32).
- **Piétin verse** : à observer pour évaluer le risque notamment pour les variétés non résistantes.
- **Rouille jaune** : présente, à surveiller sur les variétés sensibles ([fiche de prélèvement pour analyse de la rouille jaune](#)).
- **Septoriose du blé** : présente, à surveiller à l'approche de 2 nœuds.

Orge d'hiver

- **Stade** : en majorité à épi 1cm ou 1 nœud (BBCH 30-31).
- **Helminthosporiose et Rhynchosporiose** : en développement, surveillez les parcelles en période de risque, notamment les variétés sensibles et précoces.

Pour information :

- Gestion des résistances aux fongicides : [note commune 2026 INRAE, Anses, Arvalis – Institut du Végétal](#)

Colza

- **Stade** : entre E et G1 (BBCH 55 et 70), majoritairement à F1 (BBCH 60).
- **Méligèthes** : à compter sur les plantes pour les parcelles sans fleur.
- **Pucerons cendrés** : à surveiller.
- **Sclérotinia** : repérer l'apparition du stade F1 (BBCH 60) pour anticiper le stade G1 (BBCH 70).
- **Autres bioagresseurs** : mycosphaerella.

Pois protéagineux de printemps

- **Stade** : semis en cours.



CEREALES A PAILLE

Après le léger rafraîchissement de la semaine passée le temps devient printanier (températures douces et ensoleillé). Un temps couvert, avec risque d'averses sur le côté est de Poitou-Charentes, est annoncé en fin de semaine.


Prévisions selon MétéoFrance pour les stations de :

	MERCREDI 18	JEUDI 19	VENDREDI 20	SAMEDI 21	DIMANCHE 22	LUNDI 23
Poitiers	 6° / 18° ▲ 20 km/h	 5° / 18° ▲ 20 km/h	 4° / 18° ▲ 20 km/h	 3° / 17° ▲ 15 km/h	 3° / 15° ▲ 15 km/h	 5° / 18° ► 10 km/h
Niort	 6° / 20° ▲ 30 km/h	 6° / 19° ◀ 20 km/h	 5° / 19° ▲ 20 km/h	 5° / 18° ▲ 15 km/h	 5° / 16° ▲ 15 km/h	 5° / 18° ► 10 km/h
Saintes	 6° / 21° ▲ 25 km/h	 7° / 19° ◀ 20 km/h	 6° / 20° ▲ 15 km/h	 4° / 17° ▲ 15 km/h	 5° / 17° ► 15 km/h	 4° / 18° ▼ 10 km/h
Angoulême	 6° / 23° ▲ 20 km/h	 7° / 21° ◀ 15 km/h	 5° / 21° ► 15 km/h	 3° / 17° ▲ 10 km/h	 4° / 16° ► 15 km/h	 5° / 18° ▼ 10 km/h

• Stade phénologique et état de la culture

En plaine, les stades sont très hétérogènes, allant de fin de tallage à 2 nœuds (selon les secteurs, dates de semis et les variétés).


Dans le réseau, les stades des blés varient de fin de tallage (BBCH 29) à 2 nœuds (BBCH 32), la majorité sont entre épi 1cm et 1 nœud (BBCH 30-31).



Ne pas confondre stade épi 1 cm et redressement

Pour éviter de confondre redressement et stade épi 1 cm, prélever une vingtaine de plantes dans une zone homogène de la parcelle, en évitant les passages de roues et les bordures, observer une 10aine de maîtres-brins (tige la plus développée de la plante) en fendant la tige au cutter. Mesurer la longueur entre le sommet de l'épi et le plateau de tallage sur chaque maître brin et faire la moyenne de ces mesures. Cette moyenne permettra de savoir si le stade épi 1 cm est atteint.

Stade épi 1cm : **le sommet de l'épi est à 1 cm de la base du plateau** de tallage sur au moins la moitié des tiges mesurées.




Source Vigicultures

• Rappel pour les maladies foliaires du blé

Période de risque pour les maladies du blé

Rouille Jaune	Rouille Brune	Septoriose
A partir d'épi 1 cm	A partir de 2 nœuds	A partir de 2 nœuds



• Piétin verse

La présence du piétin verse est notée dans 2 des 21 parcelles observées du réseau. Le taux d'attaque dans ces parcelles est de 5 et 10 %.

Le piétin verse est un champignon du bas de la tige favorisé par les rotations contenant fréquemment du blé, des variétés sensibles (note strictement inférieure à 5), des semis précoces et des sols à dominance de limons. Dans une moindre mesure, le labour peut être favorable s'il remonte les résidus en surface. Une pluviométrie à fréquence élevée et les températures douces pendant l'automne et l'hiver favorisent l'évolution de la maladie.

Les premiers symptômes, se développant sur gaine à partir du stade épi 1 cm, sont signalés dans quelques parcelles (les plus avancées).

Cette maladie se présente généralement sous la forme d'une seule tâche, plus rarement deux. La limite de la tâche est floue. Elle se situe sous le premier nœud. Présence de plaques noires (stromas) sur les gaines proches de la tige (soulever la première gaine).



Photo FREDON-NA

Le champignon peut être facilement confondu avec le rhizoctone, en cas de doute, consultez les fiches Accidents : <http://www.fiches.arvalis->

Bien qu'il soit encore trop tôt pour déceler ces symptômes dans les parcelles les plus favorables à cette maladie, le risque peut déjà être estimé grâce à **la grille de risque (ci-dessous) qui tient compte des différents effets (sol et climat) et la sensibilité variétale.**

Grille d'évaluation du risque piétin verse :

Effet variétal

Tolérance variétale

Note CTPS >= 5

Note CTPS 1 ou 2

Note CTPS 3 ou 4

Risque faible : aucune intervention

4

3

+

Potentiel infectieux

Précédent

Blé

Autre

Travail du sol

Labour

Non labour

1

0

1

0

+

Milieu physique

Type de sol :

Limon battant, Limon battant hydromorphe, Terre rouge à châtaigniers, Limon argileux profond assez battant, Limon argileux caillouteux superficiel sur argile à silex.	2
Argilo-calcaires profonds (groie moyenne à profonde), Champagne, Aubue profonde et moyenne, Doucin argileux, Alluvions sablo argileuses caillouteuses, Limon profond sur schistes non battants. Limon argileux non battant	1
Argile, Argilo calcaire superficiel (groie superficielle), Sables sains, Marais, Sable limoneux/granite.	0

+

Effet climatique

Effet année issu du modèle TOP

Indice TOP inférieur à

30

-1

Indice TOP entre

30 et 45

1

Indice TOP supérieur à

45

2

=

Score de risque final

Risque final / conseil associé

0

risque FAIBLE

1

Aucune intervention n'est requise

2

3

4

5

6

7

risque MOYEN :

Observation conseillée et traitement si plus de 35% de tiges touchées ou si présence de la maladie sur la parcelle les années passées

8

9

risque FORT :

Traitement conseillé

10

ARVALIS-Institut du végétal 2017

Effet variétal : les variétés dont la note de sensibilité est supérieure ou égale à 5 ne nécessitent pas de protection même en situation à risque. Dans la région les variétés comme **ADVISOR**, **GERRY**, **INTENSITY**, **KWS SPHERE**, **KWS ULTIM**, **LG ABSALON**, **LG AIKIDO**, **PRESTANCE** et **SY ADMIRATION** sont exemptes d’une intervention spécifique. Pour déterminer la classe de sensibilité des autres variétés de blé tendre au piétin-verse, consultez le site [Fiches Arvalis](#) infos.

Effet climatique : il a une valeur moyenne pluriannuelle de 1 pour la région mais doit être estimé chaque année par le modèle Top.

Top est un modèle climatique calculé pour une situation agronomique avec un risque « important ». Le sol retenu est du type « limon » ou « limon argileux » autre que « battant » ou « très battant ». Le modèle est basé sur les températures moyennes et pluviométries journalières.

Indice TOP de risque climatique au stade épi 1 cm du blé tendre (au 17 mars 2026)

Variété	Localité	Cumul modèle TOP semis 15/10	Cumul modèle TOP semis 10/11
LG ABSALON Préco épiaison 6.5 Préco montaison 3	NIORT	39	39
	POITIERS	35	35
	CHALAIS -RIOUX- MARTIN	28	26
	SAINTES	39	32
CELEBRITY Préco épiaison 7 Préco montaison 3	NIORT	32	32
	POITIERS	35	27
	CHALAIS -RIOUX- MARTIN	28	26
	SAINTES	32	32
PRESTANCE Préco épiaison 7.5 Préco montaison 6	NIORT	32	32
	POITIERS	27	27
	CHALAIS -RIOUX- MARTIN	26	26
	SAINTES	32	32

L’indice de risque dépasse 30 sans excéder 45 pour la majorité des semis ce qui induit une note pour l’effet climatique de la grille de 1.

Résistance des variétés de blé tendre au piétin verse - échelle 2025

Références

Nouveautés et variétés récentes

Assez résistants

				8	PAILLEDOR				
				7	GEOPOLIS	KWS GLOBE	LID MACUMBA	SU HYBISCUS	SU PULSION
					SU SAUVIGNON				
LG AUDACE	KWS ULTIM	KWS SPHERE	INTENSITY		BELZEBUTH	CHAMDOR	KARABOL	KWS ETOILE	LG AERO
	SU HYREAL	RGT LUXEO	PRESTANCE	6	LG NIKLAS	OUTDOOR	RGT LOOKEO	SU ELECTRON	SU HISTORIC
					THERMIDOR	WPB MEDINA			
				5	CONQUISTADOR	FABULOR	GODZILLA	KAKTUS	LG ACROBAT
					LID PAVANE	RGT PROFUSIO	SU HYANKEE	SU HYLORD	
Moyennement sensibles				4	INTRODUCTOR	RGT NOBELLO			
	SY TRANSITION	PIBRAC	KWS ASTRUM		ACADEMY	AUCHY	FACILITY	GENERIK	KARDIGAN
KAROQUE	JERIKO	COMPLICE	CHEVIGNON	2.6	KINGKONG	KWS MILLESIME	RGT FARMEO	RGT INDEXO	RGT KOESIO
RGT PROPULSO	RGT LETSGO	KWS EXTASE	KWS ERRUPTIUM		RGT MAJESKO	RGT SUNDEO	RGT VALPARAISO	SPIROU	SU MASTER
					SHREK				
Très sensibles				2	ACCOMPLY	OLAF	SU HORIZON	SU HYCLASS	
LG ABILENE	KWS PERCEPTIUM	CELEBRITY	BALZAC						
	RGT TWEETEO	RGT PACTEO	LG ABRAZO						

() à confirmer

Source des données : CTPS/GEVES

Évaluation du risque

Le risque est faible pour les variétés dont la note de sensibilité est supérieure ou égale à 5.

Pour les autres variétés approchant le stade épi 1 cm : il est nécessaire d'observer les symptômes de cette maladie et d'évaluer le risque agronomique (grille ci-dessus) rapidement.

Surveillez en priorité les parcelles **semées précocement** en terres de limons avec un retour fréquent de blé (tous les deux ans).



Méthodes alternatives.


En situation agronomique à risque, privilégier les variétés tolérantes au piétin-verse (note GEVES ≥ à 5).

• Rouille jaune


Observée dans 2 parcelles en Deux-Sèvres sur Ascott et Celibrity (aux stades BBCH 31 et 32). 2 parcelles sont signalées la semaine précédente en Charente-Maritime sur la variété Prestance.

L'évolution de l'indice de rouille jaune selon le modèle est proche de celle de l'année de référence haute pour les semis précoces. Le modèle permet une description de l'épidémie à partir du climat hivernal de l'année, sans prendre en compte la sensibilité variétale.


Rouille Jaune - Parcelle : LG ABSALON 1510 POITIERS,
Station POITIERS -BIARD - Date de semis 15/10,
Année Haute 2014 - Année Basse 2006




Rouille Jaune - Parcelle : LG ABSALON 1510 CHALAIS -RI
Station CHALAIS -RIOUX-MARTIN - Date de semis 15/10,
Année Haute 2014 - Année Basse 2006



Rouille Jaune - Parcelle : LG ABSALON 1510 NIORT,
Station NIORT SOUCHE - Date de semis 15/10,
Année Haute 2014 - Année Basse 2006



Rouille Jaune - Parcelle : LG ABSALON 1510 SAINTES,
Station SAINTES - Date de semis 15/10,
Année Haute 2014 - Année Basse 2006



Période de risque : à partir du stade « épi 1 cm ».

Seuil indicatif du risque :

- Pour les variétés résistantes (note ≥ 7) et à partir du stade 2 nœuds: si présence de pustules.
- Pour les variétés sensibles (note ≤ 6) et les mélanges variétaux dès qu'il y a une variété sensible dans le mélange :
 - Au stade «épi 1cm» uniquement en présence de foyer actif de rouille jaune (pustule pulvérulente).
 - Au stade «1 nœud», dès la présence des premières pustules dans la parcelle.

Cette année, la surveillance doit être d'autant plus importante à la suite de l'arrivée de deux nouveaux pathotypes (V17ANemoVChévignon et Champion). Certaines variétés connues comme résistantes jusqu'à présent pourraient présenter des symptômes.

Concrètement, toutes les variétés sont à surveiller et en particulier les variétés suivantes pour la région : Academy, Arcachon, Balzac, Belzebuth, Chévignon, Facility, Forcali, Intensity, Jeriko, Kardigan, Kws Millesime, KWS Ultim, Lg Acrobat, Lg Anouk, Rgt Valparaíso, Spirou.

En cas de présence sur ces variétés un prélèvement (de 7 à 8 feuilles de blé avec des lésions bien sporulantes par parcelle de préférence non traitées les jours précédents, ensachées dans une enveloppe papier) serait utile pour vérifier l'évolution des pathotypes.

[Télécharger la fiche de renseignement nécessaire pour l'envoi d'échantillons au laboratoire INRAE - UR1290 BIOGER.](#)

Évaluation du risque

En présence de symptôme, le risque est fort.

Il convient de rester vigilant et de surveiller d'éventuelles apparitions de symptômes.

Surveillez en priorité les variétés sensibles.

• **Septoriose**

Elle est présente sur les feuilles basses dans de nombreuses parcelles (7 des 24 observées) mais ce n'est qu'à partir du stade 2 nœuds que sa progression vers les feuilles supérieures impacte le potentiel. Cependant, 2 parcelles du réseau sont à 2 nœuds et la septoriose est notée dans l'une des 2 parcelles (avec une variété peu sensible) sur 50 % des F2 du moment.

Période de risque : à partir du stade « 2 nœuds ».

Seuil indicatif du risque :

- Variétés sensibles : si plus de 20 % des feuilles F4 définitives (=la F2 du moment au stade 2 nœuds) présentent des symptômes (4 feuilles sur 20).
- Variétés peu sensibles : si plus de 50 % des feuilles F4 définitives présentent des symptômes.
- Pour les parcelles à base de mélange variétal de différentes sensibilités à cette maladie, il n'existe pas de seuil de référence. Il convient de diminuer le risque au prorata du taux des variétés tolérantes dans votre mélange. Ainsi, la décision de protection contre cette maladie doit être raisonnée en fonction de vos observations (sur un échantillon plus important que pour les mono- variétés) et le niveau moyen de sensibilité des variétés en mélange.

Évaluation du risque

La majorité des blés d'hiver n'ont pas atteint le stade 2 nœuds, seuls les blés tendres précoces semés en octobre arrivent à la période de risque. Les prévisions climatiques des prochains jours sont peu favorables à de nouvelles contaminations, mais le risque lié à cette maladie n'est à prendre en considération qu'à partir du stade 2 nœuds.

Surveillez l'apparition des symptômes à partir du stade 2 nœuds.

Ce risque doit être évalué par l'observation, **sur des 3 derniers étages foliaires**, en fonction de la sensibilité variétale.

Surveillez en priorité les variétés sensibles, semées en octobre.




Méthodes alternatives. Des produits de biocontrôle existent :

Les produits de biocontrôle sont listés dans la note de service DGAL/SDSPV/ 2026-72 datant du 11/02/26. [Téléchargez la liste](#).

• Stade phénologique et état de la culture

Les orges d'hiver du réseau sont en majorité à épi 1cm (BBCH 30) évoluant vers 1 nœud (BBCH 31), mais les stades varient de fin de tallage à 2 nœuds (BBCH 29 - 32).



• Rappel pour les maladies foliaires

Période et seuil indicatif du risque pour les maladies :

	Helminthosporiose	Rhynchosporiose	Rouille Naine
Période de risque	A partir de 1 nœud	A partir de 1 nœud	A partir de 1 nœud
Seuil indicatif de risque	<u>Variétés sensibles</u> : Plus de 10% des feuilles atteintes <u>Variétés moyennement et peu sensibles</u> : Plus de 25% des feuilles atteintes.	<u>Variétés sensibles</u> : plus de 10% des feuilles atteintes et plus de 5 jours avec pluies > 1mm depuis le stade « 1 nœud » <u>Variétés moyennement et peu sensibles</u> : plus de 10% des feuilles atteintes et plus de 7 jours avec pluies > 1mm depuis le stade « 1 nœud »	<u>Variétés sensibles</u> : Plus de 10% des feuilles atteintes <u>Variétés moyennement et peu sensibles</u> : Plus de 50% des feuilles atteintes.
	Comptabiliser ensemble les tâches de Rhynchosporiose et d'Helminthosporiose dès le stade « 1 nœud » : ⇒ Si la somme des feuilles atteintes par l'une ou l'autre des maladies dépasse 10 ou 25% (selon la sensibilité variétale), le seuil est atteint		

• Rhynchosporiose de l'orge

Elle est présente dans 1 des 10 parcelles observées cette semaine. Cette parcelle est au stade 2 nœuds avec une variété assez à peu sensible.

Période de risque : du stade « 1 nœud » (31) au stade « sortie des barbes » (49).

Seuil indicatif du risque :

- Variétés sensibles : plus de 10 % des feuilles atteintes et plus de 5 jours avec pluies > 1 mm depuis le stade « 1 nœud » (31).
- Variétés moyennement et peu sensibles : plus de 10 % des feuilles atteintes et plus de 7 jours avec pluies > 1 mm depuis le stade « 1 nœud » (31).

Évaluation du risque

Les orges précoces arrivent en période de risque. Les faibles précipitations annoncées rendent le risque pour de nouvelles contaminations faible.

Le délai d'incubation très long (30 jours environ) impose de rester vigilant. Les symptômes sont en cours d'apparition. Observez vos parcelles.

Pour les parcelles ayant atteint le stade 1 nœud (31), en cas de présence également d'helminthosporiose, le risque est à évaluer en comptabilisant l'ensemble des taches de ces deux maladies dès le stade « 1 nœud » (si la somme des feuilles atteintes par l'une ou l'autre des maladies dépasse 10 ou 25 % (selon la sensibilité variétale), le seuil est atteint.

• **Helminthosporiose de l'orge**

Cette maladie est observée dans 2 des 8 parcelles, dont une est au stade 2 nœuds, mais étant peu sensible le seuil indicatif du risque n'est pas encore atteint.

Les symptômes d'helminthosporiose sont en cours de développement.

Période de risque : du stade « 1 nœud » (31) au stade « gaine éclatée » (47).

Seuil indicatif du risque :

- Variétés sensibles : plus de 10 % des feuilles atteintes.
- Variétés moyennement et peu sensibles : plus de 25 % des feuilles atteintes.

Évaluation du risque

Certaines parcelles sont en période de risque. Les conditions climatiques de la semaine dernière ont été favorables à cette maladie qui est en cours d'incubation sur les feuilles basses. Le risque est modéré pour les parcelles en période de risque. **Observez vos parcelles.**

Pour les parcelles ayant atteint le stade 1 nœud (31), en cas de présence également de Rhynchosporiose, le risque est à évaluer en comptabilisant l'ensemble des taches de ces deux maladies dès le stade « 1 nœud » (si la somme des feuilles atteintes par l'une ou l'autre des maladies dépasse 10 ou 25 % (selon la sensibilité variétale), le seuil est atteint.



Méthodes alternatives.

Choix variétal : privilégier les variétés présentant une bonne tolérance Note >6.

• **Rouille naine de l'orge :**

Non encore observée dans les parcelles du réseau. La douceur de fin février début mars est favorable à la maladie, à surveiller dès l'approche du stade 1 nœud.

Période de risque : du stade « 1 nœud » (31) au stade « gaine éclatée » (47).

Seuil indicatif du risque :

- Variétés sensibles : Plus de 10% des feuilles atteintes,
- Variétés moyennement et peu sensibles : Plus de 50% des feuilles atteintes.

• **Évaluation du risque**

Certaines parcelles sont au stade 1 nœud et le **risque peut évoluer** dans ces parcelles. Surveillez les variétés sensibles en période de risque.

Guide de l'observateur Céréales à paille pour vous aider

Un guide de l'Observateur *céréales à paille* a été édité par le réseau des BSV Grandes cultures Nouvelle-Aquitaine. Il permet de mettre en place des observations sur votre exploitation, avec des protocoles d'observations pour chaque pathogène, des détails et photos d'identifications, des astuces d'observations et des éléments de comparaison avec d'autres pathogènes. Vous y trouverez aussi des informations sur les facteurs favorisant le pathogène et les méthodes prophylactiques à mettre en place pour limiter l'installation ou le développement du pathogène. Ce guide est composé à la fois :

- de fiches générales qui rappellent les bonnes pratiques d'observations, les outils d'aides à l'analyse de risque (modèles, grille de risques...),
- de fiches individuelles par bio-agresseur qui permettent d'identifier les bio-agresseurs et leurs symptômes, d'éviter les confusions, pour affiner l'analyse de risque et la gestion des parcelles.

Vous pouvez **télécharger le guide complet et/ou les fiches individualisées par pathogène** : [Guide observateur céréales à paille](#).




Les notes nationales de biodiversité à découvrir : [Coléoptères & santé des agro-écosystèmes](#).


- **Météo** ([cliquez ici](#))
- **Stade phénologique et état de la culture**

38 parcelles du réseau Poitou-Charentes sont observées cette semaine.

Cette semaine la majorité des parcelles a débuté la floraison : 61% des parcelles sont au stade F1 « début floraison, 1ère fleur ouverte », la parcelle est verte et 21% au stade F2 « allongement de la hampe florale, nombreuses fleurs ouvertes ».



Carte des parcelles de colza observées du 11 au 17 mars 2026
(Terres Inovia)



Rappel des stades

Stade E (BBCH 55) : « Boutons séparés avec des pédoncules floraux allongés et inflorescences secondaires déagagées ».

Stade F1 (BBCH 60) : « début floraison, 1ère fleur ouverte », la parcelle est verte ».

Stade F2 (BBCH 61) : « Allongement de la hampe florale, nombreuses fleurs ouvertes ».

Stade G1 (BBCH 70) : « Chute des premiers pétales. Les 10 premières siliques ont une longueur inférieure à 2 cm ».



Stades du colza

(Crédit Photo : Terres Inovia)

• Méligèthes

L'activité des méligèthes se poursuit cette semaine. Sur 10 parcelles de colza renseignées :

- 5 parcelles ont entre 1,5 et 3 méligèthes par plante
- 2 parcelles ont 4 et 5 méligèthes par plante
- 2 parcelles ont entre 6 et 7 méligèthes par plante
- 1 parcelle a 10 méligèthes par plante

Les parcelles concernées sont entre les stades E et F1.

L'observation par le dénombrement sur les plantes est obligatoire pour les parcelles sans fleurs.

Présence des méligèthes par stade :

Période	Stade50	Nombre de parcelles	Moyenne	Mini	Maxi
BSV n°7 17/03/2026	E	5	4,70	1,50	10,00
BSV n°6 10/03/2026	D2	3	7	5	9
	E	9	3,94	0,5	6
BSV n°5 03-mars-26	D2	7	3,29	2	5
	E	5	2,15	0,25	5
BSV n°4 24-févr-26	D1	2	2	2	2
	D2	1	2	2	2

Rappel : Les adultes de méligèthes perforent les boutons floraux du colza pour se nourrir du pollen et également pour pondre mais les larves n'ont aucune incidence sur le développement du bouton. Les adultes en endommageant le pistil, provoquent l'avortement des boutons floraux. **Cependant, dès l'apparition**

des premières fleurs, ils ne sont plus nuisibles car le pollen est accessible et ces insectes deviennent au contraire des pollinisateurs.

Les populations de méléigèthes sont régulées par de nombreux prédateurs notamment des hyménoptères (petites abeilles) qu'il convient de préserver pour jouer leur rôle de régulateur.

Période de risque : du stade D1 (boutons accolés) au début de la floraison F1.

Seuil indicatif de risque : il dépend du stade et de la vigueur du colza :

Etat du colza	Stades du colza	
	Stade boutons accolés (D1)	Stade boutons séparés (E)
Colza vigoureux (sol profond, bonne vigueur des plantes, peuplement optimal, pas d'autres dégâts)	3 méléigèthes par plante, <i>mais il est aussi possible d'attendre le stade E selon le contexte de croissance de l'année pour ré-évaluer le risque plus tard.</i>	6 à 9 méléigèthes par plante
Colza stressé ou peu développé (climat stressant, déficit hydrique, peuplement trop faible ou trop important, vigueur faible des plantes, autres dégâts)	1 méléigèthe par plante	2 à 3 méléigèthes par plante

Évaluation du risque

L'activité des méléigèthes se poursuit en Poitou-Charentes, avec les informations disponibles :

- Pour les colzas **vigoureux ou en fleurs**, le risque est actuellement **faible**.
- Pour les **colzas stressés ou peu développés**, le risque est **modéré**.

Le comptage des méléigèthes dans les parcelles sans fleur reste prioritaire.

Le dénombrement sur plante est le seul moyen pour définir le risque. Il doit se combiner en plus avec le stade de la culture et l'état du couvert.



Attention : les méléigèthes sont résistants à la plupart des pyréthrinoïdes actuels.



Méthodes alternatives : Mélange variétal

La stratégie de lutte vis-à-vis des méléigèthes vise à maintenir la population à un niveau tolérable (et non à l'éradiquer) pour que la floraison puisse s'engager sans retard important et que les compensations puissent s'exprimer au maximum. Le colza est une plante présentant d'importantes capacités de compensation. Lorsque la culture est vigoureuse, elle peut faire face à des attaques de méléigèthes même très fortes.

Dans les situations où les attaques de méléigèthes sont généralement faibles à modérées, **l'association d'une variété haute et très précoce à floraison** en mélange à 5-10% avec la variété d'intérêt peut permettre de rester en dessous des seuils d'intervention. Cette variété haute et très précoce sera en effet **plus attractive** pour les méléigèthes « protégeant » ainsi les plantes de la variété d'intérêt.

Dans les situations à forte pression, les plantes pièges ne seront pas suffisantes.

Pour aller plus loin :

[Surveillance et lutte contre le méléigèthe](#)

- **Pucerons cendrés**

Observations terrain

Une observation (sur 14 parcelles renseignées) de pucerons cendrés en bordure est signalée dans une parcelle de colza située à BREUIL-LA-RÉORTE (17).

Avec la limitation des solutions efficaces pour la prise en compte du risque pucerons cendrés lorsque les colonies sont bien implantées, il est encore plus important de diagnostiquer plus tôt le début des infestations.

Période de risque : A partir de la montaison jusqu'à la fin du stade G4 (10 premières siliques sont bosselées).

Seuil indicatif de risque : 2 colonies présentes par m² de culture.

Évaluation du risque

Avec les données disponibles le risque est **nul** à ce jour.

La présence d'auxiliaires est à prendre en compte dans la limitation du développement des insectes en parcelle.


Pour rappel : différence entre colonie et manchon



Colonie de pucerons (une dizaine d'individus ; photos de gauche) et manchon (plusieurs générations ; photo de droite)
(Terres Inovia)

• Sclérotinia

Il est important de repérer le stade F1 pour pouvoir anticiper l'apparition du stade G1 qui marque le début de la période de risque vis-à-vis du sclérotinia. La date d'apparition du stade F1 varie selon la précocité à floraison des variétés ainsi que le contexte pédoclimatique. En fonction des températures, le colza mettra de 6 à 12 jours pour passer du F1 au stade G1 (100 dj, base 0).



Période de risque : à partir de la chute des pétales (BBCH 70) jusqu'à la fin de la floraison.

• Autres bioagresseurs

Mycosphaerella

La maladie est observée sur feuilles dans 4 parcelles cette semaine (sur 8 parcelles renseignées), les parcelles concernées sont situées en Charente-Maritime.

Lors de la prise en compte du risque sclérotinia au stade G1 (BBCH 70), il faudra également considérer la présence de mycosphaerella.

Le risque lié à cette maladie est faible actuellement.

Pois protéagineux de printemps

- **Stade**

Les parcelles de pois de printemps sont en cours de semis en Poitou-Charentes.

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine Grandes cultures / Edition Poitou-Charentes sont les suivantes : Agriculteurs, Agri Distri Services, ARVALIS INSTITUT DU VEGETAL, Bien aimé négoce, CA 17, CA79, CA86, CAP Faye sur Ardin, CAVAC, CAVAC Villejeus, CEA Loulay, Coop La Tricherie, Coop de Mansle-Aunac, Coop Saint Pierre de Juillers, Coop Sèvre et Belle, Ets Lamy, FDCETA 17, FREDON N-A, Lycée Xavier Bernard, NEOLIS, OCEALIA, Soufflet Agriculture, Terre Atlantique, Terrena Innovation, Terres Inovia.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).