

N°3

Date de publication  
29/07/2026

Date d'observation  
28/07/2026

## Flash suivis foreurs du maïs

Financé dans le cadre  
de la stratégie **écophyto**

  
**GOVERNEMENT**  
*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

### À retenir cette semaine



Maïs

Ce Flash Foreurs Maïs vient en complément du Bulletin de Santé du Végétal (BSV) Grandes Cultures. Il a pour objectif de suivre spécifiquement l'évolution des principaux ravageurs foreurs du maïs au cours de la campagne et de fournir des informations actualisées et localisées.

Sont particulièrement ciblés :

- ❖ La pyrale du maïs (*Ostrinia nubilalis*),
- ❖ La sésamie (*Sesamia nonagrioides*),
- ❖ *Heliothis/Helicoverpa* (*Helicoverpa armigera*),

Ce qu'il faut retenir :

- ❖ **Pyrales** : vol G2 en cours sur les secteurs de la Bresse, Dombes, et Savoie. Le pic semble passé sur la Drôme, Plaine de l'Ain, Grésivaudan et Plaine de Lyon. Les températures très élevées ne sont pas favorables aux vols ni aux pontes.
- ❖ **Sésamies** : pic de vol en cours dans la Drôme et sur les secteurs chauds de l'Ain, Rhône, Savoie, et Isère. Les températures élevées ne sont pas favorables aux vols ni aux pontes
- ❖ Les températures élevées de cet été pourraient favoriser une 3ème génération de pyrales et de sésamies en fin d'été.
- ❖ **Héliothis** : vols en baisse sur l'ensemble du réseau, les maïs semences en cours de floraison sont les plus exposés au risque.



## Pyrales

Le vol de G2 est en cours sur les secteurs Bresse, Dombes, Forez et Combes de Savoie tandis que le pic de vol semble être passé la semaine dernière pour les secteurs Drôme, Grésivaudan, Plaine de L'Ain et de Lyon. Le risque reste modéré pour les secteurs où les vols sont en cours, et faible pour ceux où le pic a été atteint précédemment. La remontée importante des températures n'est pas favorable aux vols ni au dépôt de pontes.

Plusieurs parcelles observent des attaques sur pieds de l'ordre de 3 à 15%.

Pour rappel, les pyrales G2 favoriseront les maïs les moins avancés pour déposer leur ponte. Les parcelles les moins avancées en stade sont donc les plus exposées.

### Analyse de risque



« Méthodes alternatives : Des produits de biocontrôle existent. » La liste des produits phyt  taires de biocontrôle est consultable sur :

<https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrôle>



**Titre :** Pyrale




**Description :** Développement du fusarium section liseola à partir des grains touchés par les larves.



**Titre :** Pyrale

**Description :** Dégâts sur tige : casse des tiges et chute d'épis

| Semaine                        | 21                            | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |
|--------------------------------|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Pyrales nb papillons Phéromone |                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Drôme                          | CHABEUIL                      | 0  | 7  | 32 | 8  | 5  | 4  | 5  | 9  | 2  | 13 | 23 |
|                                | ÉTOILE-SUR-RHÔNE              | 0  | 2  | 10 | 25 | 4  | 5  | 2  | 8  | 17 | 27 | 19 |
|                                | EYMEUX 2                      | 0  | 1  | 1  | 0  | 8  | 3  | 3  | 0  |    |    | 2  |
|                                | EYMEUX 1                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 2  |    |    | 2  |
|                                | GRANE (devant boyer)          | 4  | 8  |    | 4  |    |    | 3  |    | 1  | 12 | 3  |
|                                | GRANE (Lemot)                 |    |    |    | 1  | 9  |    | 2  |    | 3  | 6  | 6  |
|                                | BONLIEU-SUR-ROUBION           |    | 0  |    | 1  |    | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|                                | CREST                         |    |    |    |    | 0  | 0  |    | 0  | 0  | 2  | 4  |
|                                | ROCHEBAUDIN                   | 0  |    | 2  | 1  |    | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|                                | MONTYENDRE                    |    |    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | 1  |
|                                | PIERRELATTE                   |    |    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|                                | SAINT-JEAN-DE-GALAURE         |    |    |    |    | 0  | 0  | 0  | 4  | 6  | 5  | 7  |
| SAUZET                         |                               |    |    |    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |    |
| Isère                          | BEAUCROISSANT                 |    | 1  | 1  | 1  | 1  |    |    | 0  | 0  | 2  | 3  |
|                                | BEAUREPAIRE                   | 1  | 1  |    | 10 | 32 | 1  |    | 29 | 7  | 5  | 6  |
|                                | BOURGOIN-JALLIEU              | 0  | 0  | 0  | 15 | 23 | 6  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  |
|                                | FRONTONAS                     | 1  | 0  | 3  | 6  | 3  | 2  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  |
|                                | JANNEYRIAS (maïs grain)       | 1  | 0  | 4  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|                                | ORNACIEUX-BALBINS             | 1  | 0  | 2  | 6  | 3  | 14 | 0  | 0  |    | 0  | 0  |
|                                | SATOLAS-ET-BONCE              | 1  | 0  | 2  | 5  | 4  | 0  | 0  | 0  |    | 4  | 0  |
|                                | THODURE                       | 0  | 0  | 8  | 11 | 8  | 14 | 7  | 3  | 4  |    | 1  |
|                                | JANNEYRIAS (maïs semence)     |    |    |    | 4  | 0  | 2  | 0  | 1  | 0  | 7  | 6  |
|                                | SAINT-ROMANS                  |    |    |    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | 3  |
| SARDIEU                        |                               |    |    | 3  | 0  | 9  | 0  | 6  | 8  | 12 | 7  |    |
| Rhône                          | AMBÉRIEUX                     | 7  | 5  | 0  |    | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 2  |
|                                | QUINCIEUX                     | 0  | 1  | 0  |    | 3  | 0  | 0  | 0  | 1  | 2  | 9  |
|                                | CHAPONNAY                     | 0  | 5  | 0  | 8  | 2  | 6  | 2  | 0  | 1  | 7  | 4  |
|                                | COMMUNAY                      | 0  | 0  | 0  | 3  | 10 | 0  | 1  |    | 0  | 18 | 12 |
|                                | PUSIGNAN                      | 0  |    | 54 | 34 | 3  | 0  | 0  |    | 0  | 9  | 7  |
|                                | SAINT-BONNET-DE-MURE          | 0  | 0  | 2  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|                                | VALSERHÔNE (piège phéromones) |    |    |    |    | 0  |    |    |    |    |    |    |
| VALSERHÔNE (piège lumineux)    |                               |    |    |    | 0  |    |    |    |    |    |    |    |
| Ain                            | BIRIEUX                       | 0  |    | 3  | 1  | 3  | 7  | 8  | 2  | 8  | 0  | 8  |
|                                | BOURG-EN-BRESSE               | 0  | 2  | 2  | 0  | 7  | 3  | 1  | 0  |    |    |    |
|                                | LOYETTES                      | 4  | 7  | 27 | 36 | 8  | 0  | 0  |    | 0  | 0  | 1  |
|                                | PÉROUGES (maïs pérouges)      | 0  |    | 10 | 20 | 10 | 0  | 3  |    | 0  | 0  | 1  |
|                                | PÉROUGES (BSV maïs BSC)       | 1  | 11 | 5  | 11 |    | 4  | 0  | 0  | 1  | 2  |    |
|                                | SAINT-CYR-SUR-MENTHON         | 3  | 15 | 2  | 49 | 7  | 9  | 0  | 2  | 0  | 2  |    |
|                                | SAINT-JEAN-SUR-VEYLE          | 0  |    | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|                                | SAINT-JUST                    | 1  | 2  | 13 | 9  | 4  | 2  | 1  | 3  |    |    |    |
|                                | VILLENEUVE                    | 0  | 3  | 3  | 4  | 2  |    | 0  |    | 1  |    |    |
|                                | VILLENEUVE                    | 0  |    | 1  |    | 1  |    |    |    |    |    |    |
| Savoie                         | SAINTE-HÉLÈNE-DU-LAC          |    |    |    | 5  | 1  |    |    | 14 | 1  |    |    |
| Ardèche                        | SAINT-VINCENT-DE-BARRÈS       |    |    |    |    | 0  | 1  | 1  |    | 1  | 4  |    |



## Sésamies

Dans la Drôme le pic de vol est probablement en cours avec des captures importantes. Il est également probable que le pic de vol de G2 soit atteint sur les secteurs chauds de l'Ain, Rhône, Savoie, et Isère.

Les températures très élevées des prochains jours ne seront pas favorables aux vols ni au dépôt de pontes.

| Semaine                         | 21                              | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31  |
|---------------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Sésamies nb papillons Phéromone |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| Drôme                           | CHABEUIL                        | 0  | 9  | 9  | 3  | 1  | 2  |    | 52 | 76 | 263 |
|                                 | BONLIEU                         |    | 0  |    |    |    |    |    |    |    | 350 |
|                                 | ÉTOILE-SUR-RHÔNE                | 1  | 3  | 11 | 10 | 12 | 4  | 0  |    | 4  | 10  |
|                                 | EYMEUX 2                        | 3  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |    | 0   |
|                                 | EYMEUX 1                        | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |    | 0   |
|                                 | GRANE (devant boyer)            | 0  | 1  |    | 0  |    |    |    | 0  | 2  | 4   |
|                                 | GRANE (Lemot)                   |    |    |    | 0  | 0  | 1  |    | 0  | 0  | 0   |
|                                 | ROCHEBAUDIN                     | 0  | 0  | 0  | 0  |    | 0  | 0  | 0  | 0  | 3   |
|                                 | BONLIEU-SUR-ROUBION             |    |    | 0  | 0  |    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
|                                 | BEAUVALLON                      |    |    | 0  | 1  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   |
| Isère                           | PIERRELATTE                     |    |    | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3   |
|                                 | ROYNAC                          |    |    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 11 | 3  | 9   |
|                                 | BEAUCROISSANT                   |    |    | 0  | 0  | 0  |    | 0  | 3  | 0  | 0   |
|                                 | BEAUREPAIRE                     | 0  | 0  |    | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 3  | 0   |
|                                 | BOURGAIN-JALLIEU                | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
|                                 | FRONTONAS                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
|                                 | JANNEYRIAS                      | 0  |    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
|                                 | ORNACIEUX-BALBINS               | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |    | 0  | 11  |
| Rhône                           | SATOLAS-ET-BONCE                | 0  |    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |    | 0  | 0   |
|                                 | THODURE                         | 1  |    | 7  | 3  | 2  | 1  | 0  | 0  | 0  | 7   |
|                                 | AMBÉRIEUX                       | 0  |    | 0  |    | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 2   |
|                                 | CHAPONNAY                       |    | 0  | 0  |    |    |    |    | 1  |    |     |
|                                 | COMMUNAY                        | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 4  | 0  | 1  | 0   |
| Ain                             | QUINCIEUX                       | 0  | 0  | 0  |    | 1  |    |    |    | 1  |     |
|                                 | PUSIGNAN                        | 0  | 9  | 38 | 7  | 3  | 1  | 0  | 3  | 6  | 23  |
|                                 | VALSERHÔNE (piège phéromones)   |    |    |    | 0  |    |    |    |    |    |     |
|                                 | VALSERHÔNE (piège lumineux)     |    |    |    | 0  |    |    |    |    |    |     |
|                                 | BIRIEUX                         | 0  |    | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0   |
|                                 | BOURG-EN-BRESSE                 | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 2  |     |
|                                 | LENT                            |    | 0  |    |    |    |    |    |    |    |     |
|                                 | LOYETTES                        | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
|                                 | PÉROUGES (BSV maïs BSC - piège) | 2  |    | 2  | 6  | 1  | 1  | 0  | 0  | 5  |     |
|                                 | PÉROUGES (BSV maïs BSC - piège) | 3  | 5  | 0  | 1  |    | 1  |    | 0  | 1  |     |
| Savoie                          | SAINT-CYR-SUR-MENTHON           | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |     |
|                                 | SAINT-JEAN-SUR-VEYLE            | 0  |    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
|                                 | SAINT-JUST                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  |    |     |
|                                 | VILLENEUVE (piège phéromones)   | 0  | 0  | 3  | 1  | 1  |    | 0  | 0  |    |     |
|                                 | VILLENEUVE (piège lumineux)     | 1  | 0  | 2  | 2  | 3  |    |    |    |    |     |
|                                 | SAINT-HÉLÈNE-DU-LAC             |    |    |    |    |    |    | 0  |    |    |     |



**Titre : Sésamie**

**Description :** En fin de saison, les larves de 2ème génération se réfugient dans le collet des plantes.



**Titre : Sésamie**

**Description :** Le Fusarium section liseola est susceptible de se développer à partir des dégâts causés sur les épis par les larves.



### Reconnaissance des symptômes :

#### **Deuxième génération :**

Sur tige, pédoncule et épi : présence de galerie et de sciure,  
Une plus forte proportion de larves demeure en bas de tige.

#### **Ne pas confondre**




|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Pyrâle (avec dégâts 2ème génération de sésamie) | Larve plus petite et grise |
|-------------------------------------------------|----------------------------|

- Des solutions préventives peuvent être mises en place après la récolte en broyant les résidus et les collets. Les températures négatives au sol détruisent les larves présentes dans les cannes de maïs et limitent ainsi l'extension de la sésamie.
- Les mesures prophylactiques réalisées à l'échelle du bassin de parcelles sont plus efficaces qu'une lutte individuelle.

### Analyse de risque



\*échelle différente des deux autres graphiques





## Héliothis :

| Semaine                          | 23                       | 24 | 25 | 26 | 27 | 28  | 29  | 30  | 31  |
|----------------------------------|--------------------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Héliothis nb papillons Phéromone |                          |    |    |    |    |     |     |     |     |
| Drôme                            | EYMEUX 2                 | 0  | 2  | 0  | 2  | 2   | 2   |     | 4   |
|                                  | EYMEUX 1                 | 0  | 0  | 4  | 4  | 0   | 0   |     | 0   |
|                                  | GRANE (devant boyer)     |    | 0  |    |    | 5   |     | 12  | 42  |
|                                  | GRANE (Lemot)            |    | 2  | 2  |    | 8   |     | 6   | 31  |
|                                  | ROCHEBAUDIN              | 0  | 0  |    | 0  | 5   | 4   | 11  | 2   |
|                                  | BEAUVALLON               |    | 2  | 11 | 0  | 14  | 119 | 150 | 54  |
|                                  | BONLIEU-SUR-ROUBION      |    | 0  |    | 1  | 0   | 4   | 10  | 13  |
|                                  | CHABRILLAN               |    | 2  | 11 | 5  | 33  | 134 | 162 | 101 |
|                                  | LA COURCOUDE             |    | 7  | 15 | 1  | 26  | 91  | 17  | 12  |
|                                  | MARSANNE                 |    |    | 3  | 2  | 15  | 34  | 16  | 26  |
|                                  | PIERRELATTE              |    | 8  | 9  | 0  | 19  | 40  | 10  | 7   |
|                                  | SAINT-JEAN-DE-GALAURE    |    |    | 4  | 0  | 7   | 22  | 67  | 26  |
|                                  | PORTES-EN-VALDAINE       |    |    |    | 1  | 0   | 8   | 16  | 43  |
|                                  | SAUZET                   |    | 8  | 10 | 4  | 24  |     | 280 | 26  |
| Isère                            | BEAU-CROISSANT           | 1  | 0  | 0  |    |     | 2   | 0   | 0   |
|                                  | BEAUREPAIRE              |    | 0  | 0  | 3  |     | 2   | 0   | 0   |
|                                  | BOURGAIN-JALLIEU         | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 6   | 0   | 3   |
|                                  | FRONTONAS                | 0  | 0  | 0  | 1  | 0   | 0   | 1   | 0   |
|                                  | JANNEYRIAS               | 2  | 1  | 2  | 5  | 16  | 35  | 17  | 7   |
|                                  | ORNACIEUX-BALBINS        |    | 0  | 0  | 0  | 3   | 1   |     | 4   |
|                                  | PISIEU                   |    | 0  | 6  | 3  | 63  | 56  | 158 | 162 |
|                                  | THODURE                  |    | 2  | 2  | 1  | 3   | 14  | 4   |     |
| Rhône                            | AMBERIEUX                |    |    |    |    | 0   |     |     | 5   |
|                                  | QUINCIEUX                | 4  |    | 0  | 0  | 17  | 7   | 23  | 0   |
|                                  | CHAPONNAY                | 1  | 2  | 0  | 0  | 2   | 2   | 1   | 3   |
|                                  | COMMUNAY                 | 1  |    |    |    |     |     | 7   | 3   |
| Ain                              | SAINT-BONNET-DE-MURE     | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   | 1   | 0   | 0   |
|                                  | VALSERHÔNE               |    |    | 2  |    |     |     |     |     |
|                                  | BIRIEUX                  | 0  | 1  | 3  | 0  | 4   | 5   | 4   | 3   |
|                                  | BOURG-EN-BRESSE          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |     |     |
|                                  | PÉROUGES (Maïs Pérouges) | 0  | 0  | 1  | 0  | 2   |     | 1   | 0   |
|                                  | SAINT-CYR-SUR-MENTHON    | 2  | 0  | 0  | 6  | 6   | 0   | 5   | 5   |
|                                  | SAINT-JEAN-SUR-VEYLE     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 8   | 3   | 0   |
| Ardèche                          | SAINT-JUST               | 0  | 0  | 0  | 1  | 0   | 0   |     |     |
|                                  | SAINT-VINCENT-DE-BARRÈS  |    |    | 33 | 70 | 137 |     | 42  | 18  |

Les captures sont en nette baisse sur l'ensemble du territoire. La nuisibilité de l'héliothis est importante au moment de la floraison, c'est pourquoi les parcelles de maïs semences à ce stade sont à risque élevé. Les attaques de ce ravageur peuvent entraîner une perte de rendement avérée en maïs semences.

Le risque pour les parcelles de maïs grain et fourrage est moins impactant sur la productivité qu'en maïs semences, mais les galeries présentes sur les épis peuvent favoriser l'apparition de mycotoxines.

Pour ce ravageur il est particulièrement délicat de relier les captures dans les pièges et les risques de dégâts. L'héliothis est bien présent dans la Drôme, une vigilance est nécessaire sur les parcelles à risque, particulièrement sur maïs semences.

### Analyse de risque (maïs grain et fourrage)



### Analyse de risque (maïs semences)






**Titre :** Héliothis  
**Description :** Conséquence d'une attaque d'héliothis sur épis : le développement de Fusarium de la section liseola.



**Titre :** Héliothis  
**Description :** Symptômes du passage d'une larve d'héliothis au sommet de l'épi : trace large, en creux, les soies ont été mangées.





### **Informations - Rappels :**

Avec les conditions météorologiques très chaudes et les canicules, le phénomène d'invasions de punaises après les moissons de colza semble se reproduire cette année. De nombreux signalements venant de différents départements (principalement Isère, Puy-de-Dôme et Ain) ont été faits. Des dégâts liés à ces insectes pourraient être visibles sur colza ou autre grande culture, notamment le maïs. Pour le moment aucun dégât n'a été signalé, mais il est conseillé d'observer si des cultures présentent des dégâts afin de les faire remonter.

Les producteurs sont invités à prévenir les mairies ou riverains de leur date de récolte ou déchaumage, pour que les habitants limitrophes des parcelles ne soient pas surpris par le phénomène, et prennent quelques mesures préventives pour essayer de se protéger des invasions de punaises (boucher les fissures, mettre de la terre de diatomée en barrière pour l'habitation, utiliser les jets d'eau pour "noyer" les individus dès le début de leur arrivée qui peut être très soudaine...).

Les recommandations au champ sont :

- Eviter de semer du colza à côté des zones urbaines
- Maintenir des plantes hôtes autour des champs de culture comme lieu de refuge pour arrêter la migration
- Effectuer un labour superficiel avec des outils de type herse à disques ou « semi-chisel » dans le but de hacher et d'enfouir les restes de récolte et de chaume de la culture et d'éviter la prolifération de ces insectes


L'actualité sur cette problématique est sur le site internet de la FREDON pour centraliser les signalements :

<https://fredon.fr/aura/actualites/pullulation-de-punaises-des-champs>

*Rédaction : MONDAN Amandine*

## Notes nationales biodiversité

<https://ecophytopic.fr/pic/prevenir/notes-nationales-biodiversite>



[LIEN NOTE NATIONALE AMBROISIE](#)

[LIEN NOTE DATURA](#)

[LIEN FICHE POPILLIA JAPONICA](#)

Pour en savoir plus, EcophytoPIC, le portail de la protection intégrée :  
<http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/grandes-cultures>

*Publication hebdomadaire. Toute reproduction même partielle est soumise à autorisation*

**Directeur de publication** Michel JOUX, Président de la Chambre Régionale d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes

**Coordonnées du référent** : Perrine VAURE (CRA AURA [perrine.vaure@aura.chambagri.fr](mailto:perrine.vaure@aura.chambagri.fr), 06 76 24 46 48)

**À partir d'observations réalisées par** : des coopératives et négoce agricoles, des instituts techniques, des Chambres d'Agriculture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, des lycées agricoles et avec la participation des agriculteurs.

*Ce BSV est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transmise telle quelle à la parcelle. Pour chaque situation phytosanitaire, les producteurs de végétaux, conseillers agricoles, gestionnaires d'espaces verts ou tous autres lecteurs doivent aller observer les parcelles ou zones concernées, avant une éventuelle intervention. La Chambre régionale dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs concernant la protection de leurs cultures.*



Financé dans le cadre  
de la stratégie **écophyto**



**GOUVERNEMENT**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



**OFB**  
OFFICE FRANÇAIS  
DE LA BIODIVERSITÉ