

Choisir & Décider

Premiers
Résultats Provisoires

BLÉ DUR

Variétés et interventions d'automne

*Préconisations régionales
campagne 2026-2027*



Région
Méditerranée –
Rhône Alpes

SOMMAIRE

Premiers résultats variétés – Blé Dur 2026	2
Caractérisation du réseau	2
Caractérisation de la campagne 2025-2026	4
Résultats de la campagne 2025-2026	6
Les Résultats pluriannuels (avec protection fongicide)	7
Résultats Qualité	9

Premiers résultats variétés – Blé Dur 2026


CARACTERISATION DU RESEAU

Sept essais variétés ont été réalisés en 2025-2026 (**Figure 1** et **Tableau 1**), parcourant bien les conditions de croissance régionale. Sur ces sept essais, un a été victime d'une attaque de mosaïque rendant impossible l'analyse des données de ce site (Lansargues) et un site a été victime d'une attaque de nématodes (Marguerittes). Les autres essais ont pu être menés jusqu'au bout et font l'objet d'un regroupement.

Un grand merci à Mr Aymeric de Coussergues à Beaucaire, à M Duez à Lansargues, à Mr Bourneton à Marguerittes, à Mr Eydoux à Orange, à Mr Vernet à Montagnac et à Mr Peyrard à Eure pour nous avoir accueillis.

Merci également à l'ensemble des autres agriculteurs ayant accueillis nos plateformes d'essais en lien avec des thématiques autres que les variétés : Mr Touchat à Pierrelatte, Mr De Sambucy à Arles, Mr Massuco à Dauphin, Mr Brémond à Oraison, Mr Joubert à Vinon sur verdon et l'ensemble des agriculteurs ayant participé aux réseaux d'essais dans le cadre du PRGC en région PACA.

Figure 1 : Localisation des essais variétés 2025-2026– Réseau des essais en Méditerranée.



● = site d'essai variété valide

● = site d'essai variété compromis par un/des accident(s), non analysable

Chacun de ces sites d'essais a été caractérisé par un itinéraire technique adapté aux conditions pédoclimatiques rencontrées et qui est présenté dans le **tableau 1** ci-dessous.

Tableau 1 : caractéristiques du réseau d'essais en Méditerranée 2025-2026

Région	Haute Camargue	Plaine de Valence	Plaine du Verdon	Plateau de Valensole	Plaine du Rhône
Commune	Beaucaire	Eurre	Gréoux	Montagnac	Orange
Département	84	26	04	04	84
chez	A.De Coussergues	M.Peyrard	Arvalis	D.Vernet	P.Eydoux
Sol	Limon argileux profond	Limono argileux profond	Limono-argileux calcaire peu caillouteux profond	Argilo-calcaire superficiel	Limons argileux profond
Réserve Utile (mm)	238	200	132	62	238
Rendement potentiel (expé) qt/ha	70	90	80	55	60
Précédent	Soja	Tournesol	Tournesol	Fenouil	Fenouil
Reliq. azoté (U d'N)	91	70	108	62	93
Date semis	14/11	12/11	28/10	17/10	27/11
Densité semis (Grains/m²)	330	270	280	300	350
Azote total (U d'N)	150	250	220	190	150
nb d'apports	2	5	4	3	3
Fongicides (nb)	1	0	2	1	1
Irrigation (mm)	0	0	160	0	0
irrigation (nb)	0	0	6	0	0
Epiaison 1/2 précoce	28/04	01/05	29/04	02/05	25/04
Récolte	03/07	25/06	01/07	02/07	24/06
Plantes/m²	270	285	325	295	275
Epis/m²		389		369	324
Grains/épi		43.2		40.4	32.2
Grains/m²	9783	16805	23692	14889	10424
PMG (g)	53.9	50.7	47.4	40.2	56.6
Poids/épi (g)		2.19		1.62	1.82
Rendement (qt/ha)	52.7	85.2	112.3	59.9	59.0
ETR	2.8	2.8	5.0	3.4	3.4
répétitions	3	3	3	4	3
Qualité					
PS	83.0	81.2	80.2	76.6	84.6
Protéines (%)	16.8	15.3	13.9	16.8	14.4

CARACTERISATION DE LA CAMPAGNE 2025-2026

La campagne 2025-2026 a encore été marquée par des extrêmes climatiques très forts.

Il y a eu **8 grandes périodes climatiques** cette année (**Tableau 2 page suivante**) :

- **Un début de campagne globalement très sec** (globalement aucune pluie entre le 20 septembre jusqu'au 19 octobre) partout à part le secteur d'Orange (plusieurs gros orages en septembre) et Aix en Provence (gros orages fin septembre). Cette sécheresse a contrarié la préparation des semis.
- **Un retour des pluies modéré fin octobre jusqu'à début novembre** (souvent jusqu'au 6 novembre). Ce retour a permis de réaliser les préparations de sol et de faire les semis de blés dans de très bonnes conditions (il y a eu de très belles levées). Plus de 80% des semis cette année ont été réalisés durant un créneau allant du 29 octobre au 20 novembre. A noter que le secteur de Bollène fait exception : sur ce secteur il a énormément plu entre le 19 octobre et le 6 novembre avec plus de 150 mm en cumul. Cela a retardé les semis qui ont pu démarrer souvent à partir du 20 novembre jusqu'à début-mi-décembre.
- **Une période extrêmement pluvieuse et longue de mi-décembre...jusqu'à fin mars** : en décembre il a recommencé à pleuvoir de partout et en quantité importante (jusqu'à 300 mm sur ce seul mois sur la partie montpelliéraine et globalement entre 100 et 200 mm sur la partie Ouest de la méditerranée et 70 mm côté Est (plus ou moins tard sur le mois de décembre selon les secteurs). Le retour de ces pluies s'est prolongé en janvier jusqu'à début mars sur la partie Narbonnaise et Biterroise et jusqu'au 22 mars sur le reste de la région. Il a plu près de **250 mm côté Biterrois** entre le 1^{er} janvier et le 15 février 2026, soit **7.7 fois** la pluviométrie habituelle ! Plus à l'est, il a plu autour de **200 mm sur le Gard, la Camargue et environ 150 mm en allant vers la Provence** : sur ces secteurs **cela représente entre 3 et 4 fois la quantité habituelle de pluie sur cette période**. Ce fort épisode de pluie a provoqué par endroit des inondations des parcelles agricoles. Les blés sont restés parfois plus de 3 semaines inondés puis encore 3 à 5 semaines avec des sols saturés en eau. Cela a entraîné des conséquences visibles sur le nombre d'épis avec des régressions de talles sur les parcelles les plus touchées et des enracinements réduits. Globalement sur le réseau d'essai, les blés ont moins tallé cette année (-10% d'épis/m², voir **Tableau 3 page suivante**).
- **Une période de sécheresse intense en avril** : il n'a quasiment pas plu durant un mois sur tout l'arc Méditerranéen. Les cultures ont commencé à rentrer en stress hydrique à cette période. Les parcelles ennoyées en mars ont souvent été celles qui ont décroché le plus vite. Cet épisode de sécheresse a parfois contrarié le positionnement du dernier apport d'azote pour faire la qualité.
- **Un retour des pluies fin avril/début mai** : un épisode de pluie partout, plus ou moins important selon les secteurs : 10 mm côté Narbonne/Biterrois, 100 mm plus proche des Cévennes à Montpellier et Nîmes, 30 mm en Camargue et 10 mm plus à l'est sur le secteur d'Aix en Provence et les Alpes de Haute Provence. Ce créneau était l'ultime créneau pour positionner le dernier apport d'azote. Ceux qui l'ont placé avant cette pluie ont eu globalement de très bon taux de protéines, ceux qui ont raté ce créneau ont souvent vu la qualité se dégrader avec un apport soit non réalisé, soit réalisé trop tard (après floraison). Le taux de protéines sur le réseau d'essai a été au-dessus de 13.5 sur tous les sites avec un dernier apport réalisé partout sauf à Beaucaire (où le taux de protéines est quand même important en raison d'un rendement en retrait par rapport à celui visé initialement).
- Côté Est Hérault, Gard, Camargue et Vallée du Rhône, cette pluie a eu lieu durant la floraison mais sans conséquence sur la présence de fusariose (risque élevé, mais peu de symptômes). Cette pluie a été salvatrice pour accompagner le remplissage du grain et explique sûrement les très gros grains observés cette année sur cette partie de la région (exception faites des parcelles avec des accidents racinaires ou des systèmes racinaires peu développés). Sur le réseau d'essais le PMG moyen est en hausse de 10% par rapport aux 5 dernières années et le PS de 2%.
- **Une deuxième partie du mois de mai sèche** avec des températures très élevées (record battu dans plusieurs secteurs pour un mois de mai avec des températures allant jusqu'à 38 degrés).
- **Un dernier épisode de pluie début juin** (10 à 20 mm selon les secteurs) sauf à l'ouest de la région (Narbonne Béziers).
- Une fin de cycle et une moisson sous des **températures caniculaires** (jusqu'à 41 degrés dans la Région), plus de 3 semaines continues avec des températures dépassant 35 degrés.

Cette canicule a eu lieu à maturité du grain et n'a pas eu de conséquence sur le remplissage du grain. Les taux d'humidité du grain à la moisson ont été très faibles (9%-10% en moyenne).

Tableau 2 : Cumul de pluie (en mm) sur l'arc méditerranéen durant la campagne 2025-2026

	Période	Narbonne	Béziers	Mauguio	Nîmes	Arles Tour du Valat	Alès	Orange	Aix en P.	Valen- sole	Gréoux
		11	34	34	30	13	30	84	13	4	5
octobre	1/10 - 31/10	7	5	11	28	34	83	128	40	54	37
novembre	1/11 - 30/11	39	61	51	33	20	39	43	37	53	61
décembre	1/12 au 31/12	104	146	302	150	204	239	95	73	77	61
janvier	01/01 au 31/01	276	169	141	91	76	121	63	59	69	56
février	1/02 au 28/02	90	78	83	97	124	105	95	101	92	81
mars	1/03 au 31/03	56	80	162	93	70	98	79	139	62	60
avril	1/04 au 30/04	19	23	16	17	7	34	14	7	14	7
mai	1/05 au 31/05	18	17	112	115	50	166	102	50	60	48
pré semis	01/09 au 30/10	29	30	26	83	78	106	252	166	111	138
semis	15/10 au 25/11	46	66	61	61	53	122	166	72	105	95
fertilisation tallage- épi 1 cm	01/01 au 31/03	422	327	386	281	270	324	237	298	223	197
période maladie	01/04-30/05	36	39	128	132	57	200	117	57	74	55
remplissage-maturité	01/05-15/06	18	18	120	142	62	180	118	61	71	60
saison complète	01/09-15/06	631	605	901	707	641	924	760	643	549	525

Tableau 3 : Rendement et Qualité moyens sur le réseau d'essais variétés Méditerranée Rhône-Alpes

	2016	2017	(2018)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	moyenne 2021-2025	2026	2026/5 ans écart
Plantes/m ²	227.0	250.0	237.0	259.9	247.9	222.0	241.1	231.6	237.4	234.8	233.4	290	+ 24 %
Epis/m ²	374	371	411	359	402	464	435	364	353	378	399	361	-10%
Grains/épi	38.9	42.8	35.1	43.1	38.2	38.8	39.3	32.4	41.4	46.7	39.7	39	-3%
Grains/m ²	14539	15878	14434	15477	15104	17528	17180	11841	15075	17597	15844	15119	-5%
PMG	53.1	52.4	41.5	50.9	49.9	46.3	40.1	47.3	45.5	46.9	45.2	50	+ 10 %
Poids/épi (g.)	2.1	2.2	1.5	2.2	1.9	1.8	1.6	1.5	1.9	2.2	1.8	2	+ 4 %
Rendement	77.2	83.2	59.9	78.8	74.2	80.7	70.1	55.4	65.4	82.6	70.9	74	+ 4 %
PS	82.8	81.6	75.6	82.5	82.5	80.2	79.3	78.4	77.5	81.0	79.3	81	+ 2 %
Protéines (%)	13.7	13.8	14.6	13.4	13.7	12.9	14.8	14.6	13.5	13.6	13.9	15	+ 11 %

RESULTATS DE LA CAMPAGNE 2025-2026

La **Figure 2** ci-dessous présente les rendements moyens issus du regroupement des cinq plateformes d'essais 2026 de Montagnac (04), Orange (84), Beaucaire (30), Eurre (26) et Gréoux les bains (04).


Statistiquement, il y a très peu de différence entre les variétés : seules RGT DEMESUR et RGT AVENTADUR sont significativement différentes l'une de l'autre (RGT DEMESUR première au classement et RGT AVENTADUR dernière).

Trois variétés ont un rendement moyen qui dépasse de 5% la moyenne générale (RGT DEMESUR, ROCAILLOU et CABAYOU), et cinq autres variétés ont un rendement moyen qui dépasse de 2 à 4% la moyenne générale (RGT BELALUR, RGT VOILUR, RGT TOPALLUR, ANVERGUR, RGT INSIEMUR).

Une variété, FUSILOU, est proche de la moyenne générale avec un rendement moyen égal à 99% de la moyenne générale (soit en retrait de -1%).

Trois variétés sont nettement en retrait de la moyenne générale même si cela n'est pas statistiquement significatif : CATONE (-7%), CLAUDIO (-10%) et RGT AVENTADUR (-14%).

Figure 2 : Résultats du rendement moyen par variété issu du regroupement de cinq essais en Méditerranéen en 2025-2026



Il est important de signaler que le rendement pour une variété donnée a été encore cette année assez variable d'une plateforme à une autre (**Tableau 4 page suivante**). C'est particulièrement le cas pour les quatre variétés à gros PMG RGT AVENTADUR, CLAUDIO, CATONE et FUSILOU, qui ont performé sur le plateau de Valensole dans des conditions très séchantes mais qui ont cependant eu des rendements très en retrait sur les autres sites d'essais (Orange, Beaucaire et Gréoux Les Bains).

A l'inverse, des variétés qui font leur rendement avec de grosses fertilités d'épis, ont vu leur rendement en retrait sur le site de Montagnac et ont été globalement meilleures ailleurs (ANVERGUR, RGT BELALUR, TOP ALLUR et RGT VOILUR). A noter que RGT VOILUR a également contre performé à Orange.

La nouveauté RGT DEMESUR a quant à elle eu un rendement au-dessus de la moyenne générale de partout sauf Montagnac.

Les variétés CABAYOU et ROCAILLOU ont été au-dessus de la moyenne générale ou égale à la moyenne générale sur tous les sites.

Tableau 4 : rendement moyen en % de la moyenne générale de chaque essai campagne 2025-2026

Commune :	BEAUCAIRE	EURRE	GREOUX-LES-BAINS	MONTAGNAC-MONTPEZAT	ORANGE	MOY. % M.G.
Département :	30	26	4	4	84	
Organisme :	ARVALIS	ARVALIS	ARVALIS	ARVALIS	ARVALIS	
Irrigation :	NON	NON	OUI 160 mm 5 tour(s)	NON	NON	
Date de semis :	14/11/2025	12/11/2025	28/10/2025	17/10/2025	27/11/2025	
Type de sol :	ALLUVIONS LIMONO ARGILEUSES PROFONDES	LIMON ARGILEUX PROFOND SUR ALLUVIONS	SOL ARGILO- LIMONEUX PEU CAILLOUTEUX PROFOND SUR ROCHE CALCAIRE	SOL ROUGE LIMONO- ARGILEUX CALCAIRE CAILLOUTEUX SUPERFICIEL SUR CALCAIRE DUR	ALLUVIONS LIMONO ARGILEUSES PROFONDES	
Prof. exploitable racines (cm) :	75	120	110	80	75	
Nature du précédent :	SOJA	TOURNESOL	TOURNESOL SEMENCE	FENOUIL	FENOUIL	
RGT DEMESUR	103.8	106.2	114.8	95.0	109.0	107
ROCAILLOU	114.7	104.8	101.6	101.1	110.2	106
CABAYOU	110.6	99.8	110.3	98.6	104.7	105
RGT BELALUR	108.1	103.7	109.8	89.0	107.2	104
RGT VOILUR	101.3	105.9	110.1	93.3	97.0	103
RGT TOPALLUR	104.8	105.1	99.2	96.1	110.9	103
ANVERGUR	106.4	106.9	103.0	90.6	104.2	103
RGT INSIEMUR	107.8	101.6	101.6	105.0	95.4	102
FUSILOU	104.6	96.0	99.5	102.3	92.4	99
CATONE	88.3	92.0	88.2	104.5	96.8	93
CLAUDIO	82.5		83.0	114.4	82.4	90
RGT AVENTADUR	64.3		81.2	108.4	88.0	86
Moy. générale :	52.7	85.2	112.3	59.9	59.0	73.8
Ecart type résiduel essai :	2.8	2.8	5.0	3.4	3.4	6.6

LES RESULTATS PLURIANNUELS (AVEC PROTECTION FONGICIDE)

Le comportement des variétés est très marqué par l'année climatique : il est préférable de l'apprécier sur plusieurs années (**Figure 2**). Afin de comparer les résultats de variétés expérimentées sur différentes campagnes, les rendements sont corrigés des effets annuels à l'aide des variétés communes entre année. Ils sont exprimés en % de la moyenne des variétés représentées. Les chiffres et le point central indiquent respectivement le millésime et la moyenne ajustée pluriannuelle (ex : 26 = 2026).


Afin d'illustrer la régularité des nouvelles inscriptions au cours des années antérieures, « c1 » et « c2 » rappellent respectivement les résultats CTPS des nouvelles variétés et des témoins en 1ère et 2ème année d'inscription en zone Sud. Ces valeurs ne sont pas prises en compte dans le calcul de la moyenne pluriannuelle.

- L'une des deux nouveautés, RGT DEMESUR, semble confirmer les observations faites lors des deux années d'inscription dans la région : c'est une variété qui a comme point fort d'apporter du rendement depuis 3 ans (+7 à 11% selon les années).
- L'autre nouveauté, TOPALLUR, est en retrait cette année par rapport aux performances réalisées en année d'inscription : elle est au-dessus de la moyenne (+3%) mais apporte moins de rendement qu'en année d'observation pour l'inscription (+9 à 14%). C'est en conditions séchantes à Valensole et en conditions à l'inverse optimales irriguées à Gréoux les Bains qu'elle a le moins performé : elle a moins déplafonné au niveau rendement que d'autres variétés à Gréoux les Bains et en conditions séchantes elle a été défavorisée par rapport à des variétés à gros grains.
- La nouveauté FUSILOU est en retrait cette année : -1%. Elle est un peu moins bonne que les 3 dernières années où son rendement bien que proche de la moyenne était un peu plus élevé (+1 à +4%). Elle confirme ne pas être une variété qui va apporter du potentiel, mais qui cependant apporte

de la qualité (voir résultats protéines et PS plus bas). A noter que sur les sites avec des stress liés à l'excès d'eau (Beaucaire) ou stress hydrique (Montagnac) elle a fait de belles performances grâce à sa capacité à faire du gros grain.

- ROCAILLOU, qui était en retrait l'année dernière à cause d'une contreperformance à Aimargues, présente cette année un rendement au-dessus de la moyenne dans tous les essais, ce qui est en accord avec ce qui avait été observé en 2024 et 2023. La pression maladie était faible cette année contrairement à l'année dernière où il y avait eu une forte attaque de septoriose précoce à laquelle cette variété semble particulièrement sensible.
- La variété RGT INSIEMUR, pour sa troisième année d'inscription fait une meilleure performance que les autres années (+2% de rendement par rapport à la moyenne générale). Son rendement est globalement stable depuis 3 ans et reste proche de celui de la moyenne.
- Il en est de même pour CABAYOU, qui a fait un meilleur rendement que les autres années (+ 5% par rapport à la moyenne générale). Elle s'est particulièrement plu sur les sites qui sont rentrés en stress hydrique tôt comme RGT INSIEMUR.
- RGT BELALUR a encore cette année un rendement au-dessus de la moyenne. Cette variété confirme son atout principal qui est d'apporter du potentiel.
- La variété CATONE, pour sa première année de test dans la région, déçoit : un rendement en retrait de 7% par rapport à la moyenne générale. Elle s'est plu uniquement dans les conditions tardives et séchantes du plateau de Valensole, où elle fait cependant moins bien que la variété historique Claudio. C'est la première année d'observation il est important de voir comment elle se comporte l'année prochaine.

Figure 2 : rendement pluriannuels Sud-Est. Sources : ARVALIS et partenaires (post-inscription), CTPS/ GEVES (inscription).



RESULTATS QUALITE

1) Pois spécifique en hausse

En 2026, le PS moyen du réseau d’essai est de 81, comme l’année dernière, (**Figure 3**) avec une augmentation de +2% par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

Malgré des symptômes visibles de contamination de fusariose sur certains essais, le PS n’a pas été impacté.

La variété très précoce Claudio (PS=84) présente le meilleur PS du réseau, suivi de la variété inscrite en 2025 Fusilou (PS=83.2) qui confirme cette année apporter des points de PS.

Les variétés récentes RGT Insiemur et Cabayou sont comme l’année dernière juste derrière avec respectivement 82.1 et 81.9 de PS. Elles confirment ainsi pour la troisième année de suite leur bon comportement sur ce critère qualité.


L’une des nouveautés de l’année, RGT Demesur se classe juste derrière avec 80.8 de PS. Elle est dans la moyenne générale, tout comme la variété de référence Anvergur.

L’autre nouveauté RGT TOPALLUR est un peu en retrait avec un PS de 80.6 soit 1% de moins par rapport au PS moyen du regroupement.

Rocailou et RGT Belalur sont également un petit peu en retrait avec un PS inférieur à la moyenne générale, en retrait de 1% comme RGT Topallur. Cela est cohérent avec les observations faites les années précédentes où ces deux variétés étaient un peu en retrait.

La variété Catone, variété de génétique italienne, nouvelle dans la région, présente quant à elle le PS le plus faible des variétés testées cette année avec un PS de 79.6. Sur le plan statistique, Catone est significativement en retrait par rapport aux variétés présentant les meilleurs PS cette année (Claudio, Fusilou, RGT Insiemur et Cabayou).

Figure 3 : PS moyen par variétés sur les 5 essais regroupés en Méditerranée-Rhône Alpes en 2026




2) Protéine :

Cette année dans nos essais la teneur moyenne en protéines a été excellente : un taux moyen de 15% (**Figure 4**). Les pluies fréquentes ont permis de bien valoriser les apports d'azote et notamment le dernier apport.

Au niveau du classement variétal, 3 groupes homogènes apparaissent :

- ➔ Catone, première du classement pour le taux de protéines, appartient au groupe homogène « a » avec un taux de protéines de 16.62%.
- ➔ Derrière Catone, se trouve un groupe de variétés appartenant au même groupe homogène « ab », statistiquement non différent de Catone mais qui ont un taux de protéines un peu plus faible : 16% de protéines pour Claudio la meilleure de ce groupe à 15.7% pour RGT Voilur la moins bonne de ce groupe.
- ➔ Enfin un dernier groupe homogène clôt se classement, le groupe « b » avec RGT Demesur, la meilleure de ce groupe (15.31%), Anvergur, RGT Belalur, Rocaillo, RGT Insiemur, RGT Topallur et Cabayou la moins bonne de ce groupe (14.85%). Ce dernier groupe est statistiquement plus faible que Catone.

Figure 4 : Teneur en protéines moyen (%) pour chaque variété dans le regroupement des essais Sud-Est 2026



Comme chaque année, il est important de regarder le ratio teneur en protéines/ rendement pour apprécier la capacité de chaque variété à réaliser du rendement sans trop diluer la teneur en protéines dans le grain.

La **Figure 5** page suivante présente ce ratio pour les différentes variétés observées en 2026.


On observe que la nouveauté RGT DEMESUR présente une très bonne relation taux de protéines/rendement : par rapport à son rendement (le plus élevé cette année en moyenne dans le regroupement) elle présente un bon taux de protéines et le meilleur ratio de toutes les variétés. Elle est suivie de près par RGT VOILUR.

L'autre nouveauté RGT TOPALLUR a tendance à plus diluer les protéines : pour un rendement plus faible elle présente également un taux de protéines plus faible, elle a l'une des moins bonnes relations protéines/rendement cette année (les moins bonnes étant CLAUDIO et RGT AVENTADUR qui font de gros taux de protéines, mais peu de rendement).

La variété CATONE, présente le plus gros taux de protéines, mais un rendement en retrait. Elle présente une relation protéines/rendement proche de celui de Fusilou et Anvergur cette année.

RGT BELALUR, ROCAILLOU et CABAYOU sont intermédiaires : elles ont un meilleur ratio protéines/rendement que ANVERGUR, FUSILOU et CATONE.

Figure 5 : Relation teneur en protéines/rendement 2026 Méditerranée




Les résultats obtenus en 2026, sont cohérents avec ceux observés en pluriannuel (**Figure 6**) avec cependant quelques différences.

CABAYOU a été meilleure en 2026 qu'en moyenne sur les autres années : elle a davantage fait de rendement en 2026 tout en conservant un bon taux de protéines. Les autres années elle avait été beaucoup moins productive.

FUSILOU qui en pluriannuel a normalement un meilleur ratio que ROCAILLOU et RGT BELLALUR a un moins bon ratio en 2026 lié à un rendement en retrait par rapport aux autres années (il a fait un bon taux de protéine, mais moins de rendement que les autres années).


Figure 6 : Relation teneur en protéines/rendement pluriannuel Méditerranée



Enfin il est important de regarder le taux de mitadin des variétés et leur sensibilité à la moucheture.

Les nouveautés RGT DEMESUR et RGT TOPALLUR semblent avoir peu de moucheture (inf à 4%). RGT DEMESUR présente une vitrosité meilleure que RGT TOPALLUR.

Les variétés ROCAILLOU et RGT BELLALUR présentent le plus faible taux de mitadin avec une vitrosité supérieure à 80%.





3, rue Joseph et Marie Hackin - 75116 PARIS
www.arvalis.fr

En partenariat avec les filières
(Intercéréales, SEMAE, FNPSMS,
CNIPT, GIPT, CIPALIN, FNAMS,
FNPT)

Membre de :



Partenaire technique

