



Bulletin de Santé du Végétal

Champagne-Ardenne
**grandes
cultures**



Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de
la [Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est](#) et de la [DRAAF](#)

BSV n°26– 12 août 2026

À RETENIR CETTE SEMAINE

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement au paragraphe



DONNÉES MÉTÉO

BETTERAVE

Stade moyen : Supérieur à BBCH 40.

Charançons : Migrations vers les racines plus fréquentes.

Teignes : Pression significative.

Rhizopus : Progression des signalements.

Cercosporiose : L'absence d'humidité limite son évolution.

POMME DE TERRE

Stade : Sénescence amorcée sur la plupart des parcelles. Récolte en cours.

Mildiou : aucun symptôme observé ; **risque faible**

Doryphore : Quelques adultes sur 1 parcelle et quelques larves sur une autre parcelle du réseau :
risque faible.

Piégeage Taupins : aucune capture

NOTES BIODIVERSITÉ



Parcelles observées cette semaine :

22 Betterave, 12 PdT.



Prévisions météo à 7 jours.

- Référence Craie

MERCREDI 12	JEUDI 13	VENDREDI 14	SAMEDI 15	DIMANCHE 16	LUNDI 17	MARDI 18
						
14° / 37°	20° / 39°	20° / 39°	21° / 33°	19° / 27°	17° / 28°	16° / 27°
↙ 15 km/h	▼ 5 km/h	↙ 10 km/h	↗ 15 km/h	↙ 15 km/h	↙ 10 km/h	↗ 20 km/h 45 km/h

(Source : Météo France, ville de Châlons-en-Champagne, 05/08/2026 à 9h30. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))

- Référence Barrois

MERCREDI 12	JEUDI 13	VENDREDI 14	SAMEDI 15	DIMANCHE 16	LUNDI 17	MARDI 18
						
15° / 36°	17° / 39°	19° / 38°	18° / 33°	18° / 27°	16° / 26°	14° / 25°
↗ 15 km/h	▼ 10 km/h	↙ 10 km/h	↙ 15 km/h 40 km/h	↗ 10 km/h	↙ 15 km/h	↗ 15 km/h 45 km/h

(Source : Météo France, ville de Chaumont, 05/08/2026 à 9h30. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))



1 Stades phénologiques

Les stades phénologiques sont supérieurs à BBCH 40 même si les taux de couverture foliaire varient de 50 à 100 % de couverture du sol par la culture, selon l'intensité du stress hydrique.

2 Jaunisses virales

a. Observations

Des symptômes de jaunisses virales sont déclarés dans 94 % des parcelles qui sont observées cette semaine (17 parcelles sur 18 observées). Les taux d'infestations varient de quelques plantes isolées ou petits foyers diffus à 10 % de la surface parcellaire touchée. Le stress hydrique actuel peut potentiellement masquer les symptômes visuels. Un retour de pluies significatives permettra d'identifier plus objectivement les surfaces impactées.



3 Charançons *Lixus juncii*

a. Observations

La moitié des parcelles observées montre toujours la présence de piqûres (parfois récentes) sur les pétioles, avec un taux d'infestation allant de 4 à 50 % de plantes présentant des pontes ou tentatives de pontes (16 % de plantes en moyenne).

Concernant la migration des larves vers la racine, près de 60 % des sites surveillés cette semaine présentent 1 à 2 galeries. Bien que le taux de plantes touchées varie de 4 à 64 %, la moyenne sur le réseau s'établit à 19 %.



b. Seuil indicatif de risque

Le seuil indicatif de risque est l'observation des adultes dans les parcelles de betteraves.

c. Analyse de risque

- **Facteurs de risque** : La hausse des températures stimule l'activité du ravageur (vols et pontes). La proximité de zones boisées ou enherbées augmente la vulnérabilité des parcelles.
- **Impact du stress hydrique** : Il accélère la migration larvaire, provoquant des pertes de matière et des plaies d'entrée pour des maladies racinaires comme le *Rhizopus*.
- **Situation sanitaire** : Depuis le début de la canicule, 82 % des sites du réseau observent des symptômes de pourriture racinaire (*Rhizopus*), touchant de simples plantes isolées jusqu'à 12 %.

RISQUE FAIBLE

RISQUE FORT


a.

b.



Présence du charançon :

- aucun *Lixus juncii* observé
- A présence d'adultes
- P présence de pontes
- L galeries de larves



4 Teignes

a. Observations

Présente sur l'ensemble du réseau cette semaine (22 parcelles), la teigne occasionne des dégâts sur 5 % à 100 % des plantes selon les parcelles, avec une moyenne établie à 47% de plantes symptomatiques.



b. Seuil indicatif de risque

Le seuil se situe à 10 % de plantes présentant des chenilles ou des dégâts frais (morsures sur les jeunes feuilles, fils soyeux, amas de déjections noirâtres).

c. Analyse de risque

Face au stress hydrique persistant, la pression s'intensifie cette semaine avec près de 95 % des parcelles observées (21 parcelles sur 22) franchissant le seuil indicatif de risque.


En plus de freiner la croissance par la destruction des jeunes feuilles, les morsures au collet favorisent les infestations par le champignon *Rhizopus*.

RISQUE FAIBLE

RISQUE FORT

Présence de teignes :

- aucune teigne observée
- présence de teignes inférieure au seuil
- dégâts de teignes supérieurs au seuil



5 Maladies du feuillage

a. Observations

- 17 parcelles déclarent de la cercosporiose avec des fréquences variant de 3 à 18 % de feuilles touchées.
- 1 parcelle signale la présence de quelques symptômes de rouille.
- Les autres maladies cryptogamiques (oïdium et ramulariose) sont absentes du réseau.

b. Seuil indicatif de risque

Pour assurer le contrôle des maladies cryptogamiques, déterminez les fréquences d'apparition en prélevant 100 feuilles de betteraves dans une zone homogène et représentative de la parcelle.

Cercosporiose : ne comptabilisez que les taches présentant des petits points noirs en leur centre (fructifications attestant de leur virulence).



oïdium



cercosporiose



rouille



ramulariose

Seuil indicatif de risque T1 en % de feuilles atteintes	15 %	1ers symptômes	15 %	5 %
Seuil indicatif de risque T2 en % de feuilles atteintes	30 %	20 %	40 %	20 %

c. Analyse de risque

L'évolution des maladies est intimement liée aux conditions agro-climatiques, propres à chaque parcelle. Les facteurs de risque sont les suivants : rotations courtes, zones d'épandage d'effluents agro industriels, zones de vallée, variétés sensibles.

La situation sanitaire actuelle du réseau est la suivante :

- 3 parcelles ne présentent toujours aucun symptôme ;
- 25 parcelles restent au seuil indicatif de risque T1 ;
- 2 seules parcelles franchissent le seuil indicatif de risque T2.

L'absence d'humidité est toujours défavorable à l'évolution de la cercosporiose, maladie dominante de la région.

Les conditions optimales sont les suivantes :

- Une température comprise entre 27 °C et 32 °C (aucune sporulation au-delà de 38 °C)
- Une humidité relative à la surface des feuilles supérieure à 90 % pendant 5 à 8 heures

RISQUE FAIBLE


RISQUE FORT



T0 T0 : seuil de risque maladies non atteint

T1 T1 : seuil de risque atteint,

T2 T2 : seuil de risque atteint,





1 Stades phénologiques

Cette semaine, 12 parcelles ont été observées.


variétés : AGATA, COLOMBA, INNOVATOR, MONALISA, MOZART et ORCHESTRA.

La majorité des parcelles suivies a atteint le stade « 50% sénescence ». 6 parcelles sont défanées (Agata et Colomba)

Les récoltes ont commencé dans d'autres parcelles que celles du réseau.



Localisation des parcelles de pommes de terre
Semaine 33 – 12 août 2026



2 Estimation du risque mildiou en début de campagne

a. Estimation du risque mildiou via le modèle Miléos®

Le modèle permet de simuler le développement du potentiel de sporulation en nombre de spores contaminantes selon un cumul horaire des conditions climatiques favorables : **température et hygrométrie**.

La sporulation est possible dès que l'hygrométrie est supérieure à 87 % (pluie, brume ou irrigation) et qu'il est relevé une température de :

- 21°C pendant 6h consécutives,
- 15°C pendant 8h consécutives,
- 10°C pendant 17h consécutives.


Deux critères sont analysés dans le cadre de la prédiction du risque mildiou dans Miléos® :

- **Le potentiel de sporulation (= la réserve de spores)** représentant la réserve de maladie présente dans l'environnement et qui pourrait s'exprimer si les conditions climatiques deviennent favorables.
- **Le nombre de spores contaminantes (= le poids de contamination)** induisant le niveau de risque de contamination par rapport au seuil de chaque sensibilité variétale.

Réserve de spores :

5 stations météo sont actives pour évaluer le risque mildiou cette année en Champagne-Ardenne. Toutes se situent dans l'Aube.

Chaque station est représentée par un cercle codifié par un jeu de couleurs en fonction de la réserve de spores calculée par Miléos® sur la station météo.



Situation épidémiologique au 12/08/2026 (à 9h)

Déclenchement du seuil indicatif de risque par rapport au poids de contamination :

Poids de contamination (= seuil indicatif de risque atteint)

	05-août	06-août	07-août	08-août	09-août	10-août	11-août	12-août	
10_Aubeterre		0						2026-08-12 09:00:00	
10_Châtres								2026-08-12 09:00:00	
10_Dampierre								2026-08-12 09:00:00	N/A
10_Gélannes								2026-08-12 09:00:00	
10_Marigny-le-Châtel								2026-08-12 09:00:00	
10_Yèvres-le-Petit								2026-08-12 08:00:00	

	Seuil non franchi pour toutes les sensibilités variétales
	Seuil franchi pour les variétés sensibles
	Seuil franchi pour les variétés intermédiaires donc également pour les variétés sensibles
	Seuil franchi pour les variétés tolérantes donc également pour les variétés intermédiaires et sensibles
	Station météo non fonctionnelle


b. Observations sur le terrain

Aucun symptôme observé cette semaine.

c. Analyse de risque

Les conditions météorologiques de la semaine dernière ne sont toujours pas favorables au développement du mildiou, même avec les quelques rares pluies du week-end dernier. Le seuil indicatif de risque lié au poids de contamination n'a pas été atteint. Ces prochains jours, l'hygrométrie ne devrait pas dépasser 87 %, en raison des très fortes chaleurs prévues sauf peut-être samedi et/ou dimanche où des orages sont annoncés.

La réserve de spores est actuellement « faible » dans les six secteurs suivis par Mileos® en système non irrigué. Ainsi, **le risque mildiou est faible dans les parcelles non irriguées.**



Toutefois, il faut rester vigilant car une évolution climatique ou la présence de brumes/brouillards/rosée peut faire évoluer rapidement la situation par une augmentation de l'hygrométrie. L'observation des tas de déchets et/ou repousses de pomme de terre est essentielle pour anticiper les risques. L'observation parcellaire reste essentielle dans la lutte contre le mildiou, la vigilance doit être accrue sur les parcelles qui sont irriguées.

d. Gestion alternative du risque

La lutte doit être préventive et associée à une bonne prophylaxie :

- Elimination des tas de déchets de triage et des repousses de pommes de terre,
- Limitation des longues périodes d'humidité (irrigation en cours de journée, drainage, aération),



Il existe des produits de biocontrôle autorisés sur le mildiou de la pomme de terre. Il s'agit de la substance active nommée phosphonate de potassium.

Retrouvez la liste actualisée des produits de biocontrôle sur le site :

<https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole>



Les couples « mildiou - fluazinam » et « mildiou - mandipropamide et CAA » sont exposés à un risque de résistance.

Vous pouvez trouver toutes les informations sur les phénomènes de résistance sur le site R4p :

<https://www.r4p-inra.fr/fr>

3 Doryphores

d. Observations

Cette semaine, des doryphores adultes et des larves ont été observés sur 2 parcelles du réseau :

- 1 parcelle avec quelques adultes
- 1 parcelle avec quelques larves et adultes disséminés dans la parcelle.


e. Seuil indicatif de risque

Deux foyers de doryphores pour 1000 m² (un foyer = 2 à 3 pieds avec présence de larves).

f. Analyse de risque

Le seuil indicatif de risque n'a pas été dépassé cette semaine. La présence de doryphores continue de baisser.

Le risque est donc faible pour cette semaine.



g. Gestion alternative du risque

En prophylaxie, au printemps pour réduire le nombre de doryphores adultes sortis d'hivernation, il est utile de :

- Enlever les repousses de pommes de terre et gérer les tas de déchets,
- Gérer la flore adventice en bordure de parcelle pour éviter l'installation de solanacées sauvages.

Le déplacement des adultes vers les plantes hôtes peut être ralenti par des obstacles tels que des cours d'eau, des fossés, ou des haies.

4 Taupins

Le taupin est un petit coléoptère de 2 à 20 mm de longueur et une couleur allant du jaune brillant au brun noirâtre. On note deux remontées annuelles des larves à la surface, l'une en fin de printemps et l'autre en fin d'été. C'est à ce moment-là que les parties souterraines sont attaquées car les larves creusent des galeries en se nourrissant de la chair des tubercules. Aussi, le taupin n'a pas d'incidence sur le développement végétatif de la pomme de terre.

a. Observations

Aucun taupin piégé cette semaine.



Ces notes Biodiversité sont produites dans le cadre du projet global de réorientation du Bulletin Santé Végétal : BSV 2.0.

Vous pouvez également les retrouver sur le site EcophytoPIC.



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles.

S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Observations : Arvalis - Institut du Végétal, ATPPDA, Cérèsia, CETA Craie Marne Sud, CETA de Champagne, CETA de Romilly, Chambre d'Agriculture des Ardennes, Chambre d'Agriculture de l'Aube, Chambre d'Agriculture de la Marne, Chambre d'Agriculture de la Haute-Marne, Cristal Union, DIGIT'AGRI, EIMR Marjollet Regis, EMC2, ETS RITARD, FREDON Grand Est, GRCETA de l'Aube, GRCETA de Troyes, ITB, NOVAGRAIN, SCA de Juniville, SCA d'Esternay, SCARA, SEPAC – Compagri, SOUFFLET Agriculture, TEREOS, Terres Inovia, VIVESCIA.

Rédaction : Arvalis Institut du Végétal, FREDON Grand Est, ITB et Terres Inovia.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.

Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV.

Coordination et renseignements : Joliane BRAILLARD - joliane.brillard@grandest.chambagri.fr

Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**



La stratégie
écophyto 2030
Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

