



Grandes Cultures – Pommes de terre – Légumes industriels

N° 28

18/08/26

A RETENIR (CTRL – CLIC POUR SUIVRE LE LIEN) :

Betterave : sécheresse persistante : 75 % des parcelles observées n'ont plus de couverture totale du sol. Situation plutôt stable en cercosporiose. Présence de rhizopus parfois importante.

Maïs : Majorité des parcelles à grains laitueux pâteux. Pas de pucerons, début d'un nouveau vol de pyrale, pas de sésamie.

Pomme de terre : aucun risque de contamination mildiou n'est prévu.

Oignon : le risque mildiou reste nul pour l'ensemble des postes météorologiques franciliens. La pression des thrips semble diminuer.

METEO

STATION DE LIEUSAIN (77)

	mar. 18	mer. 19	jeu. 20	ven. 21	sam. 22	dim. 23	lun. 24
	0	3.1	0.3	0	0.2	2.9	6.5
	44 / 77	47 / 85	35 / 89	34 / 77	40 / 87	50 / 88	50 / 94
	20 / 29	19 / 27	17 / 25	15 / 25	14 / 25	14 / 24	14 / 23


Source : Sencrop - Modèle : METEOBLUE

BETTERAVE

26 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES

La perte en feuillage continue sur l'ensemble du réseau, 74 % des parcelles ne couvrent plus le sol.



Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Région Île de France sur la base d'observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, il ne peut se substituer à une observation personnelle dans sa parcelle.

Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.

Pour vous abonner faites votre demande à ecophyto@idf.chambagri.fr en spécifiant la filière.

RAVAGEURS

• Jaunisse



Sur les 4 parcelles dont des informations sur la jaunisse sont renseignées, toutes présentent des symptômes, allant de quelques betteraves isolées touchées jusqu'à 30 % à Attainville (95).

Néanmoins, avec la sécheresse actuelle, il devient difficile d'observer les symptômes de jaunisse.


• Teignes



Sur 8 pièges relevés cette semaine, tous remontent la présence de papillons avec 40 papillons piégés en moyenne. Il y a de grandes différences de captures, avec seulement 7 papillons capturés à d'Huison-Longueville (91) contre 76 et 74 à Saint-Martin-de-Bréthencourt (78) et Crisenoy (77).

Ces données confirment le pic très intense du deuxième vol.

Parmi les 23 parcelles renseignées, 21 parcelles présentent des dégâts frais dont 17 parcelles au-dessus du seuil de risque.



A RETENIR

Risque : fort.

Stade de sensibilité : à partir de la couverture.

Seuil indicatif de risque : en présence de stress hydrique, 10 % de plantes touchées avec présence de dégâts frais ou chenilles.

• Pégomyies



Sur 15 parcelles renseignées, aucune n'indique de dégâts

A RETENIR

Risque : faible.

Stade de sensibilité : toute la période de végétation.


Seuil indicatif de risque : avant couverture du sol : 10 % de plantes avec au moins 1 galerie.

après couverture du sol : 50 % de plantes avec au moins 1 galerie ou présence d'asticots.

• Noctuelles



4 parcelles sur 20 observées pour ce ravageur remontent la présence de dégâts de noctuelles, allant de 10 à 20 % de betteraves touchées.



A RETENIR

Risque : faible en culture irriguée.
moyen en culture sèche.

Stade de sensibilité : de 6 feuilles à la récolte.

Seuil indicatif de risque : 50 % de plantes avec traces de morsures ou déjections récentes.

• Charançon lixus



Parmi les 31 parcelles renseignées, toutes ont des trous de pontes, avec en moyenne 51 % de betteraves touchées (de 3 à 100 % de betteraves touchées) dont 4 parcelles avec toutes les betteraves impactées.

Cette semaine, 12 parcelles renseignent des informations sur le rhizopus, 10 parcelles présentent des betteraves mortes (de 5 % à 40 % de la surface parcellaire touchée). A noter que la parcelle de Thorigny-sur-Oreuse (89) a 40 % de betteraves avec du rhizopus.


MALADIES DU FEUILLAGE

26 parcelles renseignées

• Cercosporiose



Une carte interactive sur le site de l'ITB permet de consulter le statut des parcelles par seuil de traitement <https://alerte.itbfr.org/maladies/>.



46 % des parcelles renseignées sont encore dépourvues de cercosporiose

3 sont au seuil du T1, aucune parcelle sous protection du T1

13 parcelles sous le seuil du T2,

Lente évolution de la maladie sur les parcelles touchées.

Les conditions météorologiques à venir seront moins défavorables à la maladie.

• Rouille et oïdium



La même parcelle que la semaine dernière à Puiseux-Pontoise (95) remonte 23 % des betteraves avec de l'oïdium
Cette même parcelle présente 1 % de rouille.

Aucune autre parcelle présente ces maladies.

A RETENIR

Risque : moyen pour la cercosporiose.

faible pour la rouille, l'oïdium et la ramulariose.

Stade de sensibilité : dès la couverture.

Seuil indicatif de risque : début de la protection avant la mi-août.

% de feuilles avec symptômes :

	T1	T2	T3
Cercosporiose	1ers symptômes	20%	25%
Ramulariose	5%	20%	25%
Oïdium	15%	30%	30%
Rouille	15%	40%	40%

MAÏS

11 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES

De grains laiteux/pâteux à 50 % humidité du grain (3 parcelles). 80% des parcelles sont au stade grains laiteux pâteux.

RAVAGEURS

• Pucerons




Pas de puceron observé cette semaine.

• Pyrales



4 parcelles exemptes de papillons. Les captures sont stables par rapport à la semaine dernière. L'impact de ce deuxième vol sera certainement limité avec des feuilles desséchées peu favorables au dépôt de ponte.



A RETENIR

Risque : faible

Stade de sensibilité : 10-12 feuilles à floraison.

• Sésamie



Pas de sésamie dans les parcelles observées cette semaine.

POMME DE TERRE

STADES

Début de sénescence à récolte.

MALADIES

• Mildiou - *Phytophthora infestans*



D'après le modèle Mileos®, aucun risque n'a été enregistré la semaine dernière sur les différents postes météorologiques suivis.

Malgré des conditions météorologiques favorables le 20 août, aucun risque n'est prévu dans l'ensemble des différents sites car les réserves de spores sont toujours faibles.

Situation au 18 août :

Stations météorologiques	Jours où le seuil indicatif de risque a été atteint			Réserves de spores au 18/08	Seuil indicatif de risque atteint			Pluies depuis le 11/08
	Variété sensible	Variété intermédiaire	Variété résistante		Variété sensible	Variété intermédiaire	Variété résistante	
77-Chailly-en-Brie				faible	non	non	non	0
77-Faÿ-Lès-Nemours				faible	non	non	non	0
77-Nangis				faible	non	non	non	0
78-Boissy-sans-Avoir				faible	non	non	non	1
78-Ménerville				faible	non	non	non	0
91-Etampes				faible	non	non	non	0,5
95-Vémaris				faible	non	non	non	0,5
95-Villiers-en-Arthies				faible	non	non	non	0

Attention, le risque indiqué dans le tableau ci-dessus n'est valable que pour les stations citées et ne peut prétendre indiquer le risque en tout lieu de la région, à plus forte raison en période d'orages avec des pluviométries très hétérogènes. De même, il ne prend pas en compte l'irrigation, il n'est valable que pour des parcelles non irriguées.

La sensibilité sur feuillage n'est pas corrélée avec la sensibilité sur tubercules. Ainsi, une variété résistante au mildiou sur feuilles peut être sensible sur tubercules, et inversement. La protection doit se maintenir même après le défanage.

Pour connaître la sensibilité au mildiou des variétés de pomme de terre, vous pouvez consulter le site du [Plant français de la pomme de terre dans la rubrique variétés](#).

A RETENIR

Risque : aucun risque de contamination n'est prévu, quelle que soit la sensibilité variétale.

Stade de sensibilité : dès la levée.

Le seuil indicatif de risque :

Pour que le seuil soit atteint, il faut d'une part, que le potentiel de sporulation soit atteint :

Moyen pour les variétés sensibles,

Élevé pour les variétés sensibles et intermédiaires,

Très élevé pour les variétés sensibles, intermédiaires et résistantes,

et d'autre part que les conditions météorologiques soient favorables à la libération de spores, à savoir une hygrométrie supérieure à 87 %, associée à des températures de 21 °C durant 6 heures consécutives ou supérieures à 15 °C pendant 8 heures.

Si du mildiou est observé à proximité de la parcelle, le risque démarre immédiatement.

Pour plus d'informations, consultez la fiche "[modèle Mileos, mildiou de la pomme de terre](#)". Elle décrit entre autres le cycle biologique du mildiou ainsi que l'interprétation du tableau des risques mildiou du BSV.

METHODES ALTERNATIVES :



Des produits de biocontrôle existent.



Le groupe mildiou / pomme de terre / OPUC (fluazinam) est exposé à un risque de résistance.
Le groupe mildiou / pomme de terre / RNAPI (benalaxyl, benalaxyl-M, metalaxyl-M) est exposé à un risque de résistance.

STADES

Pour les oignons semis, bulbe ayant atteint 70 % de sa taille finale à début tombaison.

MALADIES

- **Mildiou, *Peronospora destructor***



D'après le modèle Miloni de la DGAL, aucune nouvelle contamination de mildiou n'a été enregistrée depuis la semaine dernière, compte tenu des conditions météorologiques.

	Données du modèle au 18/08/2026			Date prévue de sortie de taches	Risque mildiou	
	Dates des dernières contaminations	Génération	% d'incubation		Oignons bulbilles	Oignons semis
78-Boissy-sans-Avoir	Aucune nouvelle contamination enregistrée				Non	Non
78-Les Mureaux	Aucune nouvelle contamination enregistrée				Non	Non
77-Villenoy	Aucune nouvelle contamination enregistrée				Non	Non
77-Lumigny	Aucune nouvelle contamination enregistrée				Non	Non
91-Torhou	Aucune nouvelle contamination enregistrée				Non	Non
95-Vémars	Aucune nouvelle contamination enregistrée				Non	Non

Les dates prévues de sorties de tache de mildiou sont données à titre indicatif (évolution en fonction des conditions météorologiques).

Attention, le modèle ne prend pas en compte l'irrigation des parcelles, le risque peut être dans ce cas-là plus important.

A RETENIR

Risque : le risque reste faible voire nul pour l'ensemble des secteurs.

Stade de sensibilité : dès le stade 2 feuilles.

Seuil indicatif de risque :

pour les oignons bulbilles, dès la 2^{ème} génération.

pour les semis, dès la 3^{ème} génération.

Pour avoir des informations sur le cycle du mildiou de l'oignon, consultez le [BSV grandes cultures n°13 du 05 mai 2026](#) et la fiche "[Modèle MILONI : Mildiou de l'oignon](#)". Cette dernière informe également des mesures prophylactiques à mettre en œuvre pour réduire les risques de contamination et de développement du mildiou.

RAVAGEURS

- **Thrips, *Thrips tabaci***



La pression des thrips diminue à La Houssaye-en-Brie (77), où le seuil de risque n'est plus dépassé (cf. tableau ci-dessous).

Des thrips prédateurs (*Aeolothrips intermedius*) sont également présents sur ce même site, sur 10 % des pieds.

	Semaine 33			Semaine 34		
	% de pieds touchés par les thrips	Thrips – Nombre moyen / plante	Auxiliaire : Aeolothrips - % pieds avec présence	% de pieds touchés par les thrips	Thrips – Nombre moyen / plante	Auxiliaire : Aeolothrips - % pieds avec présence
77-POINCY	20 %	0,2	0 %			
77-LA HOUSSAYE-EN-BRIE	50 %	2,8	55 %	30 %	0,85	10 %
91-ANGERVILLE	30 %	0,3	70 %			

Pour avoir des informations sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV grandes cultures n°13 du 05 mai 2026](#).

A RETENIR

Risque : le risque devient faible à modéré.

Stade de sensibilité : dès la levée.

Seuil indicatif de risque : 2 thrips par pied.

• Mouches mineuses, *Lyriomyza cepae*



Aucune galerie de mouches mineuses n'est relevée cette semaine, mais seule la parcelle de La Houssaye-en-Brie (77) a été observée. Lors des relevés précédents, des galeries étaient présentes à Angerville (91).

Pour avoir des informations sur ce ravageur, vous pouvez consulter le [BSV grandes cultures n°18 du 10 juin 2026](#).

Mines sur oignon
(FREDON Ile de France)



Vous trouverez sur le site de la DRIAIF les fiches des Organismes Réglementés de la filière :

<https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-grandes-cultures-r739.html>,

<https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-pomme-de-terre-r737.html>

Les notes nationales de biodiversité sont consultables sous <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/notes-nationales-biodiversite-r607.html>

Pour en savoir plus sur :

-Les résistances : <https://www.r4p-inra.fr/fr/home/>

-Les produits de biocontrôle : <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/liste-officielle-biocontrrole-avril-2023-a1709.html>

-Les adventices : <https://www.infloweb.fr/>

• Observations :

AGRICULTEURS, COOP 110 BOURGOGNE, CERESIA, ARVALIS, CARIDF, CENTREXP, COOPERATIVE ILE DE FRANCE SUD, COOP SEVEPI, Ets SOUFFLET AGRICULTURE, FREDON IDF, ITB IDF, SRAL, SUCRERIE CRISTAL UNION, SUCRERIE TEREOS, TERRES INOVIA.

• Rédaction :

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE : Hugues BERGAMINI, Nicolas GREAUME, Valentine BOULLENGER, Clément LECLERCQ, Claire TURILLON.

FREDON Ile de France : Céline GUILLEM.

• Comité de relecture :

ARVALIS, Chambre d'Agriculture de Région Île de France, TERRES INOVIA, ITB, SRAL.