



BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL de Bourgogne-Franche-Comté



SOMMAIRE

P. 1 Météo

P. 2 Biodiversité et santé des agrosystèmes

P. 3 Colza

P. 9 Tournesol

A RETENIR

Colza :

- Levées retardées par le sec. Quelques parcelles à cotylédons en fonction des orages (Est BFC)
- Surveiller les morsures de petites altises et de criquets dès la levée.
- Mettre en place les pièges (cuvettes jaunes enterrées, pièges à limace).

Tournesol :

- Repérer la maturité pour éviter les pertes liées à une récolte trop tardive.

METEO

Prévisions à 7 jours :

MARDI 25	MERCREDI 26	JEUDI 27	VENDREDI 28	SAMEDI 29	DIMANCHE 30	LUNDI 31
						
18° / 27°	16° / 30°	18° / 31°	16° / 25°	15° / 24°	14° / 26°	16° / 24°
▲ 10 km/h	▲ 15 km/h	▲ 15 km/h	▲ 20 km/h	▼ 20 km/h	▲ 15 km/h	▼ 5 km/h
55 km/h			45 km/h	40 km/h		40 km/h

(Source : Météo France, Brazey en Plaine (21470), 25/08/2026 à 10h00. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))

Biodiversité et santé des agrosystèmes

Toutes les fiches biodiversité et santé des agrosystèmes ainsi que les fiches réglementaires sont disponibles sur le site de la Chambre régionale de Bourgogne Franche-Comté.

Biodiversité et santé des agrosystèmes

Ces notes biodiversité visent à accompagner la démarche agroécologique portée par le bulletin de santé du végétal.





COLZA

RESEAU 2026 - 2027

Cette semaine, le BSV a été rédigé à partir des observations réalisées dans 20 parcelles.

Stade

Depuis la semaine dernière, les pluies sont toujours rares, peu significatives et extrêmement localisées. Les semis se sont poursuivis jusqu'à aujourd'hui. Une majorité est maintenant réalisée. Les stades évoluent peu, même pour les semis de début août. La plupart des graines sont encore en terre, le plus souvent intactes, à l'exception de la Haute Saône où les orages ont permis des levées.

Des cas de colzas germés ou levés puis desséchés par manque d'eau sont rapportés.

Composition du réseau de parcelles au 25/08/2026

Commune	Dép.	Date semis	Stade	Variété
ANNOIRE	39	19/08/2026	Semis	BESSITO (100 %)
DESNES	39	24/08/2026	Semis	BESSITO (50 %) LID TEBO (50 %),
OUNANS	39	20/08/2026	Semis (En germination)	HEDEN (100 %)
SAINT-AUBIN	39	21/08/2026	Semis	BLACKBERRY (100 %)
SERMANGE	39	20/08/2026	Semis	
BONBOILLON	70	15/08/2026	Cotylédons	
CUGNEY	70	16/08/2026	Cotylédons	
MONTUREUX-ET-PRANTIGNY	70	13/08/2026	Cotylédons	BESSITO (100 %)
MOTÉY-BESUCHE	70	18/08/2026	Cotylédons	
PESMES	70	20/08/2026	Semis	DK PLACID (100 %)
SAINT-GERVAIS-EN-VALLIÈRE	71	19/08/2026	Semis	RGT CRAFTER (50 %) KWS DOMINGOS (50 %),
AIGREMONT	89	20/08/2026	Semis	
BRANNAY	89	20/08/2026	Semis	HAALAND (100 %)
BRIENON-SUR-ARMANÇON	89	10/08/2026	Semis	
BUSSY-LE-REPOS	89	18/08/2026	Semis	
CARISEY	89	14/08/2026	Semis	
CHARBUY	89	13/08/2026	Semis	
GY-L'ÉVÊQUE	89	05/08/2026	Semis	
LES SIÈGES	89	12/08/2026	Semis	CODEX (100 %)
TONNERRE	89	17/08/2026	Semis	



Début de germination, semis de mi-août
T. Laurent - CA89



Colza associé, semis de mi-août
E. Courbet - CA70

Mise en œuvre des pièges

Les pièges doivent être mis en place dès l'implantation des colzas.

Ils permettront d'appréhender l'arrivée des insectes en temps réel et de façon très locale pour avoir une lutte contre les ravageurs qui soit adaptée, efficace et raisonnée.

Les pièges sont essentiels pour pouvoir utiliser les seuils de nuisibilité et mesurer les risques sur les parcelles de colza.

Avant la levée de la culture puis en complément de l'observation des plantes, les pièges nous informent sur l'arrivée des ravageurs et leur activité.

Pièges à limaces :



Piège à limaces
N. Ralai - CA89

Avant la levée de la culture, l'observation des limaces grises et noires se fait à l'aide de 4 pièges de 25x25 cm préalablement humidifiés par trempage, éloignés d'au moins 5m les uns des autres.

Pour fixer les limaces et faciliter le comptage, il est possible de rajouter quelques granulés anti-limaces sous le piège.

Cette observation nécessite une attention particulière. En effet, le relevé des pièges doit s'effectuer en début de matinée en conditions fraîches et humides et en « grattant » la terre sous les pièges car les limaces sont généralement abritées entre les mottes dans les premiers cm du sol

Les cuvettes jaunes :

Elles se placent au niveau de la végétation sauf pour les grosses altises (altises d'hiver) ou la cuvette doit être enterrée.



Cuvette enterrée

Terres Inovia




L. Jung

Terres Inovia

Pour capturer l'altise d'hiver ou grosse altise, la cuvette doit être enterrée, bord supérieur à 1-2 cm au-dessus du sol.

La plupart des insectes sont attirés par la couleur jaune. L'altise d'hiver fait exception.

On enterre la cuvette dans le sol pour favoriser les captures à l'occasion de ses sauts (piège d'interception). Les altises doivent pouvoir tomber dans le piège au fil de leur avancée dans la parcelle.



Cuvette en végétation

Terres Inovia

Pour les autres insectes, la cuvette doit être toujours comme "posée" sur la végétation.

Quelques conseils d'usage pour que les pièges soient attractifs :

- Positionner le piège dans le champ en tenant compte des vents dominant et de la proximité d'une ancienne parcelle de colza.
- Remplir la cuvette avec 1 litre d'eau et quelques gouttes de mouillant de type liquide vaisselle (pas trop). Prévoir un bidon plein de ce mélange qui reste dans la parcelle pour faire le niveau de la cuvette.
- Eviter les piétinements qui modifient le contexte de végétation. Si nécessaire, déplacer la cuvette.
- Nettoyer la cuvette jaune pour qu'elle reste attractive. Si la couleur jaune est « passée », changer la cuvette.
- Relever le(les) cuvette(s) toutes les semaines : filtrer les insectes et éventuellement les laisser sécher pour faciliter leur reconnaissance, remplacer l'eau régulièrement, repositionner la cuvette en fonction de la hauteur de la végétation.

Ravageurs

Les premiers insectes susceptibles d'être observés dans les cuvettes sont les petites altises (ou altises des crucifères). Attention à ne pas les confondre avec les grosses altises (ou altises d'hiver) qui, en général, arrivent plus tard, vers la mi-septembre.

Altises des crucifères ou petites altises

Il s'agit d'un petit coléoptère noir ou bicolore (noir, avec 1 ou 2 bandes longitudinales jaunes sur chaque élytre). Il mesure 2 à 2,5 mm.

a. Observations

Aucune capture et aucune morsure ne sont signalées.

b. Période de risque

Depuis la levée jusqu'au stade 3-4 feuilles.

c. Seuil indicatif de risque :

8 pieds sur 10 portants des morsures **et** 25 % de la surface foliaire détruite.

La vigilance doit se porter en priorité en bordure de parcelle.

Dans les zones où des repousses de colza sont présentes, la destruction de celles-ci entraîne un déplacement de population, et donc augmente le risque.



Pour le moment aucun cas de résistance des petites altises aux pyrèthrinoïdes n'a été mis en évidence.

d. Analyse du risque :

- pour les colzas non levés (majorité des situations), le risque est **faible**.



- pour les colzas à partir du stade cotylédons, le risque est encore **assez faible**.
Surveiller en priorité les bordures de parcelles et celles à proximité d'anciens colzas.



Remarque : afin ne pas déplacer les populations de petites altises, il est préférable d'attendre que les nouveaux colzas aient dépassé la période de risque (4-5 feuilles) avant de détruire les repousses.

Criquets italiens

Ils sont régulièrement observés hors réseau. Les températures chaudes semblent favorables à leur développement tandis que le sec raréfie leur source de nourriture « verte ».



Criquet italien

Muséum National d'Histoire Naturelle

Punaises des céréales

Les années chaudes et sèches, il arrive que ces punaises attaquent les jeunes colzas en cours de levée. Aucune solution de lutte n'a été identifiée à ce jour.

Symptômes : flétrissement rapide, dessèchement, disparition des pieds. Les foyers sont souvent localisés en bordure de parcelles.

Des individus sont parfois présents hors réseau, sans que des dégâts ne soient signalés.



J.D. Chapelin-Viscardi

Limaces

Le colza est particulièrement appétant pour les limaces. Le risque est accru sur sol motteux, avec résidus pailleux. Un suivi régulier (observations, pièges) est indispensable.

a. Observations :

Aucun dégât signalé.

b. Période de risque :

Depuis la levée jusqu'au stade 3-4 feuilles.

c. Seuil indicatif de risque :

Il n'y a pas de seuil indicatif de risque pour les limaces mais en cas de forte présence, la survie de la culture est en jeu.

d. Analyse du risque :

Risque **faible** actuellement. Il pourra être revu à la hausse si des orages surviennent et humidifient les sols.



Des solutions de biocontrôle à base de phosphate ferrique existent.

Autres

Des attaques de taupins sont localement signalées hors réseau.

Adventices

Les levées de graminées (repousses et ray-grass) sont rares actuellement, hormis dans les secteurs significativement arrosés.

Après le retour des pluies, il conviendra de ne pas les laisser concurrencer les colzas pour l'accès à l'eau.



Levée de ray-grass

E. Courbet - CA70



TOURNESOL

RESEAU 2026 - 2027

Stade

Les récoltes sont en cours. De la prédation (oiseaux, sangliers) est signalée.

Récoltez au bon stade



L'observation des plantes, notamment des capitules, doit vous permettre d'identifier le stade optimal de récolte. Les valeurs d'humidité sont indicatives. Elles peuvent varier en fonction des régions, du contexte climatique, du taux d'impuretés, de l'état sanitaire des capitules et de leur taille.

Terres Inovia



Dégâts de sanglier

G. Frémont - CA89



Mauvaise fécondation et remplissage (sécheresse et canicule)

M. Lautier - CA89

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté et rédaction animée par ARVALIS-Institut du Végétal, Terres Inovia et les Chambres d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté.



Bulletin édité à partir des observations réalisées par :



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux-mêmes réalisées sur leurs parcelles ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques de leurs conseillers.