

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL de Bourgogne-Franche-Comté

Liste de diffusion : inscrivez-vous en ligne !

Si vous ne recevez pas encore le BSV Légumes chaque semaine, vous pouvez vous abonner en cliquant [ici](#)

PREVISIONS METEO

Besançon (25)

MERCREDI 27	JEUDI 28	VENDREDI 29	SAMEDI 30	DIMANCHE 31	LUNDI 01	MARDI 02
17° / 24°	17° / 22°	13° / 21°	14° / 21°	14° / 22°	13° / 21°	11° / 20°
↙ 15 km/h 80 km/h	↙ 15 km/h	↙ 20 km/h 55 km/h	↙ 20 km/h 40 km/h	↙ 15 km/h 40 km/h	↗ 15 km/h	↗ 15 km/h

Dijon (21)

MERCREDI 27	JEUDI 28	VENDREDI 29	SAMEDI 30	DIMANCHE 31	LUNDI 01	MARDI 02
15° / 24°	15° / 23°	11° / 20°	11° / 21°	15° / 23°	14° / 22°	11° / 22°
↗ 15 km/h 80 km/h	↙ 15 km/h	↙ 20 km/h 50 km/h	↙ 20 km/h	↙ 15 km/h	↗ 15 km/h	↗ 10 km/h

Nevers (58)

MERCREDI 27	JEUDI 28	VENDREDI 29	SAMEDI 30	DIMANCHE 31	LUNDI 01	MARDI 02
16° / 24°	16° / 23°	13° / 21°	13° / 23°	16° / 24°	12° / 22°	11° / 22°
↘ 10 km/h 60 km/h	↗ 20 km/h 40 km/h	↙ 20 km/h 50 km/h	↙ 20 km/h 40 km/h	↙ 15 km/h	↗ 10 km/h 40 km/h	↗ 15 km/h

Biodiversité et santé des agrosystèmes

Toutes les fiches biodiversité et santé des agrosystèmes ainsi que les fiches réglementaires sont disponibles sur le site de la Chambre régionale de Bourgogne-Franche-Comté.



Note Nationale
Biodiversité



Cette note vise à accompagner la démarche agro-écologique portée par le Bulletin de Santé du Végétal. Elle propose une synthèse de 2 pages sur un volet biodiversité associé à la santé générale des agro-écosystèmes.



2 pictogrammes pour retrouver d'un coup d'œil :



Les solutions de biocontrôle

👉 [Liste des produits de biocontrôle](#)

Les résistances d'un bioagresseur sur une culture, vis-à-vis d'une matière active.

👉 [Résistance aux produits phytosanitaires](#)



POMME DE TERRE

Stade phénologique

Départements	15 parcelles observées sur les 17 du réseau	Stade(s) majoritaire(s)
Côte-d'Or	Chevigny-Saint-Sauveur, Corcelles-lès-Cîteaux, Fénay, St Julien, Tréclun, Varanges, Quetigny, Varois-et-Chaignot	2 parcelles encore en tubérisation 1 parcelle en sénescence 12 parcelles au stade récolte
Doubs	Rigney, Cordiron	
Jura	Augisey, Larnaud	
Nièvre	Pouigny, Nevers	
Yonne	Orgy	

Les observations sont donc réalisées sur les 3 parcelles qui ont encore du feuillage.



Tubérisation en cours, Pouigny (58), 24/08/26 (J Nagopaé)

Maladies

Mildiou



Observations

Aucun symptôme de mildiou observé sur les 3 parcelles.

Tableau de risque selon le Modèle MILEOS :

Station météo	Jours où le seuil de nuisibilité a été atteint								Pluie (mm) depuis 7 jours
	18/08	19/08	20/08	21/08	22/08	23/08	24/08	25/08	
21 - Noiron-sous-Gevrey									6,7
21 - Saint-Julien									14,3
21 - Varanges									8,4
25 - Burgille									2,1
25 - Rigney									16
39 - Passenans									10,2
58 - Nevers									0,2
58 - Pougny									3,9
89 - Vaux terres rouges									4

	Seuil de nuisibilité faible
	Seuil de nuisibilité atteint pour variétés sensibles
	Seuil de nuisibilité atteint pour variétés sensibles et intermédiaires
	Seuil de nuisibilité atteint pour toutes les variétés, y compris résistantes



Évolution du risque

Les parcelles en cours de tubérisation peuvent présenter un risque au vu de la chute des températures et du retour des précipitations.

Alternaria



Observations

1 parcelle sur les 3 montre quelques foyers de la maladie.



Évolution du risque

Le risque se maintient pour ces parcelles.

Ravageurs

Doryphore



Observations

Le ravageur est présent sur les 3 parcelles en végétation, la pression va de quelques adultes à plus de 25% de la parcelle détruite.



Seuils de nuisibilité

- en agriculture conventionnelle : présence en bordure de 2 foyers pour 1 000 m² (foyer : 1 ou 2 plantes avec au moins 20 larves **au stade grain de blé**).
- en agriculture biologique : présence en bordure de 2 foyers pour 1 000 m² (foyer : 1 ou 2 plantes avec au moins 20 larves **au stade éclosion**).



Évolution du risque

Le risque reste élevé pour les parcelles encore en végétation.

Puceron



Observations

Aucun puceron n'est observé sur les 3 parcelles en végétation.

Des coccinelles sont présentes dans une parcelle.



Évolution du risque

Le risque est nul à faible.

En résumé

Maladies et ravageurs	Risques sur Pomme de Terre
Mildiou	
Alternaria	
Doryphore	
Puceron	

Légende	
Risque nul à faible	
Risque moyen	
Risque élevé	



OIGNON

Stade phénologique

Départements	3 parcelles semées observées sur 3	2 parcelles bulbilles observées sur 9	2 parcelles en mottes observées sur 2
Côte-d'Or	Fénay, Domois, Arc-sur-Tille	Quetigny, Fauverney	
Doubs			
Haute-Saone			Montagney
Nièvre			
Jura			St Lamain
Yonne		Orgy	
Stade(s) majoritaire(s)	Récolte	Récolte	Récolte

L'observation a été réalisée sur la seule parcelle avec encore du feuillage.



Fenay (21) 24/08/26 (AL Galimard)



Montagney (70), 24/08/26 (C Sthoer)



Domois (21), 24/08/26 (L Thibault)

Etats des parcelles en récolte.

Maladies

Mildiou



Observations

Aucun symptôme de mildiou observé sur la parcelle présentant encore du feuillage.



Évolution du risque

Risque nul.

Brûlure des feuilles (*Botrytis squamosa*)



Observations

Pas d'observation de la maladie.



Évolution du risque

Risque nul.

Ravageurs

Thrips



Observations

Sur la parcelle encore en végétation, 30% des plants comportent quelques *thrips tabaci*.



Biocontrôle

Des thrips du genre *Aeolothrips*, prédateurs de thrips sont présents dans la parcelle et régulent efficacement la population de thrips phytophages.

**Évolution du risque**

La pression en thrips peut diminuer avec les précipitations et l'humidité.

Mouche**Observations**

Pas d'observation.

**Évolution du risque**

Risque nul.

En résumé

Maladies et ravageurs	Risques sur Oignon
Mildiou	
Botrytis	
Thrips	
Mouche	

Légende	
Risque nul à faible	
Risque moyen	
Risque élevé	



AUBERGINE SOUS ABRI

Stade phénologique

Départements	15 parcelles observées sur les 15 du réseau	Stade(s) majoritaire(s)
Côte-d'Or	Chevigny-Saint-Sauveur, Messigny-et-Vantoux, Quetigny, Echenon, Labergement-lès-Auxonne	Toutes les parcelles sont au stade récolte
Doubs	Grosbois	
Haute-Saone	Montagney	
Nièvre	Alligny-Cosne, Pougny, Nevers	
Jura	Romain, Fouchierans, St Lomain, Nance	
Yonne	Orgy	

Observations réalisées sur 14 des 15 parcelles, pour respecter le délai de réentrée dans 1 parcelle à la suite d'un traitement phytosanitaire.



État de la culture, Saint Lomain (39), 24/08/26 (N Cadoux)

Ravageurs

Acarien tétranyque



Observations

11 parcelles présentent des acariens :

- 2 parcelles avec quelques individus sur moins de 20% des plants
- 4 parcelles avec foyers sur plus de 50% du tunnel
- 4 parcelles avec présence de toiles sur 20% des plants
- 1 parcelle avec présence généralisée du ravageur et présence de toiles



Foyer d'acariens, Chevigny St sauveur (21), 24/08/26 (AL Galimard)



Évolution du risque

Le risque reste élevé, les températures restant encore chaudes.



Biocontrôle

De minuscules coccinelles du genre *Stethorus* sont régulièrement observées sur les cultures infestées d'acariens, elles en sont des prédateurs naturels.



Stethorus, hors réseau, 24/08/26 (AL Galimard)

Doryphore



Observations

9 parcelles montrent la présence de doryphores :

- 4 avec moins de 5 individus sur 20% des plants
- 2 avec moins de 5 individus sur l'ensemble des plantes
- 3 parcelles avec présence de plus de 5 individus sur plus de la moitié des plants



Doryphores adultes et larves, Montagney, 24/08/26 (C. Stoher)



Évolution du risque

Le risque est élevé, les doryphores rentrant dans les serres suite à la senescence des pommes de terre.

Puceron



Observations

1 seule parcelle présente plusieurs colonies sur 30% des plants.



Biocontrôle

La régulation des pucerons se fait naturellement grâce à la présence des auxiliaires observés : Orius, Macrolophus, Coccinelles principalement observés cette semaine ; et Chrysope, Syrpe, Aphidoletes, momies engendrées par Aphidius plus rarement présents cette fois.



Évolution du risque

Le risque pourrait remonter avec le retour de températures clémentes et d'une hygrométrie plus élevée.

Punaises phytophages



Observations

9 parcelles montrent la présence de punaises :

- Halyomorpha sur 1 parcelle
- Lygus sur 6 parcelles
- Nezara sur 5 parcelles

Des boutons piqués sont présents sur 6 parcelles, sur 8 à 50 % des plants.



Évolution du risque

Le risque augmente.

En résumé

Maladies et ravageurs	Risques sur Aubergine
Acarien	
Doryphore	
Puceron	À surveiller
Punaises phytophages	

Légende	
Risque nul à faible	
Risque moyen	
Risque élevé	



CONCOMBRE SOUS ABRI

Stade phénologique

Départements	14 parcelles observées sur les 16 du réseau	Stade(s) majoritaire(s)
Côte-d'Or	Chevigny-Saint-Sauveur, Messigny-et-Vantoux, Quetigny, Echenon, Labergement-lès-Auxonne	4 parcelles sont en fin de cultures 10 parcelles toujours en récolte
Doubs	Grosbois	
Nièvre	Sauvigny-les-Bois, Pougny, Nevers	
Jura	Romain, Foucherans, Augisey, St Lamain	
Yonne	Orgy	

Les observations ont été réalisées sur les 10 parcelles encore en végétation.

Maladies

Oïdium



Observations

7 parcelles sur les 10 présentent des symptômes d'oïdium sur feuilles :

- 5 parcelles avec quelques taches sur le feuillage
- 2 parcelles avec plusieurs foyers détectés



Tâches d'oïdium favorisé par les températures douces, Chevigny (21), 24/08/2026 (AL Galimard)



Prophylaxie

Privilégier des variétés tolérantes à l'oïdium. La proximité des courgettes (mêmes souches d'oïdium) et les courants d'air sont également des facteurs favorables au développement et à la dissémination de la maladie.



Évolution du risque

L'oïdium est favorisé par les fortes amplitudes thermiques jour/nuit. Le risque augmente avec l'allongement des nuits.

Ravageurs

Acarien tétranyque



Observations

10 parcelles sur 14 notent la présence des acariens :

- 4 parcelles ayant seulement notées la présence de quelques individus
- 3 parcelles avec des foyers constitués
- 3 parcelles dont la présence de toiles est généralisée



Présence généralisée dans 3 tunnels sur 10, Pougny (58), 24/08/2026 (J Nagopaé)



Prophylaxie

Le bassinage et le blanchiment des tunnels permettent de maintenir des conditions défavorables aux acariens et favorables aux auxiliaires prédateurs.



Biocontrôle

Les larves des cécidomyies *Feltiella*, non-observées cette semaine, mais présentes naturellement dans les tunnels et observées en saison, restent d'excellentes prédatrices des acariens.

Retrouvez la [Liste des produits de biocontrôle](#)



Évolution du risque

Sous abris les températures restent propices au développement du bioagresseur, de ce fait, le risque se maintient.

Puceron



Observations

6 parcelles sur les 14 observées avec présence de pucerons :

- 2 parcelles avec seulement quelques individus isolés
- 4 parcelles avec plusieurs colonies, sur 25 à 100% du tunnel



Biocontrôle

Le parasitisme ou la présence de prédateurs sur 50 % de la population de pucerons est un indicateur de bonne régulation de la pression.

Cette semaine, le réseau note la présence de coccinelles, momies de micro hyménoptères, et syrphe (adultes et larves).



Selon les sites, observations d'auxiliaires seuls comme à gauche cocon de coccinelles et larves d'Aphidoletes ou alors un combo de plusieurs espèces (Aphidoletes+ larves de syrphes+momie).

Photo prises le 24/08/2026 à Grosbois (25) I Mahé et Sauvigny-les-Bois (58) et J Nagopé

**Évolution du risque**

Même si les autres ravageurs (acariens, thrips et punaises) semblent faire plus de dégâts cette année, il reste tout de même un fond de cuve dans les populations de pucerons, le risque se maintient donc sur les parcelles concernées.

Thrips**Observations**

9 parcelles avec individus et dégâts sur les 14 observées, réparties de la façon suivante :

- 6 parcelles avec quelques individus observés sans dégâts apparents
- 3 parcelles avec nombreux individus et également des fruits piqués

**Biocontrôle**

Le présence d'Orius, punaise prédatrice, est signalée dans certaines parcelles du réseau. Elle peut aider à gérer les populations de thrips.

**Évolution du risque**

Le risque thrips se maintient.

En résumé

Maladies et ravageurs	Risques sur Concombre	
Oïdium		
Acarien		
Puceron		
Thrips		

Légende	
Risque nul à faible	
Risque moyen	
Risque élevé	



TOMATE SOUS ABRI

Stade phénologique

Départements	16 parcelles observées sur les 16 du réseau	Stade(s) majoritaire(s)
Côte-d'Or	Chevigny-Saint-Sauveur, Féney, Quetigny, Echenon, Labergement-lès-Auxonne	Toutes les parcelles sont au stade récolte
Doubs	Grosbois, Rigney	
Haute-Saône	Montagney	
Nièvre	Sauvigny-les-Bois, Pougny, Nevers	
Yonne	Orgy	
Jura	Romain, Foucheraus, Augisey, Nance	



Parcelle de tomate à récolte, Echenon (21), 24/08/2026 (L Thibault)

Maladies

Mildiou



Observations

Aucun symptôme de mildiou observé cette semaine sur les parcelles du réseau.



Évolution du risque

Le risque est faible.

Cladosporiose



Observations

Les 4 parcelles sur les 16 observées notent la présence de la maladie, elles sont réparties de la façon suivante :

- 2 parcelles avec présence de cladosporiose sur 10 % des plants.
- 2 parcelles avec présence de la maladie sur plus de 20 % des plants.



Évolution du risque

Le risque se maintient à faible et reste à surveiller notamment sur les variétés sensibles.

Ravageurs

Puceron



Observations

Présence de pucerons sur 5 parcelles, dans cet ordre :

- 3 parcelles avec quelques individus isolés dans les tunnels
- 2 parcelles avec des colonies sur 8% des plants



Évolution du risque

La surveillance est à maintenir sur les parcelles concernées.

Aleurode



Observations

1 parcelle signale la présence du biogresseur avec notamment l'observations de quelques individus sur 17 % des plantes du tunnel.



Présence de quelques pupariums d'aleurodes, Nance (39), 21/08/2026 (N Cadoux)



Biocontrôle

Des punaises *Macrolophus* sont observées dans 6 parcelles du réseau. Elles sont prédatrices de tous les stades d'aleurode.



Quelques punaises *Macrolophus* dans certains tunnels du réseau somme ici à Pougny (58), 24/08/2026 (J Nagopaé)



Observations

Le risque est faible, les auxiliaires présents régulant la pression.


Observations diverses : bioagresseurs hors-protocole BSV

- Acariens tétranyques sur 2 parcelles



Des dégâts dus aux acariens sont visibles dans certains tunnels. Ici dessèchement partiel du feuillage. Chevigny-Saint-Sauveur (21), 24/08/2026 (AL Galimard)

- Meloidogyne avec galles aux niveau des racines



La présence du nématode provoque un dépérissement complet des plants sur les parcelles infectées, (photo de gauche). Des galles sont alors visibles sur les racines. Labergement (21), 24/08/2026 (L Thibault)

- 3 parcelles avec la punaise Hyaline

La Punaise hyaline (*Liorhyssus hyalinus*) est une petite punaise jaune clair, orangée ou grise de la famille des Rhopalidés. Larves et adultes se nourrissent des sucs des tiges et fruits de plantes hôtes diverses. En grand nombre sur les fruits, leurs piqures de nutrition occasionnent de légères ponctuations et décoloration sur le fruits. Insecte à surveiller car se plaît lorsque les conditions chaudes et sèches sont réunies.. comme sous-abris.



Espèce encore assez discrète chez les maraichers mais qui reste à surveiller, Pougny (58), 24/08/2026 (J Nagopaé)

En résumé

Maladies et ravageurs	Risque Tomate
Cladosporiose	À surveiller
Mildiou	
Aleurode	À surveiller
Puceron	À surveiller

Légende	
Risque nul à faible	
Risque moyen	
Risque élevé	

Biodiversité et santé des agrosystèmes

Ces notes biodiversité visent à accompagner la démarche agroécologique portée par le bulletin de santé du végétal.



Prochain BSV : BSV Bilan

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté à partir des observations réalisées par la Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté, la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or, la Chambre d'agriculture du Jura, la Chambre d'agriculture de la Nièvre et Bio Bourgogne-Franche-Comté.



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux-mêmes réalisées sur leurs parcelles ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques de leurs conseillers.

Dispositif supervisé par le Service Régional de l'Alimentation dans le cadre du dispositif de Surveillance Biologique du Territoire du plan régional Ecophyto.