



SOMMAIRE :

• Mildiou :

-**Situation sur le terrain** : Situation saine.

-**Risques** : réserve de spores potentielle en augmentation. **Seuil indicatif de risque atteint sur de nombreux postes.**

• **Alternaria** : Seuil indicatif de risque atteint. **Seules les variétés sensibles, peu sénescentes et non défanées à court terme sont concernées.**

• **Limaces** : A surveiller avec le retour des pluies.

• **Taupins** : Aucun dégât observé au sein du réseau. Réalisez des comptages.

• **Cicadelles** : Présence prolongée en parcelles



Variété Fontane. 75% de sénescence.
Neuville Saint Vaast (62)
Photo : C.HACCART—CA59/62

OBSERVATIONS : 34 parcelles ont été observées cette semaine.

SITUATION DANS LA PLAINE :

Dans le Nord et le Pas de Calais, sur les 7 derniers jours la pluviométrie moyenne enregistrée est de 43mm (de 15mm à 72mm selon les secteurs). Ces précipitations tant attendues ne profiteront malheureusement pas à toutes les parcelles, en terme de gain de rendement et de grossissement, au vu de l'avancée importante de la sénescence dans de nombreuses situations. Seules les parcelles encore vertes (irriguées, variétés tardives) pourront voir leur grossissement favorisé de façon significative. On remarque toutefois que, grâce aux pluies, la végétation se maintient depuis la semaine dernière, elle se redresse et semble même reverdir par endroit. Dans tous les cas, ces précipitations vont permettre d'améliorer les conditions d'arrachage.

En terme de qualité, si l'eau va aider à faire baisser les matières sèches, les phénomènes de désordres physiologiques sont à surveiller de près. En effet, la reprise de la croissance peut se concrétiser par la formation de germes, déformation, poupées et ce au détriment du grossissement. Des signes de rejumelage sont déjà observés cette semaine dans des parcelles particulièrement stressées et bloquées.

Les prélèvements effectués semaine 34 sur 20 parcelles de variété Fontane et Challenger montrent des rendements et des calibres historiquement faibles avec des situations très hétérogènes en fonction du facteur irrigation, avec globalement : des rendements nets en dessous de la moyenne (-15%), une proportion de gros calibres très faible, une tubérisation >35mm assez élevée, des matières sèches élevées à très élevées, un taux de défauts faible. Les situations irriguées montrent un net avantage aussi bien en rendement (+52%) qu'en calibre (+180% de + 50mm).

Dans les départements Picards, sur les 7 derniers jours, la pluviométrie moyenne enregistrée est de 18 mm (de 0 à 60 mm selon les secteurs). 90 % des parcelles (11 suivies cette semaine) sont au moins au stade début sénescence dont 64 % déjà au stade 50% de sénescence

Le grossissement des tubercules se poursuit, mais à un rythme ralenti. Les pluies enregistrées la semaine dernière ont permis une légère reprise de la végétation dans certaines parcelles, avec un reverdissement partiel du feuillage, notamment dans les situations ayant bénéficié d'une meilleure disponibilité en eau. Cette reprise reste toutefois hétérogène et limitée dans les parcelles ayant subi des stress importants. Les conditions climatiques des dernières semaines ont néanmoins accéléré la maturité physiologique des cultures. La sénescence reste engagée et continue de progresser, même si son évolution apparaît temporairement ralentie. Les écarts entre parcelles restent importants en fonction de la disponibilité en eau, de la réserve utile des sols et du facteur irrigation.

METEO : des précipitations sont annoncées pour les jours à venir, accompagnées par une hygrométrie nocturne et matinale élevée. Les températures devraient être assez chaudes cette semaine (25 à 28°C l'après midi) avant une baisse annoncée à partir du week-end.



Fontane irriguée, végétation encore bien verte—Deulémont (59)
Photo : C.Haccart—CA59/62



Désordres physiologiques sur Fontane : formation de germes, tiges aériennes, poupées.
Photo : C.Haccart—CA59/62



Variété Nafida en cours de sénescence - Cottenchy (80)
Photo : FREDON Hauts-de-France



Variété Allians. Prélèvement sur 3 pieds – Mouflières (80).
Photo : D. Boinet (Agriculteur)



Variété Manitou. Prélèvement sur 3 pieds – Mouflières (80).
Photo : D. Boinet (Agriculteur)

MILDIU :



Evolution du risque



Situation sur le terrain

La pression est en augmentation avec le retour des pluies et l'enregistrement de nouvelles contaminations depuis la fin de semaine dernière.

Pour le moment aucun cas de mildiou n'a été signalé.

Toutefois, soyez de nouveau vigilants et observez bien vos parcelles jusqu'au défanage complet de la végétation.

En cette fin de campagne, les pluies combinées à la présence de crevasses sur les buttes peut favoriser la descente des spores jusqu'aux tubercules.



Les couples « mildiou/fluazinam », « mildiou/mandipropamide et CAA », « mildiou/oxathiapiproline » et « mildiou/mefenoxam » sont exposés à un risque de résistance. Vous pouvez trouver toutes les informations sur les phénomènes de résistance sur le site R4p via le lien www.r4p-inra.fr/fr



Il existe des produits de biocontrôle autorisés sur le mildiou de la pomme de terre. Il s'agit de la substance active suivante : *phosphonate de potassium*. Retrouvez la liste actualisée des produits de biocontrôle sur le site : <https://ecophytopic.fr/reglementation/protger/liste-des-produits-de-biocontrole>

Interprétation du tableau des risques mildiou et seuils indicatifs de risque :

Pour que le seuil indicatif de risque soit atteint, il faut que les deux conditions suivantes soient réunies :

❶ Réserve de spores potentielle ayant atteint les niveaux suivants:

- **MOYENNE** pour les variétés sensibles,
- **ELEVEE** pour les variétés intermédiaires,
- **TRES ELEVEE** pour les variétés résistantes,



❷ conditions météorologiques (température et hygrométrie) favorables aux contaminations.

☒ Les dernières colonnes du tableau des risques vous indiquent en fonction de la sensibilité de vos variétés si le seuil indicatif de risque est atteint (OUI) ou pas (NON).

Précisions importantes :

-Les tableaux mildiou relatent une situation globale issue de l'interprétation de l'ensemble des variables de Miléos. Cette situation peut différer de l'analyse des risques issue de l'OAD Miléos à la parcelle.

-La colonne « réserve spore potentielle » tient compte de la réserve de spores et du potentiel de sporulation. Cela nous permet de prendre une « marge de sécurité » lors de situations où les conditions météo sont changeantes et les risques incertains, dans la mesure où seuls 1 à 2 BSV sont rédigés par semaine (un abonnement individuel à l'OAD Miléos® vous permet de disposer des risques actualisés plusieurs fois par jour et adaptés à votre parcelle).

-Attention, les risques donnés dans le tableau des risques sont valables pour des parcelles non irriguées. L'irrigation peut augmenter le risque en fonction des heures où elle est positionnée.

► Voir le BSV n° 7 pour connaître le classement des variétés selon leur sensibilité au mildiou.

Les conditions climatiques favorables aux contaminations:

La contamination est possible dès que l'hygrométrie est supérieure à 87%, associée à :



- une température de 21°C durant 8 heures consécutives.
- une température de 14°C durant 10 heures consécutives.
- une température de 10°C durant 13 heures consécutives.



DEPARTEMENTS PICARDS

Départements Picards -Tableau des risques mildiou établi à partir du modèle Mileos® le 25 août 2026 :

	Stations météorologiques	Dates de dépassement du seuil indicateur de risque durant les 7 derniers jours	Réserve de spores potentielle	Seuil indicatif de risque atteint du 25 au 27 août			Pluviométrie depuis le 18 août
				Variété sensible	Variété intermédiaire	Variété résistante	
Grand Amiénois / 3 Vallées	Vron	Aucune	Moyenne	OUI	NON	NON	61
	Boves	Aucune	Moyenne	NON	NON	NON	11
	Inval	Aucune	Elevée	OUI	NON	NON	53
	Thieulloy l'Abbaye	Aucune	Elevée	OUI	NON	NON	20
Chaunois / Soissonnais	Coucy la Ville	Aucune	Elevée	OUI	NON	NON	0
	Saint Christophe à Berry	Aucune	Moyenne	OUI	NON	NON	17
Grand Laonnois	Ebouleau	Aucune	Moyenne	NON	NON	NON	23
	Marchais	Aucune	Pas de données				
Santerre Hauts de Somme / Saint Quentinnois / Source et vallées	Attilly	Aucune	Elevée	NON	NON	NON	10
	Templeux le Guérard	Aucune	Moyenne	NON	NON	NON	15
	Curlu	Aucune	Elevée	NON	NON	NON	18
	Aizcourt le Haut	Aucune	Elevée	NON	NON	NON	33
Sud de l'Aisne	Verdilly	Aucune	Moyenne	OUI	NON	NON	8
Compiègnais / Grand Beauvaisis / Thelle Vixin sablons / Sud de l'Oise	Barbery	Aucune	Elevée	OUI	NON	NON	15
	Catenoy	Aucune	Elevée	OUI	NON	NON	14
	Rothois	Aucune	Moyenne	OUI	NON	NON	7
Thierache	Grougis (Forté)	Aucune	Elevée	NON	NON	NON	10
	Le Hérie la Vieville	Aucune	Moyenne	NON	NON	NON	14
Trait Vert	Attichy	Aucune	Moyenne	OUI	NON	NON	17
	Marcelcave	Aucune	Moyenne	OUI	NON	NON	11
	Vauvillers	Aucune	Elevée	OUI	NON	NON	10

Le tableau des risques mildiou est réalisé à partir de prévisions météorologiques à 48 heures. Si les conditions météorologiques constatées diffèrent des prévisions (pluies, brumes, brouillard...) il se peut que les risques évoluent.

Départements Picards - Situation au niveau de Mileos® et analyse des risques du 25 au 27 août :

SITUATION AU NIVEAU DE MILEOS®

Aucun déclenchement n'a été enregistré depuis le dernier BSV.

Des précipitations sont annoncées à partir de demain. Ces dernières, couplées à des températures plus douces et des hygrométries matinales élevées entraîneront une augmentation des potentiels de sporulations.

Les quantités de spores qui en découleront dans l'environnement seront sur certains postes suffisantes pour atteindre des risques de contamination en parcelle.

ANALYSE DES RISQUES

- Le seuil de risque devrait être atteint, demain, **sur variétés sensibles pour les postes** d'Attichy, Barbery, Catenoy, Coucy la Ville, Marcelcave, Rothois, St Christophe à Berry, Thieulloy l'Abbaye, Vauvillers et Verdilly.
- Le seuil de risque devrait être atteint, jeudi, **sur variétés sensibles pour les postes** d'Inval et Vron.

☒ Utiliser en priorité des moyens de lutte alternatifs aux traitements conventionnels, des méthodes biologiques ou des solutions de biocontrôle autorisées. En cas de nécessité d'intervention chimique de synthèse, privilégier les produits présentant le plus faible risque pour la santé et l'environnement.

- Le seuil indicatif de risque n'est pas atteint **pour tous les autres postes climatiques quelle que soit la variété**

☒ Sur la base des observations réalisées sur les seules parcelles du réseau d'épidémiosurveillance, l'évaluation du risque pour ce bioagresseur indique qu'aucune intervention n'est nécessaire à ce stade. Une observation directe de vos propres parcelles vous permettra de confirmer ou non cette évaluation du risque.

DEPARTEMENTS NORD et PAS DE CALAIS

Nord et Pas De Calais -Tableau des risques mildiou établi à partir du modèle Mileos® le 25 août 2026 :

	Stations météorologiques	Dates de dépassement du seuil indicateur de risque durant les 7 derniers jours	Réserve de spores potentielle	Seuil indicateur de risque atteint du 25 au 27 août			Pluviométrie depuis le 18 août
				Variété sensible	Variété intermédiaire	Variété résistante	
Scarpe / Hainaut / Cambrésis/Thiérache	Avesne les Aubert	Aucune	Elevée	NON	NON	NON	64
	Esnes	Aucune	Elevée	OUI	NON	NON	59
	Fressies	Aucune	Elevée	NON	NON	NON	53
	Ohain	Aucune	Faible	NON	NON	NON	28
	Thiant	Aucune	Elevée	NON	NON	NON	54
Artois / Ternois / Pays de Montreuil	Ambricourt	Aucune	Moyenne	OUI	NON	NON	52
	Aix Noulette	Aucune	Elevée	OUI	NON	NON	
	Berles au Bois	Aucune	Elevée	OUI	NON	NON	49
	Bonnières	Aucune	Elevée	OUI	NON	NON	39
	Boursies	Aucune	Elevée	OUI	NON	NON	72
	Croisette	Aucune	Elevée	OUI	NON	NON	34
	Ecuire						
	Gomiecourt	Le 22 août	Elevée	OUI	NON	NON	47
	Haucourt	Aucune	Moyenne	OUI	NON	NON	55
	Hermaville	Aucune	Elevée	OUI	NON	NON	33
	Izel-les-Equerchin	Le 22 août	Elevée	OUI	NON	NON	51
	Saint Pol sur Ternoise	Aucune	Moyenne	OUI	NON	NON	
	Ternas	Les 21 et 22 août	Très élevée	OUI	OUI	NON	29
	Tilloy Les Mofflaines	Aucune	Elevée	OUI	NON	NON	52
Bethunois / Plaine de la Lys / Pays d'Aire	Auchy les Mines	Aucune	Moyenne	OUI	NON	NON	26
	Calonne Sur La Lys	Aucune	Moyenne	OUI	NON	NON	
	Hesdigneul Les Béthune	Aucune	Elevée	OUI	NON	NON	16
	Lillers	Le 22 août	Moyenne	OUI	NON	NON	40
	Lorgies	Aucune	Elevée	OUI	NON	NON	31
	Mametz	Les 21 et 22 août	Elevée	OUI	NON	NON	57
Région de Lille / pévèle	Allesnes les Marais	Aucune	Moyenne	OUI	NON	NON	31
	Frelinghien	Aucune	Elevée	OUI	NON	NON	31
	Orchies	Aucune	Elevée	OUI	NON	NON	42
Flandres / Wateringues / Collines guinoises	Andres	Les 21 et 22 août	Elevée	OUI	OUI	NON	54
	Bailleul	Le 22 août	Elevée	OUI	NON	NON	43
	Caestre	Les 21 et 22 août	Elevée	OUI	NON	NON	24
	Hondschoote	Le 21 août	Elevée	OUI	NON	NON	27
	Merckeghem	Aucune	Faible	NON	NON	NON	84
	Pitgam	Les 21 et 22 août	Très élevée	OUI	NON	NON	
	Steenbecque	Les 21 et 22 août	Elevée	OUI	NON	NON	48
	Teteghem	Les 21 et 22 août	Elevée	OUI	NON	NON	15
	Vieille Eglise	Aucune	Elevée	OUI	NON	NON	
	Wormhout	Les 21, 22 et 24 août	Elevée	OUI	NON	NON	34
	Zuytpeene	Les 21 et 22 août	Elevée	OUI	NON	NON	44

Le tableau des risques mildiou est réalisé à partir de prévisions météorologiques à 48 heures. Si les conditions météorologiques constatées diffèrent des prévisions (pluies, brumes, brouillard...) il se peut que les risques évoluent.

Nord et Pas de Calais - Situation au niveau de Mileos® et analyse des risques du 25 au 27 août :

ANALYSE DES RISQUES

Comme indiqué dans le BSV Flash de vendredi dernier, la météo a été favorable au mildiou les 21 et 22 août (précipitations, hygrométrie élevée, températures douces). Des contaminations ont été enregistrées et le seuil indicatif de risque a été atteint sur les postes où la réserve de spore était suffisamment élevée, principalement dans les secteurs des Flandres (voir le détail poste par poste en 3ème colonne du tableau des risques mildiou).

Les précipitations enregistrées depuis mercredi dernier ont relancé les cycles du mildiou. Les réserves de spores, de nouveau alimentées, sont en augmentation sur la quasi-totalité des postes. Elles sont à un niveau Moyen à Très Elevé dans la plupart des cas.

☑ Pour rappel, il faut que la réserve de spores soit au minimum à un niveau « moyen » et que les conditions météorologiques soient favorables au mildiou pour que le seuil indicatif de risque soit atteint (voir explications détaillées en page 3).

A compter de demain, la météo annoncée est globalement favorable au mildiou (températures douces, quelques précipitations, hygrométrie nocturne et matinale élevée). Si ces prévisions se confirment, des déclenchement pourront avoir lieu sur la plupart des postes.

SITUATION AU NIVEAU DE MILEOS®

La plupart des parcelles sont en phase de sénescence plus ou moins avancée.

Les parcelles et l'environnement (tas de déchets non gérés, repousses, jardins de particuliers) sont sains.

- **Le seuil indicatif de risque devrait être atteint à compter de DEMAIN, pour les variétés sensibles uniquement, sur les poste de Aix Noulette, Berles au Bois, Bonnières, Croisette, Gomicourt, Hermaville, Saint Pol sur Ternoise, Tilloy Les Mofflaines, Auchy Les Mines, Calonne Sur La Lys, Hesdigneul Les Bethunes, Lillers, Lorgies, Mametz, Allesnes Les Marais, Orchies, Bail-leul, Pitgam, Wormhout.**
- **Le seuil indicatif de risque devrait être atteint à compter de DEMAIN, pour les variétés sensibles et intermédiaires, sur les poste de Ternas, Andres.**
- **Le seuil indicatif de risque devrait être atteint à compter de JEUDI, pour les variétés sensibles uniquement, sur les poste de Esnes, Ambricourt, Boursies, Haucourt, Izel Les Esquerchin, Frelinghien, Caestre, Hondschoote, Steenbecque, Teteghem, Vieille Eglise, Zuytpeene.**

☒ Utiliser en priorité des moyens de lutte alternatifs aux traitements conventionnels, des méthodes biologiques ou des solutions de biocontrôle autorisées. En cas de nécessité d'intervention chimique de synthèse, privilégier les produits présentant le plus faible risque pour la santé et l'environnement.

- **Le seuil indicatif de risque n'est pas atteint quelle que soit la sensibilité variétale pour les postes de Ohain et Merckeghem. Les parcelles peuvent rester sans protection.**

☒ Sur la base des observations réalisées sur les seules parcelles du réseau d'épidémiosurveillance, l'évaluation du risque pour ce bioagresseur indique qu'aucune intervention n'est nécessaire à ce stade. Une observation directe de vos propres parcelles vous permettra de confirmer ou non cette évaluation du risque.

LIMACES

RAPPEL SEUIL INDICATIF DE RISQUE :

4 limaces par m² (piégeage réalisé à l'aide de 4 pièges pour une surface totale de 1m²)



Evolution du risque



Limace piégée ce lundi au Nord de Lille.
Photo : C.Haccart—CA59/62

Le réseau de l'observatoire anti-limaces est un réseau de piégeage des limaces mis en place depuis plusieurs années en partenariat avec McCain, Pom'Alliance et la Chambre d'Agriculture du Nord Pas de Calais.

Le réseau de piégeage 2026 est composé de **24 parcelles présentant pour la plupart un risque limace avéré.**

Les relevés des pièges sont réalisés chaque lundi par les agriculteurs eux mêmes selon un protocole harmonisé.

- **Les précipitations significatives de ces derniers jours sont favorables à l'activité des limaces,**
- **Surveillez les parcelles à risques.**

LES ALTERNARIOSES :

Alternaria Alternata et Alternaria Solani



Evolution du risque



On distingue deux types d'alternaria : **Alternaria Alternata** qui est un saprophyte et un parasite de faiblesse et **Alternaria Solani** qui est le véritable pathogène (voir informations détaillées sur la maladie dans la fiche ci-contre).

Il faut savoir que de nombreuses études et expérimentations récentes ont montré que l'alternaria **se développe généralement en toute fin de cycle et, dans la majorité des cas, a peu (voire pas du tout) d'impact sur le rendement.**

Dans nos secteurs les variétés précoces et semi-précoces ne sont pas impactées par l'alternaria.

Concernant les variétés semi-tardives et tardives, il existe une sensibilité variétale à l'alternaria (voir document expérimentation variétale de la Chambre d'Agriculture du Nord pas de Calais ci-contre). **Il est inutile d'intervenir sur les variétés non sensibles.**

✕ Nous vous rappelons que l'alternaria est impossible à déterminer à l'œil nu.

✕ Nous parlons de symptômes supposés car l'alternaria peut être facilement confondus avec de nombreux autres symptômes : brulures d'ozone, stress, pourritures bactériennes, ruptures de plant mère, carences, problèmes de structure, viroses, verticilliose, autres maladies fongiques de fin de cycle,....

✕ Seule une analyse au laboratoire permet de poser un diagnostic fiable et de valider un diagnostic visuel réalisé au champ.

SITUATION DE LA SEMAINE :

Observations dans la plaine :

La sénescence a fortement progressé ces dernières semaines sous l'effet de la sécheresse et de la chaleur. Le retour de la pluie a stabilisé l'évolution de la végétation, néanmoins de nombreuses parcelles montrent une maturité avancée.

Des symptômes pouvant ressembler à de l'alternaria sont parfois remontés, sans avoir fait l'objet d'analyses. Il est actuellement très difficile de différencier les symptômes supposés d'alternaria dans la multitude de symptômes liés au stress abiotique, à la senescence naturelle et aux diverses maladies de fin de cycle.

Situation au niveau des modèles et analyse des risques :

Le retour d'un temps plus humide la nuit (humectation élevée) est favorable à l'alternaria.

► **Le seuil indicatif de risques est atteint régulièrement depuis la semaine dernière.**

Toutefois, les parcelles qui présentent encore une végétation suffisamment vertes pour envisager une intervention sont rares. Seules certaines parcelles irriguées ou implantées en variétés tardives pourraient encore prétendre à un passage contre l'alternaria.

► **Seules les variétés sensibles à l'alternaria, avec une sénescence inférieure à 15% et qui ne seront pas défanées à court terme dépassent le seuil indicatif de risque. Dans les autres cas, une intervention serait INUTILE.**



Station météo	Précocité variétale	
	Variété semi-tardive (type Fontane)	Variété tardive (type Markies)
Aix-Noulette (62)	Seuil indicatif de risque atteint	Seuil indicatif de risque atteint
Caëstre (59)	Seuil indicatif de risque atteint	Seuil indicatif de risque atteint
Villers-Saint-Christophe (02)	Seuil indicatif de risque atteint	Seuil indicatif de risque atteint

Les données ci-dessus sont issues d'un outil d'aide à la décision développé par Arvalis qui permet de définir à partir de quel moment une intervention contre l'alternaria peut s'avérer utile sur variétés sensibles.

Les calculs se font en deux étapes :

Etape 1 : Un premier modèle définit à partir de quel moment la plante a atteint le **seuil physiologique** de sensibilité à l'alternaria (les plantes deviennent sensibles à la maladie à partir d'un certain âge physiologique). Ce seuil est calculé en fonction de la date de levée et du cumul de température depuis la levée.

Etape 2 : Quand le seuil physiologique est atteint, un second **modèle épidémiologique** prend le relais. Il calcule le risque alternaria en fonction de la température et de l'hygrométrie. Lorsque la météo est suffisamment propice à la maladie, le seuil indicatif de risque est atteint et une protection peut être préconisée sur variétés sensible si l'avenir de la parcelle le nécessite (calibre visé non atteint, défanage pas prévu à court terme...).

TAUPINS

A ce jour, une seule observation en parcelle a été réalisée, sur le site de Cottenchy (80) qui a révélé la **présence de blaniules** (Cf. photo ci-contre).

Comment observer les larves de taupins en parcelle

L'observation de l'activité des larves se réalise, entre autres **au moment du défanage jusqu'au stockage.**

Ces observations reposent :

1- Observations à la récolte sur 25 tubercules

Réaliser des comptages sur 25 tubercules, issus de 5 pieds. Comptabilisés le nombre de morsures par tubercule et faites la moyenne sur les 25 tubercules.

2- Observations au triage - stockage sur 10 kg de pommes de terre

Il est courant de ne pas observer de morsures de taupin au moment de la récolte mais plutôt au conditionnement des pommes de terre.

Nous vous invitons à poursuivre vos notations tout au long du stockage.

L'appréciation se réalisera sur 10 kg de pommes de terre.

Aucun dégât observé au sein du réseau à ce jour

REALISER DES COMPTAGES



Blaniules - Cottenchy (80)
Photo : FREDON Hauts-de-France

Quelle que soit la nature de l'observation, l'appréciation des dégâts s'effectue comme suit :

- **Absence**
- **< à 1 morsure**
- **1 à 2 morsures**
- **3 à 5 morsures**
- **> à 5 morsures.**

CICADELLES

Les observations reposent sur 12 parcelles.

Dans le prolongement de leurs observations tout au long du cycle végétatif de la pomme de terre, les cicadelles vertes (*Empoasca*), continuent à être observées, avec une présence remarquée de faible à moyenne, selon les situations.

Les piqûres sur le feuillage sont également relevées.

Il n'existe pas de seuil indicatif de risque pour la cicadelle.



Cicadelle Empoasca stade adulte (Cottenchy (80))
Photo : FREDON Hauts-de-France



Larve cicadelle Empoasca avec présence de piqûres sur foliole (Cottenchy (80))
Photo : FREDON Hauts-de-France

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l'écologie, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018.

Rédactrice et animatrice filière pour le secteur Nord-Pas de Calais : Christine Haccart - Chambre d'Agriculture du Nord Pas de Calais (Tél : 06.74.35.36.52)

Animateurs filière pour le secteur Picardie : Valérie Pinchon - FREDON Hauts de France (Tél : 03.22.33.67.11) et Pierre-Baptiste Blanchant—Chambre d'Agriculture de la Somme (Tél : 03.22.95.51.20)

Expertise Miléos : Arvalis Institut du Végétal

Bulletin édité sur la base des observations réalisées par les partenaires du réseau : AG Conseil, Arvalis Institut du Végétal, AgroPomConseil, Campus agro environnemental 62, CERESIA, CETA des Hauts de Somme, Chambre d'Agriculture de la Somme, Chambre d'Agriculture du Nord Pas de Calais, Chambre d'Agriculture de l'Oise, Chambre d'Agriculture de l'Aisne, Comité Nord, Coopérative de Vecquemont, Desmazières SA, Expandis, FREDON Hauts-de-France, Le GAPPI, GC la Pomme de Terre, Intersnack, IPM France, Ets Jourdain, Mc Cain, Pom'Alliance, Réseau Vitalis, Sana Terra, Select'up, le SETAB, SRAL, Touquet Savour.

Ferme des Tilleuls, M Debarge, M Henno, M Ruysen, M Caby, M Lefranc, M Gosse de Gorre, M Cannesson, M Dequeker, M Dequidt, M Clay, M Boinet.

Coordination et renseignements : Samuel Bueche - Chambre d'Agriculture du Nord Pas de Calais (Tél: 03.21.60.57.60)

Aurèle Albaut - Chambre d'Agriculture de la Somme (Tél : 03 22 85 32 11).

