

N°25

Date de publication
23/09/2026

Date d'observation
22/09/2026

Grandes cultures

Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**



À retenir cette semaine



Colza :

A retenir cette semaine :

- ❖ **Stades** : les colzas du réseau vont de la levée au stade 9 feuilles. 46 % des parcelles sont entre 4 et 5 feuilles et 65 % ont atteint ou dépassé le stade 4 feuilles. Les levées restent hétérogènes dans certaines parcelles, notamment en raison du manque d'eau, avec des écarts de stade pouvant être importants au sein d'une même parcelle.
- ❖ **Grosses altises adultes** : les captures progressent nettement cette semaine, avec davantage de parcelles concernées et des niveaux très variables entre parcelles. La vigilance doit être renforcée sur les colzas encore au stade sensible, notamment ceux n'ayant pas atteint 4 feuilles.
- ❖ **Petites altises** : les captures restent faibles et stables dans le réseau. Maintenir une surveillance régulière des parcelles encore au stade sensible.
- ❖ **Punaises des céréales** : des dégâts sont toujours signalés sur jeunes colzas, principalement en bordure. À l'échelle de Rhône-Alpes, les dégâts recensés restent toutefois limités par rapport à ceux signalés dans le nord de la France. Les parcelles concernées peuvent être déclarées sur le lien suivant [Enquête sur les punaises s'attaquant au colza | Terres Inovia](#)
- ❖ **Charançon du bourgeon terminal** : les premières captures sont enregistrées dans le réseau, plus précocement qu'habituellement, mais les niveaux restent très faibles à ce stade. La surveillance des cuvettes doit être maintenue afin de suivre la dynamique du vol.
- ❖ **Taupins** : quelques signalements sur colza dans le Rhône. Ravageur rare sur colza, mais pouvant occasionner des pertes de pieds localement.
- ❖ **Noctuelles terricoles** : quelques signalements dans le réseau. Les chenilles peuvent sectionner les jeunes plantules au niveau du collet et entraîner des pertes de pieds localisées. En cas de pertes inexplicables, rechercher les larves dans les premiers centimètres du sol.



MÉTÉO

MERCREDI 23	JEUDI 24	VENDREDI 25	SAMEDI 26	DIMANCHE 27	LUNDI 28	MARDI 29
						
10° / 27°	12° / 27°	12° / 27°	13° / 28°	17° / 29°	18° / 26°	17° / 25°
► 10 km/h	▼ 15 km/h	▼ 10 km/h	▲ 15 km/h	▲ 20 km/h 45 km/h	▲ 15 km/h 50 km/h	▲ 20 km/h 45 km/h


Prévisions météo à 7 jours (Météo France, Pusignan, 22/09/2026 à 14h30. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))

RÉSEAU 2026-2027

Le réseau est en cours de mise en place.

Cette semaine, les **40 parcelles** du réseau ont été observées.

Parcelles BSV observées du 2026-09-15 au 2026-09-22




STADE DES COLZAS

Cette semaine :

- Les observations portent sur des parcelles allant de **la levée** (1 parcelle) **au stade 9 feuilles** (1 parcelle)
- Pratiquement la moitié des parcelles (**46 %**) se situe entre **les stades 4 feuilles et 5 feuilles**
- **Plus de la moitié (65 %)** des parcelles ont atteint ou dépassé le stade **4 feuilles**

Les levées restent hétérogènes, avec des écarts de stade importants au sein de certaines parcelles, allant des cotylédons à 4-5 feuilles. Certaines parcelles présentent des levées plus difficiles en raison du manque d'eau, ce qui peut ralentir le développement des jeunes colzas.



Répartition des parcelles observées selon le stade de développement du colza

RAVAGEURS

Ravageur	Risque
Petites altises (altises des crucifères)	● Modéré
Grosses altises (altises d'hiver)	● Modéré
Punaises des céréales	● Vigilance
Limaces	● Faible
Tenthrède de la rave	● Faible
Charançon du bourgeon terminal	● Faible
Noctuelles terricoles	● Faible
Taupins	● Faible

Altises d'hiver et Altises des crucifères

Reconnaissance :

	Reconnaissance	Période et seuil de risque
Altises d'hiver ou grosses altises ADULTES	Gros coléoptère de 3 à 5 mm de long au corps noir et brillant avec des reflets bleus métalliques sur le dos. Les extrémités des pattes, des antennes et de la tête sont roux dorés. Elle est reconnaissable aussi par des « grosses cuisses » qui lui permettent de sauter pour se déplacer dans la parcelle.  <i>Grosse altise adulte (Crédit : L. Jung, Terres Inovia)</i>	De la levée au stade 3 feuilles 80 % de plantes touchées ET 25 % de la surface foliaire détruite En cas de levée tardive (après le 1^{er} octobre) et/ou de faible vitesse de développement des colzas, le seuil de nuisibilité est abaissé à 3 plantes sur 10 avec morsures.

Altises des crucifères ou petites altises	Petit coléoptère noir ou bicolore (noir, avec 1 ou 2 bandes longitudinales jaunes sur chaque élytre). Il mesure 2 à 2,5 mm. <i>Petites altises (Crédit : L. Jung, Terres Inovia)</i>	De la levée au stade 3 feuilles 80 % de plantes touchées ET 25 % de la surface foliaire détruite En cas de levée tardive (après le 1^{er} octobre) et/ou de faible vitesse de développement des colzas, le seuil de nuisibilité est abaissé à 3 plantes sur 10 avec morsures.
--	---	--

Observations :

- Piégeage :

Grosses altises adultes ou altises d'hiver	Cette semaine	Semaine dernière
Parcelles observées	37	30
Parcelles avec des captures	18	6
Nombre d'individus capturés par cuvette en moyenne	10,6 (entre 1 et 105)	3,5 (entre 1 et 11)

Altises des crucifères ou petites altises	Cette semaine	Semaine dernière
Parcelles observées	28	28
Parcelles avec des captures	7	7
Nombre d'individus capturés par cuvette en moyenne	2 (entre 1 et 5)	2 (entre 1 et 4)

Les captures de **grosses altises** progressent nettement cette semaine, avec davantage de parcelles concernées et des niveaux de captures plus élevés, malgré une forte variabilité entre parcelles. Les captures de **petites altises** restent stables et faibles.

- Dégâts sur plante :

Plantes avec morsures d'altises	Cette semaine	Semaine dernière
Parcelles observées	22	27
Parcelles avec morsures en cœur de parcelle	13	14
% moyen de plantes touchées	24,9 % (1 à 80 %)	15,6 % (1 à 70 %)

Surfaces foliaires	Cette semaine	Semaine dernière
Parcelles observées	22	27
Parcelles avec des surfaces foliaires détruites	12	13
% moyen de surface foliaire détruite	3,5 % (1 à 10 %)	2,8 % (1 à 10 %)

Les morsures d'altises sont toujours présentes dans le réseau, avec une **augmentation de la proportion moyenne de plantes touchées** cette semaine. En revanche, la **surface foliaire détruite reste faible en moyenne**, malgré quelques parcelles atteignant des niveaux élevés de plantes touchées.




Moins de 25 % de la surface touchée



Plus de 25 % de la surface touchée

Parcelles observées du 2026-09-15 au 2026-09-22



Altises : % de plantes avec morsures : [0 - 0] [0 - 50] [50 - 80]

% de plantes avec morsures d'altises sur les parcelles observées

Analyse du risque :

Les captures de **grosses altises** sont en nette **progression** cette semaine, avec toutefois une **forte variabilité** entre parcelles. La période de vol étant désormais bien engagée, la **vigilance est à renforcer dans les prochains jours**.

Les petites altises restent peu présentes dans le réseau.

La majorité des colzas a dépassé le stade **4 feuilles**, mais 35 % des parcelles restent à un stade inférieur, dont certaines sont encore à la levée ou présentent des difficultés de développement liées au manque d'eau. **Ces parcelles sont les plus sensibles aux attaques d'altises**.

La vigilance doit se porter en priorité en bordure de parcelle.

- **Pour les colzas n'ayant pas atteint le stade 4 feuilles et présentant des dégâts, le risque est moyen.** Une surveillance régulière de l'évolution des morsures est recommandée.
- **Pour les parcelles ayant atteint le stade 4 feuilles et/ou ne présentant pas de dégâts, le risque est faible.** Une vigilance reste toutefois recommandée sur les bordures et les parcelles à proximité d'anciens colzas.

Pour les parcelles du réseau, le risque est **faible à modéré**.



Le couple « altise d'hiver (grosse altise) / pyréthrinoides » présente un risque de résistance.

Levier agronomique :

Dans les zones où des repousses de colza sont présentes, la destruction de celles-ci entraîne un déplacement des populations de petites altises vers les parcelles nouvellement semées. Il est donc recommandé de maintenir les repousses sur les parcelles à proximité des parcelles de colza.

Afin de ne pas déplacer les populations de petites altises, il est préférable d'attendre que les nouveaux colzas aient dépassé la période de risque (4-5 feuilles) avant de détruire les repousses.

Punaises des céréales

Présence signalée et dégâts potentiellement importants localement


Les années chaudes et sèches, ces petites punaises peuvent attaquer les jeunes colzas en cours de levée, sans solution de lutte identifiée à ce jour. Seul le retour des précipitations peut contribuer à limiter et disperser les populations présentes.

Symptômes : flétrissement rapide, dessèchement, disparition des pieds. Les foyers sont souvent localisés en bordure de parcelles.

Observations : des attaques de punaises sont régulièrement signalées, aussi bien au sein du réseau qu'en dehors. Les dégâts concernent principalement les bordures de parcelles, mais les populations peuvent localement progresser vers l'intérieur et occasionner des destructions sur des surfaces parfois très importantes.



Photo : colza flétri par les piqûres de punaises (Terres Inovia)



Cartographie des parcelles (points verts : 2026, point violet : 2023, points rouges : 2022) ayant déclaré la présence de punaises dans leur parcelle de colza en Auvergne-Rhône-Alpes. Carte mise à jour en temps réel [ici](#)

D'après les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête, peu de dégâts de punaises ont été signalés en Rhône-Alpes, en comparaison avec les niveaux observés dans le nord de la France.

Limaces

Le colza est particulièrement appétant pour les limaces. Le risque est accru sur sol motteux, avec résidus pailleux. Un suivi régulier (observations, pièges) est indispensable.

Observations :

Plantes avec dégâts de limace	Cette semaine	Semaine dernière
Parcelles observées	13	28
Parcelles avec dégâts de limace	3	6
% de la surface foliaire détruite	5,3 % (1 à 10 %)	7,3 % (1 à 30 %)

Les dégâts sont moins fréquemment observés cette semaine. La surface foliaire détruite moyenne est également en baisse.

Période de risque :

De la levée jusqu'au stade 3-4 feuilles du colza.

Les limaces peuvent s'attaquer aussi bien aux graines en germination dans le sol, aux hypocotyles ou aux cotylédons qu'aux jeunes feuilles.

Il n'y a pas de seuil de risque pour les limaces. Le niveau d'attaque est très variable pour un même nombre de limaces piégées, même lorsque ce nombre est faible.


Analyse du risque :

Les dégâts sont en baisse dans le réseau, les conditions sèches restent défavorables à l'activité des limaces. Le risque est actuellement **faible** et pourra rapidement augmenter en cas de pluie ou d'orage. La surveillance doit être maintenue sur les colzas encore au stade sensible.



Des solutions de biocontrôle à base de phosphate ferrique existent.

Reconnaissance :



Tenthrede à l'état adulte (gauche) et larvaire (droite) (crédit : Terres Inovia)

La tenthrede est un hyménoptère qui à l'état adulte mesure 7 à 8 mm, présente un corps jaune orangé, à tête noire et aux ailes membraneuses. La larve mesure 20 à 50 mm. Elle est translucide, grisâtre voire verdâtre. Elle prend un aspect noirâtre en fin de développement et devient nuisible pour la culture en dévorant les feuilles.

Période et seuil de risque :

- **Période de risque** : de la levée jusqu'à 6 feuilles.
- **Seuil indicatif de risque** : $\frac{1}{4}$ de la surface foliaire détruite.

Observations :

- Piégeage

Tenthrede de la rave	Cette semaine	Semaine dernière
Parcelles observées	9	3
Parcelles avec des captures	4	1
Nombre d'individus capturés par cuvette en moyenne	1,8 (1 à 2)	2

- **Dégâts sur plante**

Surfaces foliaires	Cette semaine	Semaine dernière
Parcelles observées	22	23
Parcelles avec présence de larves	3	1
% de plantes avec présence de larves	2 % (1 à 3 %)	2%

Surfaces foliaires	Cette semaine	Semaine dernière
Parcelles observées	4	2
Parcelles avec des surfaces foliaires détruites	0	0
% moyen de surface foliaire détruite	0	0

Analyse du risque :

Le risque reste actuellement **faible** à l'échelle du réseau. Des larves sont observées dans quelques parcelles, mais aucune destruction de surface foliaire n'est actuellement signalée. Une surveillance est recommandée.



Reconnaissance :

Le CBT adulte mesure de 2,5 à 3,7 mm. Corps brillant et noir avec une pilosité courte clairsemée. Taches latérales blanches entre le thorax et l'abdomen. Extrémités des pattes rousses.



Charançon du bourgeon terminal (Terres Inovia) Baris (Terres Inovia)

Attention à ne pas confondre le CBT avec le baris des crucifères. Le baris présente un rostre beaucoup plus recourbé et sa nuisibilité pour la culture n'est pas avérée.

Période de risque :

La période de risque débute avec l'arrivée des adultes dans les parcelles et se poursuit jusqu'au décollement du bourgeon terminal. **La cuvette jaune positionnée sur la végétation est indispensable pour suivre les vols.** Les vols peuvent s'étaler de fin septembre jusqu'à l'entrée de l'hiver.

Seuil indicatif de risque :

Il n'existe pas de seuil de risque pour ce ravageur. La détection des premiers adultes dans les cuvettes constitue un signal de vigilance, mais ne signifie pas nécessairement qu'une intervention est immédiatement nécessaire. En effet, les femelles deviennent aptes à pondre environ 10 à 15 jours après les premières captures. Les larves peuvent ensuite migrer des pétioles vers le cœur de la plante et provoquer des dégâts importants, notamment par destruction du bourgeon terminal. Le risque est d'autant plus important lorsque le développement végétatif automnal est faible.

Observations :

- Piégeage

Charançon du bourgeon terminal	Cette semaine	Semaine dernière
Parcelles observées	28	22
Parcelles avec des captures	1	2
Nombre d'individus capturés par cuvette en moyenne	1	1,5

- **Dégâts sur plante : Aucun dégât observé**

Analyse du risque : Les premières captures sont enregistrées dans le réseau depuis la semaine dernière. Le risque reste **faible** mais il conviendra de commencer la surveillance de ce ravageur dans les prochaines semaines.



Cette année, les premières captures sont observées plus précocement qu'habituellement. À ce stade, seules une à deux parcelles sont concernées et les niveaux de captures restent très faibles. Une arrivée précoce des adultes ne signifie pas nécessairement une ponte plus précoce. **Il convient donc de poursuivre le suivi des captures et de la dynamique du vol avant d'envisager une intervention, celle-ci devant être positionnée avant le début des pontes.**



le couple « Charançon du Bourgeon Terminal / pyréthrinoïdes » présente un risque de résistance.

Taupins

- Quelques signalements sur colza dans le Rhône ; ravageur rare sur colza, plus fréquent dans le Sud-Ouest.
- Larve jaune dite « fil de fer », à 3 paires de pattes, qui s'attaque à l'appareil racinaire et peut entraîner des pertes à la levée.
- Symptômes : les plantules s'étioilent, puis peuvent disparaître ; les racines présentent des lésions.
- Parcelles à risque : présence avérée ou antécédents d'attaques, notamment sur maïs voire tournesol ; précédents ou environnement favorables (prairie longue, culture fourragère ou légumineuse). Le risque est également à considérer dans les parcelles à sol basique et riche en matière organique, avec travail du sol réduit.
- Aucun moyen de lutte disponible.



Taupin (Terres Inovia)

Noctuelles terricoles (« vers gris »)

- Quelques signalements sur colza dans le réseau, avec **au moins 3 parcelles concernées et 3 à 5 % ou davantage de plantes touchées**. Ravageur peu fréquent sur colza, mais pouvant occasionner des dégâts localement importants.
- Les chenilles se trouvent dans **les premiers centimètres du sol** et peuvent ronger ou sectionner les jeunes plantules au niveau du collet, entraînant des pertes de pieds.
- En cas de pertes de pieds ou de symptômes inexplicables, il est donc intéressant de rechercher les chenilles dans les premiers centimètres du sol. **Attention à ne pas les confondre avec les taupins.**
- La lutte n'est à envisager que dans les situations **fortement infestées, lorsque la survie de la culture est en jeu.**



Noctuelles terricoles (Terres Inovia)

MISE EN ŒUVRE DES PIÈGES

Les pièges doivent être mis en place dès l'implantation des colzas.

Ils permettront d'appréhender l'arrivée des insectes en temps réel et de façon très locale pour avoir une lutte contre les ravageurs qui soit adaptée, efficace et raisonnée.

Les pièges sont essentiels pour pouvoir utiliser les seuils de nuisibilité et mesurer les risques sur les parcelles de colza.

Avant la levée de la culture puis en complément de l'observation des plantes, les pièges nous informent sur l'arrivée des ravageurs et leur activité.

Pièges à limaces

La pose des pièges doit être réalisée avant la levée de la culture. L'observation des limaces grises et noires se fait à l'aide de 4 pièges de 25x25 cm préalablement humidifiés par trempage, éloignés d'au moins 5 m les uns des autres.

Pour fixer les limaces et faciliter le comptage, il est possible d'ajouter quelques granulés anti-limaces sous le piège.

Attention, il est vivement déconseillé d'arroser le sol lors de la pose du piège, afin de bien voir la situation du risque telle qu'elle est.

Cette observation nécessite une attention particulière. En effet, le relevé des pièges doit s'effectuer en début de matinée en conditions fraîches et humides et en « grattant » la terre sous les pièges car les limaces sont généralement abritées entre les mottes dans les premiers centimètres du sol.



Piège à limaces (D. Simmoneau)

Cuvettes jaunes

Elles se placent au niveau de la végétation sauf pour les grosses altises (altises d'hiver) où la cuvette doit être enterrée.

Pour capturer l'altise d'hiver ou grosse altise, la cuvette doit être enterrée, bord supérieur à 1-2 cm au-dessus du sol.

La plupart des insectes sont attirés par la couleur jaune. L'altise d'hiver fait exception. En effet, il s'agit d'un insecte qui se déplace par des sauts. L'objectif est donc de capturer l'insecte lorsqu'il se déplace en enterrant la cuvette dans le sol (piège d'interception). Les altises doivent pouvoir tomber dans le piège au fil de leur avancée dans la parcelle.



Schéma de la disposition de la cuvette jaune pour capturer l'altise d'hiver (illustration : Terres Inovia)



L. Jung, Terres Inovia

Pour les autres insectes, la cuvette doit être toujours comme "posée" sur la végétation.




Schéma de la disposition de la cuvette jaune végétation (illustration Terres Inovia)

Quelques conseils d'usage pour que les pièges soient attractifs :

- Positionner le piège dans le champ en tenant compte des vents dominants et de la proximité d'une ancienne parcelle de colza.

- Remplir la cuvette avec 1 litre d'eau et quelques gouttes de mouillant de type liquide vaisselle (pas trop). Prévoir un bidon plein de ce mélange qui reste dans la parcelle pour faire le niveau de la cuvette.
- Eviter les piétinements qui modifient le contexte de végétation. Si nécessaire, déplacer la cuvette.
- Nettoyer la cuvette jaune pour qu'elle reste attractive. Si la couleur jaune est « passée », changer la cuvette.

Relever le(les) cuvette(s) toutes les semaines : filtrer les insectes et éventuellement les laisser sécher pour faciliter leur reconnaissance, remplacer l'eau régulièrement, repositionner la cuvette en fonction de la hauteur de la végétation

- **Protection des pollinisateurs : REGLEMENTATION**
Plus d'informations [ICI](#)



[LIEN NOTE NATIONALE AMBROISIE](#)

[LIEN NOTE DATURA](#)

[LIEN FICHE POPILLIA JAPONICA](#)

Pour en savoir plus, EcophytoPIC, le portail de la protection intégrée :

<http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/grandes-cultures>

Publication hebdomadaire. Toute reproduction même partielle est soumise à autorisation

Directeur de publication Michel JOUX, Président de la Chambre Régionale d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes

Coordonnées du référent : Perrine VAURE (CRA AURA perrine.vaure@aura.chambagri.fr, 06 76 24 46 48)

À partir d'observations réalisées par : des coopératives et négoces agricoles, des instituts techniques, des Chambres d'Agriculture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, des lycées agricoles et avec la participation des agriculteurs.

Ce BSV est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transmise telle quelle à la parcelle. Pour chaque situation phytosanitaire, les producteurs de végétaux, conseillers agricoles, gestionnaires d'espaces verts ou tous autres lecteurs doivent aller observer les parcelles ou zones concernées, avant une éventuelle intervention. La Chambre régionale dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs concernant la protection de leurs cultures.



Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**



GOVERNEMENT

*Liberté
Égalité
Fraternité*