

N°26

Date de publication
30/09/2026

Date d'observation
29/09/2026

Grandes cultures

Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**



À retenir cette semaine



Colza :

A retenir cette semaine :

- ❖ Stades : les colzas du réseau vont de 1 à plus de 10 feuilles. 67 % des parcelles ont atteint ou dépassé le stade 4 feuilles, tandis que près d'un quart sont encore entre 1 et 3 feuilles. Les conditions très sèches de ces dernières semaines ont entraîné des levées et des développements hétérogènes, avec parfois des écarts de stade importants au sein d'une même parcelle. Les précipitations annoncées cette semaine pourraient être favorables à la poursuite de la croissance des colzas.
- ❖ Grosses altises adultes : les captures poursuivent leur progression, avec 22 parcelles sur 34 présentant des captures et une moyenne de 13,4 individus par cuvette. Les dégâts progressent également, mais la surface foliaire détruite reste faible en moyenne (3,8 %). La vigilance doit surtout être maintenue sur les colzas encore à moins de 4 feuilles.
- ❖ Petites altises : les captures restent faibles dans le réseau. Maintenir une surveillance régulière des parcelles encore au stade sensible.
- ❖ Charançon du bourgeon terminal : les premières captures sont désormais enregistrées dans 5 parcelles du réseau (dans l'Ain). Elles sont précoces cette année, mais restent faibles à ce stade. Une capture isolée ne suffit pas à caractériser le risque : celui-ci doit être raisonné à la parcelle, en fonction de la dynamique du vol, de la pression historique et de l'état du colza.
- ❖ Punaies des céréales : à l'échelle de Rhône-Alpes, les dégâts recensés sont limités par rapport à ceux signalés dans le nord de la France. Les parcelles concernées peuvent être déclarées sur le lien suivant >> [Enquête sur les punaises s'attaquant au colza | Terres Inovia](#)



MÉTÉO

MERCREDI 30	JEUDI 01	VENDREDI 02	SAMEDI 03	DIMANCHE 04	LUNDI 05	MARDI 06
						
18° / 24°	17° / 21°	14° / 22°	13° / 24°	15° / 23°	14° / 21°	13° / 21°
⬇ 25 km/h 45 km/h	➤ 10 km/h	⬇ 5 km/h	➤ 10 km/h	⬆ 10 km/h	⬇ 10 km/h	⬆ 5 km/h


Prévisions météo à 7 jours (Météo France, Pusignan, 29/09/2026 à 14h30. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))

RÉSEAU 2026-2027

Le réseau est en cours de mise en place.

Cette semaine, les **36 parcelles** du réseau ont été observées.

Parcelles BSV observées du 2026-09-22 au 2026-09-29




Parcelles du réseau BSV Rhône-Alpes observées le 28/09/2026 et le 29/09/2026

STADE DES COLZAS

Cette semaine :

- Les observations portent sur des parcelles allant du stade **1 feuille (B1)**, avec deux parcelles à ce premier stade, **au stade >10 feuilles**, avec une parcelle à ce dernier stade.
- **Le stade 5 feuilles est le plus représenté** (31 % des parcelles), suivi du stade 2 et 6 feuilles (17 % chacun).
- **67 % des parcelles ont atteint ou dépassé le stade 4 feuilles**, contre 65 % la semaine dernière.
- Les parcelles aux stades les plus précoces restent toutefois présentes, avec pratiquement **un quart** (23 %) **des parcelles à 1-3 feuilles**.

Les levées restent hétérogènes selon les parcelles, avec des écarts de développement encore importants (parfois du stade cotylédons au stade 5-6 feuilles). La progression des stades témoigne toutefois d'une poursuite du développement des colzas, malgré des conditions d'implantation et de croissance parfois difficiles liées au manque d'eau. Un passage pluvieux est annoncé pour cette semaine. Une parcelle du réseau, non levée, a été signalée et sera détruite.



Répartition des parcelles observées selon le stade de développement du colza

RAVAGEURS

Ravageur	Risque
Petites altises (altises des crucifères)	 Modéré
Grosses altises (altises d'hiver)	 Modéré
Punaises des céréales	 Modéré
Charançon du bourgeon terminal	 Faible
Limaces	 Faible
Tenthrède de la rave	 Faible

Reconnaissance :

	Reconnaissance	Période et seuil de risque
Altises d'hiver ou grosses altises ADULTES	Gros coléoptère de 3 à 5 mm de long au corps noir et brillant avec des reflets bleus métalliques sur le dos. Les extrémités des pattes, des antennes et de la tête sont roux dorés. Elle est reconnaissable aussi par des « grosses cuisses » qui lui permettent de sauter pour se déplacer dans la parcelle.  <i>Grosse altise adulte (Crédit : L. Jung, Terres Inovia)</i>	De la levée au stade 3 feuilles 80 % de plantes touchées ET 25 % de la surface foliaire détruite En cas de levée tardive (après le 1^{er} octobre) et/ou de faible vitesse de développement des colzas, le seuil de nuisibilité est abaissé à 3 plantes sur 10 avec morsures.
Altises des crucifères ou petites altises	Petit coléoptère noir ou bicolore (noir, avec 1 ou 2 bandes longitudinales jaunes sur chaque élytre). Il mesure 2 à 2,5 mm.  <i>Petites altises (Crédit : L. Jung, Terres Inovia)</i>	De la levée au stade 3 feuilles 80 % de plantes touchées ET 25 % de la surface foliaire détruite En cas de levée tardive (après le 1^{er} octobre) et/ou de faible vitesse de développement des colzas, le seuil de nuisibilité est abaissé à 3 plantes sur 10 avec morsures.

Observations :

- Piégeage :

Grosses altises adultes ou altises d'hiver	Cette semaine	Semaine dernière
Parcelles observées	34	37
Parcelles avec des captures	22	18
Nombre d'individus capturés par cuvette en moyenne	13,4 (entre 1 et 80)	10,6 (entre 1 et 105)

Altises des crucifères ou petites altises	Cette semaine	Semaine dernière
Parcelles observées	24	28
Parcelles avec des captures	6	7
Nombre d'individus capturés par cuvette en moyenne	4,2 (entre 2 et 10)	2 (entre 1 et 5)

Les captures de **grosses altises poursuivent leur progression cette semaine**, avec une hausse du nombre moyen d'individus capturés par cuvette (13,4 contre 10,6 la semaine dernière) et 22 parcelles avec captures contre 18. Les niveaux restent toutefois très variables selon les parcelles, avec des captures allant de 1 à 80 individus par cuvette.

Les captures de petites altises restent limitées, avec 6 parcelles concernées sur 24 observées et une moyenne de 4,2 individus par cuvette, en légère hausse par rapport à la semaine dernière.

- Dégâts sur plante :

Plantes avec morsures d'altises	Cette semaine	Semaine dernière
Parcelles observées	23	22
Parcelles avec morsures en cœur de parcelle	13	13
% moyen de plantes touchées	38,1 % (1 à 90 %)	24,9 % (1 à 80 %)

Surfaces foliaires	Cette semaine	Semaine dernière
Parcelles observées	22	22
Parcelles avec des surfaces foliaires détruites	12	12
% moyen de surface foliaire détruite	3,8 % (1 à 10 %)	3,5 % (1 à 10 %)

La proportion moyenne de plantes touchées augmente cette semaine, passant de 24,9 % à 38,1 %, avec 4 parcelles présentant plus de 80 % de plantes touchées. Le nombre de parcelles concernées reste toutefois stable. La surface foliaire détruite demeure faible et comparable à la semaine dernière, avec 3,8 % en moyenne.




Moins de 25 % de la surface touchée



Plus de 25 % de la surface touchée

Parcelles observées du 2026-09-22 au 2026-09-29



Altises : % de plantes avec morsures : ● [0 - 0] ●] 0 - 50] ●] 50 - 80] ●] 80 - 90]

% de plantes avec morsures d'altises sur les parcelles observées

Analyse du risque :

Les captures de **grosses altises** sont encore en **progression** cette semaine, avec une **forte variabilité** entre parcelles. La période de vol est désormais bien engagée : la **vigilance reste de mise notamment dans les parcelles les moins développées**.

Les petites altises restent peu présentes dans le réseau.

Il est important de noter que 67 % des parcelles du réseau ont dépassé le stade **4 feuilles** et sont donc **sorties de la période de sensibilité**. **Seules 23 % des parcelles sont encore à un stade inférieur à 4 feuilles** et sont donc les plus sensibles aux attaques d'altises. Une surveillance particulière est à maintenir dans ces parcelles.

La vigilance doit se porter en priorité en bordure de parcelle.

- **Pour les colzas n'ayant pas atteint le stade 4 feuilles et présentant des dégâts, le risque est moyen.** Une surveillance régulière de l'évolution des morsures est recommandée.
- **Pour les parcelles ayant atteint le stade 4 feuilles et/ou ne présentant pas de dégâts, le risque est faible.** Une vigilance reste toutefois recommandée sur les bordures et les parcelles à proximité d'anciens colzas.

Pour les parcelles du réseau, le risque est **faible à modéré**.



Le couple « altise d'hiver (grosse altise) / pyréthrinoïdes » présente un risque de résistance. [Pour plus d'informations, consulter le site R4P.](#)

Levier agronomique :

Dans les zones où des repousses de colza sont présentes, la destruction de celles-ci entraîne un déplacement des populations de petites altises vers les parcelles nouvellement semées. Il est donc recommandé de maintenir les repousses sur les parcelles à proximité des parcelles de colza.

Afin de ne pas déplacer les populations de petites altises, il est préférable d'attendre que les nouveaux colzas aient dépassé la période de risque (4-5 feuilles) avant de détruire les repousses.

Charançon du bourgeon terminal (CBT)

Reconnaissance :

Le CBT adulte mesure de 2,5 à 3,7 mm. Corps brillant et noir avec une pilosité courte clairsemée. Taches latérales blanches entre le thorax et l'abdomen. Extrémités des pattes rouges.



Charançon du bourgeon terminal
(Terres Inovia)

Baris (Terres Inovia)

Attention à ne pas confondre le CBT avec le baris des crucifères. Le baris présente un rostre beaucoup plus recourbé et sa nuisibilité pour la culture n'est pas avérée.

Les adultes ne sont pas nuisibles, mais ils pondent dans les pétioles à l'automne. La nuisibilité est due aux larves qui détruisent le bourgeon terminal lorsqu'elles passent dans le cœur des plantes au stade rosette. Au printemps, les plantes ont alors un aspect buissonnant. La lutte contre les larves n'est pas possible avec les insecticides disponibles. La lutte vise donc les adultes avant qu'ils ne pondent.

Période de risque :

La période de risque débute avec l'arrivée des adultes dans les parcelles et se poursuit jusqu'au décollement du bourgeon terminal. **La cuvette jaune positionnée sur la végétation est indispensable pour suivre les vols.** Les vols peuvent s'étaler de fin septembre jusqu'à l'entrée de l'hiver.

Seuil indicatif de risque :

Il n'existe pas de seuil de risque pour ce ravageur. La détection des premiers adultes dans les cuvettes constitue un signal de vigilance, **mais ne signifie pas nécessairement qu'une intervention est immédiatement nécessaire.** Les femelles deviennent généralement aptes à pondre 10 à 15 jours après les premières captures, avec une durée pouvant être plus longue pour les individus arrivants précocement. Les larves migrent ensuite des pétioles vers le cœur de la plante, où elles peuvent provoquer des dégâts importants, notamment par destruction du bourgeon terminal.


Observations :

- Piégeage

Charançon du bourgeon terminal	Cette semaine	Semaine dernière
Parcelles observées	31	28
Parcelles avec des captures	5	1
Nombre d'individus capturés par cuvette en moyenne	1,6 (1 à 2)	1

- Dégâts sur plante : Aucun dégât observé

Parcelles BSV observées du 2026-09-22 au 2026-09-29



Piège : Nb de charançons du bourgeon terminal : ● [0 - 0] ● [0 - 2]

Nombre de charançons du bourgeon terminal piégés sur les parcelles observées

Les premières captures du CBT sont enregistrées dans 5 parcelles du réseau, toutes situées dans l'Ain, avec 1 à 2 individus capturés par cuvette. Aucun dégât n'est observé à ce stade.

Analyse du risque :

Les premières captures du CBT sont observées plus précocement que les années précédentes, mais restent pour l'instant limitées à 5 parcelles, avec des niveaux de captures très faibles. Une capture précoce ne signifie pas nécessairement une intervention immédiate : une intervention trop précoce pourrait ne pas couvrir les arrivées suivantes et conduire à multiplier les traitements.

Le risque doit être raisonné à la parcelle, en prenant en compte trois éléments : la dynamique du vol, la pression historique du ravageur dans le secteur et l'état du colza, notamment son développement, sa biomasse et sa capacité à poursuivre sa croissance à l'automne. La nuisibilité est plus importante lorsque le développement automnal du colza est faible.

À ce stade, **le risque est faible à l'échelle du réseau**, mais la surveillance des cuvettes doit être maintenue et le risque réévalué en fonction de l'évolution du vol et de la croissance des colzas. Une éventuelle intervention doit être positionnée avant le début des pontes, et non à partir d'une capture isolée.




Le couple « charançon du bourgeon terminal / pyrèthrinoïdes » présente un risque de résistance. [Pour plus d'informations, consulter le site R4P.](#)

Les cuvettes jaunes doivent être « posées » sur la végétation et il faut les relever souvent. Une cuvette enterrée ne convient pas pour suivre ce ravageur.

Un outil de prévision des vols

L'outil de prédiction des vols de CBT permet de suivre les probabilités de capture à l'échelle de chaque commune :



Prédiction des vols de charançon du bourgeon terminal à Pusignan (69) le 29/09/2026.

<https://www.terresinovia.fr/fr/oat/prediction-des-vols-de-ravageurs>

BSV n°26 Grandes Cultures, région Auvergne-Rhône-Alpes, édition du territoire Rhônalpin

Limaces

Le colza est particulièrement appétant pour les limaces. Le risque est accru sur sol motteux, avec résidus pailleux. Un suivi régulier (observations, pièges) est indispensable.

Observations :

Plantes avec dégâts de limace	Cette semaine	Semaine dernière
Parcelles observées	12	13
Parcelles avec dégâts de limace	1	3
% de la surface foliaire détruite	3 %	5,3 % (1 à 10 %)

Les dégâts sont moins fréquemment observés cette semaine. Une seule parcelle présente des dégâts, avec 3 % de surface foliaire détruite.

Période de risque :

De la levée jusqu'au stade 3-4 feuilles du colza.

Les limaces peuvent s'attaquer aussi bien aux graines en germination dans le sol, aux hypocotyles ou aux cotylédons qu'aux jeunes feuilles.

Il n'y a pas de seuil de risque pour les limaces. Le niveau d'attaque est très variable pour un même nombre de limaces piégées, même lorsque ce nombre est faible.

Analyse du risque :

Les dégâts sont en baisse dans le réseau, les conditions sèches restent défavorables à l'activité des limaces. Le risque est actuellement **faible** et pourra rapidement augmenter en cas de pluie ou d'orage. La surveillance doit être maintenue sur les colzas encore au stade sensible (< 4 feuilles).



Des solutions de biocontrôle à base de phosphate ferrique existent.

Reconnaissance :



Tenthrede à l'état adulte (gauche) et larvaire (droite) (crédit : Terres Inovia)

La tenthrede est un hyménoptère qui à l'état adulte mesure 7 à 8 mm, présente un corps jaune orangé, à tête noire et aux ailes membraneuses. La larve mesure 20 à 50 mm. Elle est translucide, grisâtre voire verdâtre. Elle prend un aspect noirâtre en fin de développement et devient nuisible pour la culture en dévorant les feuilles.

Période et seuil de risque :

- **Période de risque** : de la levée jusqu'à 6 feuilles.
- **Seuil indicatif de risque** : ¼ de la surface foliaire détruite.

Observations :

- Piégeage

Tenthrede de la rave	Cette semaine	Semaine dernière
Parcelles observées	11	9
Parcelles avec des captures	3	4
Nombre d'individus capturés par cuvette en moyenne	1,7 (1 à 2)	1,8 (1 à 2)

- Dégâts sur plante

Présence de larves	Cette semaine	Semaine dernière
Parcelles observées	21	22
Parcelles avec présence de larves	3	3
% de plantes avec présence de larves	5 %	2 % (1 à 3 %)

Surfaces foliaires	Cette semaine	Semaine dernière
Parcelles observées	7	4
Parcelles avec des surfaces foliaires détruites	0	0
% moyen de surface foliaire détruite	0	0

La présence de larves de tenthrède de la rave reste limitée à quelques parcelles. Malgré une légère hausse de la proportion de plantes concernées, aucun dégât foliaire n'est observé à ce stade.

Analyse du risque :

Le risque reste actuellement **faible** à l'échelle du réseau. Des larves sont observées dans quelques parcelles, mais aucune destruction de surface foliaire n'est actuellement signalée. La surveillance reste recommandée.



MISE EN ŒUVRE DES PIÈGES

Les pièges doivent être mis en place dès l'implantation des colzas.

Ils permettront d'appréhender l'arrivée des insectes en temps réel et de façon très locale pour avoir une lutte contre les ravageurs qui soit adaptée, efficace et raisonnée.

Les pièges sont essentiels pour pouvoir utiliser les seuils de nuisibilité et mesurer les risques sur les parcelles de colza.

Avant la levée de la culture puis en complément de l'observation des plantes, les pièges nous informent sur l'arrivée des ravageurs et leur activité.

Pièges à limaces

La pose des pièges doit être réalisée avant la levée de la culture. L'observation des limaces grises et noires se fait à l'aide de 4 pièges de 25x25 cm préalablement humidifiés par trempage, éloignés d'au moins 5 m les uns des autres.

Pour fixer les limaces et faciliter le comptage, il est possible d'ajouter quelques granulés anti-limaces sous le piège.

Attention, il est vivement déconseillé d'arroser le sol lors de la pose du piège, afin de bien voir la situation du risque telle qu'elle est.

Cette observation nécessite une attention particulière. En effet, le relevé des pièges doit s'effectuer en début de matinée en conditions fraîches et humides et en « grattant » la terre sous les pièges car les limaces sont généralement abritées entre les mottes dans les premiers centimètres du sol.



Piège à limaces (D. Simmoneau)

Cuvettes jaunes

Elles se placent au niveau de la végétation sauf pour les grosses altises (altises d'hiver) où la cuvette doit être enterrée.

Pour capturer l'altise d'hiver ou grosse altise, la cuvette doit être enterrée, bord supérieur à 1-2 cm au-dessus du sol.

La plupart des insectes sont attirés par la couleur jaune. L'altise d'hiver fait exception. En effet, il s'agit d'un insecte qui se déplace par des sauts. L'objectif est donc de capturer l'insecte lorsqu'il se déplace en enterrant la cuvette dans le sol (piège d'interception). Les altises doivent pouvoir tomber dans le piège au fil de leur avancée dans la parcelle.

Schéma de la disposition de la cuvette jaune pour capturer l'altise d'hiver (illustration : Terres Inovia)



L. Jung, Terres Inovia

Pour les autres insectes, la cuvette doit être toujours comme "posée" sur la végétation.




Schéma de la disposition de la cuvette jaune végétation (illustration Terres Inovia)

Quelques conseils d'usage pour que les pièges soient attractifs :

- Positionner le piège dans le champ en tenant compte des vents dominants et de la proximité d'une ancienne parcelle de colza.
- Remplir la cuvette avec 1 litre d'eau et quelques gouttes de mouillant de type liquide vaisselle (pas trop). Prévoir un bidon plein de ce mélange qui reste dans la parcelle pour faire le niveau de la cuvette.
- Eviter les piétinements qui modifient le contexte de végétation. Si nécessaire, déplacer la cuvette.
- Nettoyer la cuvette jaune pour qu'elle reste attractive. Si la couleur jaune est « passée », changer la cuvette.
- Relever le(les) cuvette(s) toutes les semaines : filtrer les insectes et éventuellement les laisser sécher pour faciliter leur reconnaissance, remplacer l'eau régulièrement, repositionner la cuvette en fonction de la hauteur de la végétation.

- **Protection des pollinisateurs : REGLEMENTATION**
Plus d'informations [ICI](#)



[LIEN NOTE NATIONALE AMBROISIE](#)

[LIEN NOTE DATURA](#)

[LIEN FICHE POPILLIA JAPONICA](#)

Pour en savoir plus, EcophytoPIC, le portail de la protection intégrée :

<http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/grandes-cultures>

Publication hebdomadaire. Toute reproduction même partielle est soumise à autorisation

Directeur de publication Michel JOUX, Président de la Chambre Régionale d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes

Coordonnées du référent : Perrine VAURE (CRA AURA perrine.vaure@aura.chambagri.fr, 06 76 24 46 48)

À partir d'observations réalisées par : des coopératives et négoces agricoles, des instituts techniques, des Chambres d'Agriculture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, des lycées agricoles et avec la participation des agriculteurs.

Ce BSV est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transmise telle quelle à la parcelle. Pour chaque situation phytosanitaire, les producteurs de végétaux, conseillers agricoles, gestionnaires d'espaces verts ou tous autres lecteurs doivent aller observer les parcelles ou zones concernées, avant une éventuelle intervention. La Chambre régionale dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs concernant la protection de leurs cultures.



Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**



GOUVERNEMENT

*Liberté
Égalité
Fraternité*