



A RETENIR (CTRL – CLIC POUR SUIVRE LE LIEN) :

Betterave : progression de la cercosporiose. Rouille et oïdium absents. Présence de teigne importante. Présence de rhizopus parfois importante.

Maïs : toutes les parcelles ont atteint le stade grains durs. Continuité du vol de pyrale.

METEO

STATION DE LIEUSAIN (77)

	mar. 1	mer. 2	jeu. 3	ven. 4	sam. 5	dim. 6	lun. 7
	0	0	0	0	0	0	0
	39 / 83	40 / 75	42 / 78	35 / 93	37 / 93	28 / 72	40 / 77
	15 / 25	14 / 25	15 / 28	17 / 31	17 / 27	16 / 30	18 / 29


Source : Sencrop - Modèle : METEOBLUE

BETTERAVE

22 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES

Pratiquement 50 % des parcelles n'ont pas plus de 60 % de taux de couverture dont 3 parcelles sont à 30 % de couverture.



Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Région Île de France sur la base d'observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, il ne peut se substituer à une observation personnelle dans sa parcelle.

Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.

Pour vous abonner faites votre demande à ecophyto@idf.chambagri.fr en spécifiant la filière.

RAVAGEURS

• Jaunisse

Sur les 3 parcelles dont des informations sur la jaunisse sont renseignées, une seule présente des symptômes de jaunisse à hauteur de 0,5 % de la surface parcellaire.

La sécheresse actuelle rend difficile l'observation des symptômes de jaunisse.


• Teignes



Sur 5 pièges relevés cette semaine, tous remontent la présence de papillons avec 37 papillons piégés en moyenne. Il y a de grandes différences de captures, avec seulement 13 papillons capturés à d'Huison-Longueville (91) contre 57 à Noisy-Rudignon (77).

Le deuxième vol ne faiblit pas.

Parmi les 15 parcelles renseignées, 13 parcelles (87 %) présentent des dégâts frais. Les parcelles touchées sont toutes au-dessus du seuil de risque, allant de 10 % à 72 % de plantes touchées.



Présence de rhizopus dans 100 % des parcelles renseignées pour cette maladie (9 parcelles), allant de 5 % de la surface parcellaire touchée à 48 % à Larchant (77).

A RETENIR

Risque : fort.

Stade de sensibilité : à partir de la couverture.

Seuil indicatif de risque : en présence de stress hydrique, 10 % de plantes touchées avec présence de dégâts frais ou chenilles.

• Pégomyes



Sur 10 parcelles renseignées, aucune n'indique de dégâts.


A RETENIR

Risque : faible.

Stade de sensibilité : toute la période de végétation.

Seuil indicatif de risque : avant couverture du sol : 10 % de plantes avec au moins 1 galerie.
après couverture du sol : 50 % de plantes avec au moins 1 galerie ou présence d'asticots.

• Noctuelles



5

parcelles sur 10 observées pour ce ravageur remontent la présence de dégâts de noctuelles, allant de 5 % à 36 % de betteraves touchées.

A RETENIR

Risque : faible en culture irriguée.
moyen en culture sèche.

Stade de sensibilité : de 6 feuilles à la récolte.

Seuil indicatif de risque : 50 % de plantes avec traces de morsures ou déjections récentes.

• Charançon lixus



9 parcelles sur 12 observées remontent la présence de piqures de pontes avec de 15 % à 100 % de betteraves touchées à Joigny (89).

Sur 6 parcelles observées pour la présence de galeries, toutes sont impactées allant de 8 % à 100 % de betteraves touchées pour la parcelle de Joigny (89) avec en moyenne 1,5 galerie par plante.


MALADIES DU FEUILLAGE

17 parcelles renseignées.

• Cercosporiose



Une carte interactive sur le site de l'ITB permet de consulter le statut des parcelles par seuil de traitement <https://alerte.itbfr.org/maladies/>.



47 % des parcelles renseignées ne présentent pas de cercosporiose.

8 parcelles sont encore sous le seuil du T1 (seuil après le 15 août).

1 parcelle dépasse le seuil du T1 (après le 15 août) avec 26 % de plantes touchées à Joigny (89).

7 parcelles sont sous le seuil du T2.

1 parcelle dépasse le seuil du T2 à Labbeville (95).

Avec des conditions météorologiques plus favorables à la maladie, la cercosporiose progresse.

Une protection est rarement justifiée à 45 jours de la récolte.

• Rouille et oïdium



1 seule parcelle remonte la présence de rouille à hauteur de 1 % de plante touchée.

Absence d'oïdium et de ramulariose sur les parcelles.

A RETENIR

Risque : moyen pour la cercosporiose.

faible pour la rouille, l'oïdium et la ramulariose.

Stade de sensibilité : dès la couverture.

Seuil indicatif de risque : début de la protection avant la mi-août.

% de feuilles avec symptômes :

	T1	T2	T3
Cercosporiose	1ers symptômes	20%	25%
Ramulariose	5%	20%	25%
Oïdium	15%	30%	30%
Rouille	15%	40%	40%

début de la protection après la mi-août.

% de feuilles avec symptômes :

	T1	T2	T3
Cercosporiose	20%	25%	Pas de traitement
Ramulariose	20%	25%	Pas de traitement
Oïdium	30%	Pas de traitement	Pas de traitement
Rouille	40%	Pas de traitement	Pas de traitement

MAÏS

9 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES

Toutes les parcelles ont atteint le stade grains durs et 1 parcelles est à 50 % d'humidité du grain.


• Pucerons

Pas de puceron observé cette semaine.

• Pyrales



6 relevés. Les captures ont baissé par rapport à la semaine dernière, avec 2.5 papillons par piège en moyenne. La courbe de captures sur ce deuxième vol est identique à celle de l'année 2025. L'impact de ce deuxième vol sera certainement limité, avec des feuilles desséchées peu favorables au dépôt de pontes.



A RETENIR

Risque : faible.

Stade de sensibilité : 10-12 feuilles à floraison.

Vous trouverez sur le site de la DRIAf les fiches des Organismes Réglementés de la filière :

<https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-grandes-cultures-r739.html>,

<https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-pomme-de-terre-r737.html>

Les notes nationales de biodiversité sont consultables sous <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/notes-nationales-biodiversite-r607.html>

Pour en savoir plus sur :

-Les résistances : <https://www.r4p-inra.fr/fr/home/>

-Les produits de biocontrôle : <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/liste-officielle-biocontrrole-avril-2023-a1709.html>

-Les adventices : <https://www.infloweb.fr/>

• Observations :

AGRICULTEURS, COOP 110 BOURGOGNE, CERESIA, ARVALIS, CARIDF, CENTREXP, COOPERATIVE ILE DE FRANCE SUD, COOP SEVEPI, Ets SOUFFLET AGRICULTURE, FREDON IDF, ITB IDF, SRAL, SUCRERIE CRISTAL UNION, SUCRERIE TEREOS, TERRES INOVIA.

• Rédaction :

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE : Hugues BERGAMINI, Nicolas GREAUME, Valentine BOULLENGER, Clément LECLERCQ, Claire TURILLON.

FREDON Ile de France : Céline GUILLEM.

• Comité de relecture :

ARVALIS, Chambre d'Agriculture de Région Île de France, TERRES INOVIA, ITB, SRAL.