



Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de
la [Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est](#) et de la [DRAAF](#)

BSV n°26 – 9 septembre 2026

À RETENIR CETTE SEMAINE

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement au paragraphe



DONNÉES MÉTÉO

COLZA

Stade : cotylédons à 2 feuilles (BBCH 10 à BBCH12)

Altises : L'activité des altises est faible. Des morsures sont observées ponctuellement. Pas de dégâts significatifs. A surveiller.

Ce logo est un indicateur sur les résistances aux substances actives couplées à un bioagresseur.



Vous trouverez des éléments complémentaires dans le lien ci-dessous :

[Rapports techniques sur les résistances en France – R4P \(r4p-inra.fr\)](#)



Parcelles observées cette semaine :

7 Colza.



- Prévision météo à 7 jours pour Haguenau :

JEUDI 10	VENDREDI 11	SAMEDI 12	DIMANCHE 13	LUNDI 14	MARDI 15	MERCREDI 16
						
8° / 25°	9° / 25°	10° / 27°	10° / 28°	12° / 28°	12° / 29°	13° / 24°
➤ 10 km/h	➤ 15 km/h	↻ 5 km/h	➤ 15 km/h	➤ 10 km/h	➤ 15 km/h	➤ 20 km/h 40 km/h

(Source : Météo France, 08/09/2026 à 15h00. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))

- Prévision météo à 7 jours pour Sélestat :

JEUDI 10	VENDREDI 11	SAMEDI 12	DIMANCHE 13	LUNDI 14	MARDI 15	MERCREDI 16
						
12° / 23°	10° / 25°	12° / 26°	11° / 28°	13° / 27°	13° / 29°	15° / 25°
➤ 10 km/h	➤ 15 km/h	▼ 5 km/h	➤ 10 km/h	⬅ 5 km/h	⬅ 5 km/h	➤ 15 km/h

(Source : Météo France, 08/09/2026 à 15h00. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))

- Prévision météo à 7 jours pour Altkirch :

JEUDI 10	VENDREDI 11	SAMEDI 12	DIMANCHE 13	LUNDI 14	MARDI 15	MERCREDI 16
						
9° / 23°	9° / 22°	10° / 24°	10° / 25°	12° / 26°	11° / 26°	13° / 22°
➤ 10 km/h	➤ 15 km/h	➤ 5 km/h	➤ 15 km/h	▼ 5 km/h	➤ 10 km/h	⬅ 10 km/h 45 km/h


(Source : Météo France, 08/09/2026 à 15h00. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))



1 Stades phénologiques

Le réseau d'observation se met progressivement en place. Seulement 7 parcelles de colza (4 dans le Haut-Rhin et 3 dans le Bas-Rhin) sont suivies cette semaine. Dans ces situations, les colzas se situent entre cotylédons et 2 feuilles.

Répartition des stades du colza



1 Petites altises (Phyllotreta sp.) et Grosses altises (Psylliodes chrysocephala)


Les altises sont des petits coléoptères qui occasionnent des morsures circulaires, perforantes ou non, de 1 à 2 mm dans les cotylédons et les jeunes feuilles. Ces attaques pénalisent la culture lorsque plus d'un quart de la surface foliaire est détruite.

Lorsque la culture est à des stades jeunes entre 1 et 3 feuilles (B1 à B3 / BBCH11 à BBCH13), une surveillance assidue est nécessaire, car les dégâts peuvent s'accumuler rapidement.



Dégâts de petites altises (Terres Inovia)

Observer en priorité les bordures de parcelle, notamment à proximité des anciens champs de colza.



a. Observations

Cette semaine, la pression altise est faible. On signale qu'une seule capture de grosse altise dans le piège enterré sur la parcelle d'OERMINGEN (67) en Alsace Bossue.

Des piqures d'altises sont observées dans 2 parcelles sur 5 ayant fait l'objet d'une observation spécifique. En moyenne, 3 % des pieds sont touchés (0 à 10 %) avec une consommation de surface foliaire insignifiante à nulle.



Dégâts très faibles sur cotylédons et absence de piqûres sur les jeunes feuilles sur la parcelle d'OERMINGEN (67) (Bruno SCHMITT, CAA)

b. Seuil indicatif de risque

Le seuil indicatif de risque est fixé à 8 pieds sur 10 portants des morsures, sans que la dépréciation ne dépasse $\frac{1}{4}$ de la surface foliaire. La maîtrise du risque intervient lorsque la culture est en péril. **Dans ce cas, la réactivité est impérative.**

Les interventions inutiles favorisent l'apparition de résistances et potentiellement les pullulations de pucerons en l'absence de faune auxiliaire.

c. Analyse de risque

La pression est restée faible malgré la hausse des températures. Le risque reste moyen à fort car les colzas sont encore majoritairement au stade cotylédons à 1 feuille et que les conditions climatiques annoncées à 10 jours sont toujours encore sèches et chaudes. Maintenir une surveillance minutieuse des parcelles.



d. Gestion alternative du risque

Eviter de détruire les repousses de colza lorsque les colzas en place à proximité sont au stade cotylédons – 3 feuilles. Cela évite la migration des petites altises vers des cultures au stade sensible.



Attention au risque de résistances aux pyréthrinoïdes. Plus de détails sur le site de [Terres Inovia – les résistances aux pyréthrinoïdes](#)



Ces notes Biodiversité sont produites dans le cadre du projet global de réorientation du Bulletin Santé Végétal : BSV 2.0.

Vous pouvez également les retrouver sur le site EcophytoPIC.



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles.
S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Observations : AB2F Conseil, AGRO 67, Arvalis - Institut du Végétal, CAC – Ampélys, Chambre d'Agriculture d'Alsace, Le Comptoir Agricole, CRISTAL UNION, Gustave MULLER, ETS LIENHART, WALCH.

Rédaction : Arvalis Institut du Végétal, Chambre d'Agriculture d'Alsace et Terres Inovia.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.
Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV.

Coordination et renseignements : Joliane BRAILLARD - joliane.brillard@grandest.chambagri.fr