



Bulletin de Santé du Végétal

grandes
cultures

Lorraine



Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de
la [Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est](#) et de la [DRAAF](#)

BSV n°28 – 30 septembre 2026

À RETENIR CETTE SEMAINE

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement au paragraphe



DONNÉES MÉTÉO

COLZA

Stade : Majoritairement 3-4 feuilles ; cultures impactées par la sécheresse.

Altises : Risque moyen susceptible d'évoluer dans les prochains jours. Surveillance très régulière des parcelles peu développées.

NOTES BIODIVERSITÉ

Ce logo est un indicateur sur les résistances aux substances actives couplées à un bioagresseur.



Vous trouverez des éléments complémentaires dans le lien ci-dessous :

[Rapports techniques sur les résistances en France – R4P \(r4p-inra.fr\)](#)



Parcelles observées cette semaine :

53 Colza.



Prévisions météo à 7 jours :

JEUDI 01	VENDREDI 02	SAMEDI 03	DIMANCHE 04	LUNDI 05	MARDI 06	MERCREDI 07
						
17° / 20°	12° / 21°	11° / 23°	12° / 21°	11° / 21°	10° / 22°	10° / 20°
► 10 km/h	▲ 10 km/h	▲ 5 km/h	▲ 5 km/h	▲ 10 km/h	▲ 10 km/h	▼ 15 km/h

(Source : Météo France, ville de Nancy, 29/09/2026 à 14h00. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))




1 Stade des cultures


Cette semaine, les stades sont compris entre semis non levé à 6 feuilles. La majorité des colzas du réseau d'observation compte 3 à 4 feuilles (B3 – B4 ; BBCH 13 et 14).

Les colzas souffrent de la sécheresse prolongée. Certains observateurs mentionnent des colzas en train de dépérir alors qu'ils avaient atteint le stade 2 ou 3 feuilles. Certaines parcelles du réseau sont déjà retournées, ce qui correspond à des situations que l'on retrouve en plaine.

Répartition des stades du colza



Localisation des parcelles observées




2 Grosses altises (*Psylliodes chrysocephala*)

a. Observations

L'activité des grosses altises s'intensifie encore cette semaine. Des morsures d'altise sont observées dans 93 % des parcelles du réseau (79 % des parcelles la semaine dernière). Les proportions de plantes touchées et de surface foliaire détruite continuent également d'augmenter. On observe en moyenne 50 % de pieds touchés (28 % la semaine précédente) avec 9,3 % de surface foliaire détruite (8 % la semaine précédente). Le seuil indicatif de risque est dépassé dans 2 parcelles.

Les captures sont aussi en hausse cette semaine. On observe le ravageur dans 98 % des parcelles du réseau avec en moyenne 27 insectes par piège actif. Localement, les captures sont très conséquentes, comme à FROLOIS (54) où l'on dénombre 105 individus, ou à MONTIGNY-SUR-CHIERS (54) avec 151 captures.



b. Seuil indicatif de risque

Le seuil indicatif de risque est fixé à 8 pieds sur 10 portants des morsures, sans que la dépréciation ne dépasse ¼ de la surface foliaire. La maîtrise du risque intervient lorsque la culture est en péril. Dans ce cas, la réactivité est impérative.

Les interventions inutiles favorisent l'apparition de résistances et potentiellement les pullulations de pucerons en l'absence de faune auxiliaire.

c. Analyse de risque

Les dégâts en culture restent pour l'instant limités, même si ponctuellement le seuil indicatif de risque fixé à 80 % de plantes porteuses de morsures et au moins 25 % de surface foliaire détruite est atteint. Toutefois, les conditions sèches prolongées sont peu favorables à la croissance des colzas alors que la colonisation des parcelles par les grosses altises se poursuit. Le risque est moyen (dans la majorité des situations) à fort (dans les parcelles proches ou ayant dépassé les seuils indicatifs de risque et qui n'ont pas dépassé le stade 4 feuilles). Une surveillance très régulière des parcelles est requise.



d. Gestion alternative du risque

Eviter de détruire les repousses de colza lorsque les colzas en place à proximité sont au stade cotylédons – 3 feuilles. Cela évite la migration des petites altises vers des cultures au stade sensible. Dans le contexte de 2026, les repousses ont levé en même temps que les colzas semés. Ces repousses peuvent jouer le rôle d'interculture piège en attirant les grosses altises lors de la colonisation des parcelles. Les conserver tout le mois de septembre (lorsque cela est possible sans compromettre la culture suivante) peut permettre de diluer la population du ravageur.



Attention au risque de résistance aux pyréthrianoïdes.

Plus de détails sur le site de [Terres Inovia - Etat des résistances](#)



Ces notes Biodiversité sont produites dans le cadre du projet global de réorientation du Bulletin Santé Végétal : BSV 2.0.

Vous pouvez également les retrouver sur le site EcophytoPIC.



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles.

S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Observations : Alter Agro, Arvalis Institut du végétal, Avenir Agro, la Chambre d'Agriculture de Meurthe-et-Moselle, la Chambre d'Agriculture de la Meuse, la Chambre d'Agriculture de Moselle, la Chambre d'Agriculture des Vosges, la Coopérative Agricole Lorraine, El Marjollet, EMC2, EstAgri, EPL Agro, FREDON Grand Est, GPB Dieuze-Morhange, Hexagrain, LORCA, Sodipa Agri, Soufflet Agriculture, Terres Inovia, Vivescia.

Rédaction : Arvalis Institut du Végétal, FREDON Grand Est et Terres Inovia.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.

Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV.

Coordination et renseignements : Joliane BRAILLARD - joliane.brillard@grandest.chambagri.fr