



BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL

de Bourgogne-Franche-Comté



SOMMAIRE

P. 1 Météo

P. 11 Soja

P. 2 Biodiversité et santé des agrosystèmes

P. 3 Colza

P. 10 Tournesol

A RETENIR

Colza :

- Nombreux cas de dégâts de punaises des céréales signalés sur les plantules de colzas. Les parcelles concernées peuvent être déclarées sur le lien suivant : [Enquête sur les punaises s'attaquant au colza | Terres Inovia](#)
- Surveiller les morsures de petites altises et de criquets dès la levée.
- Mettre en place les pièges (cuvettes jaunes enterrées, pièges à limace).

Tournesol :

- Repérer la maturité pour éviter les pertes liées à une récolte trop tardive.

Soja :

- Fin de maturité ou récolte en cours. Attention à l'égrenage dans les parcelles mûres.

METEO

Prévisions à 7 jours :

MERCREDI 09	JEUDI 10	VENDREDI 11	SAMEDI 12	DIMANCHE 13	LUNDI 14	MARDI 15
						
15° / 22°	9° / 21°	8° / 22°	10° / 25°	10° / 25°	11° / 27°	12° / 28°
▲ 10 km/h	► 10 km/h	▲ 5 km/h	► 10 km/h	► 10 km/h	► 5 km/h	▼ 10 km/h

(Source : Météo France, Besançon (25000), 08/09/2026 à 10h00. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))

Biodiversité et santé des agrosystèmes

Toutes les fiches biodiversité et santé des agrosystèmes ainsi que les fiches réglementaires sont disponibles sur le site de la Chambre régionale de Bourgogne Franche-Comté.

Biodiversité et santé des agrosystèmes

Ces notes biodiversité visent à accompagner la démarche agroécologique portée par le bulletin de santé du végétal.






COLZA

RESEAU 2026 - 2027

Le réseau se met progressivement en place. Cette semaine, le BSV a été rédigé à partir des observations réalisées dans 42 parcelles.




Parcelles du réseau BSV observées le 07/09/2026

Stade

Les stades des colzas sont très hétérogènes selon les secteurs et les parcelles, en lien avec les dates de semis et la répartition irrégulière des précipitations. À l'échelle de la région, les parcelles se situent majoritairement entre les stades « cotylédons » et « 2 feuilles ». Des parcelles ayant reçu des cumuls de pluie plus généreux sont parfois plus avancées, jusqu'au stade « 5 feuilles ». Une minorité de parcelles est encore en cours de levée.

Des différences de stades sont également observées au sein d'une même parcelle, notamment dans les situations ayant reçu de faibles précipitations au cours du mois d'août. Ces conditions ont entraîné une germination irrégulière et des levées peu homogènes.

Des ressemis ont pu être réalisés localement, dans des situations de plantes qui ont germées puis séchées, ou à la suite d'attaques précoces d'insectes, notamment les punaises des céréales (voir paragraphe dédié ci-après).



Mise en œuvre des pièges

Les pièges doivent être mis en place dès l'implantation des colzas.

Ils permettront d'appréhender l'arrivée des insectes en temps réel et de façon très locale pour avoir une lutte contre les ravageurs qui soit adaptée, efficace et raisonnée.

Les pièges sont essentiels pour pouvoir utiliser les seuils de nuisibilité et mesurer les risques sur les parcelles de colza.

Avant la levée de la culture puis en complément de l'observation des plantes, les pièges nous informent sur l'arrivée des ravageurs et leur activité.

Pièges à limaces :



Piège à limaces

N. Ralai - CA89

Avant la levée de la culture, l'observation des limaces grises et noires se fait à l'aide de 4 pièges de 25x25 cm préalablement humidifiés par trempage, éloignés d'au moins 5m les uns des autres.

Pour fixer les limaces et faciliter le comptage, il est possible de rajouter quelques granulés anti-limaces sous le piège.

Cette observation nécessite une attention particulière. En effet, le relevé des pièges doit s'effectuer en début de matinée en conditions fraîches et humides et en « grattant » la terre sous les pièges car les limaces sont généralement abritées entre les mottes dans les premiers cm du sol

Les cuvettes jaunes :

Elles se placent au niveau de la végétation sauf pour les grosses altises (altises d'hiver) ou la cuvette doit être enterrée.



Cuvette enterrée

Terres Inovia



L. Jung - Terres Inovia

Pour capturer l'altise d'hiver ou grosse altise, la cuvette doit être enterrée, bord supérieur à 1-2 cm au-dessus du sol.

La plupart des insectes sont attirés par la couleur jaune. L'altise d'hiver fait exception.

On enterre la cuvette dans le sol pour favoriser les captures à l'occasion de ses sauts (piège d'interception). Les altises doivent pouvoir tomber dans le piège au fil de leur avancée dans la parcelle.



Cuvette en végétation

Terres Inovia

Pour les autres insectes, la cuvette doit être toujours comme "posée" sur la végétation.

Quelques conseils d'usage pour que les pièges soient attractifs :

- Positionner le piège dans le champ en tenant compte des vents dominant et de la proximité d'une ancienne parcelle de colza.
- Remplir la cuvette avec 1 litre d'eau et quelques gouttes de mouillant de type liquide vaisselle (pas trop). Prévoir un bidon plein de ce mélange qui reste dans la parcelle pour faire le niveau de la cuvette.
- Eviter les piétinements qui modifient le contexte de végétation. Si nécessaire, déplacer la cuvette.
- Nettoyer la cuvette jaune pour qu'elle reste attractive. Si la couleur jaune est « passée », changer la cuvette.

- Relever le(les) cuvette(s) toutes les semaines : filtrer les insectes et éventuellement les laisser sécher pour faciliter leur reconnaissance, remplacer l'eau régulièrement, repositionner la cuvette en fonction de la hauteur de la végétation.

Ravageurs


Les premiers insectes susceptibles d'être observés dans les cuvettes sont les petites altises (ou altises des crucifères). Attention à ne pas les confondre avec les grosses altises (ou altises d'hiver) qui, en général, arrivent plus tard, vers la mi-septembre.

Altises des crucifères ou petites altises

Il s'agit d'un petit coléoptère noir ou bicolore (noir, avec 1 ou 2 bandes longitudinales jaunes sur chaque élytre). Il mesure 2 à 2,5 mm.

a. Observations

Des morsures sur plantes sont observées dans 10 parcelles sur 35. Les dégâts restent modérés, puisque la moyenne des parcelles touchées s'établit à 9.2 % de plantes avec morsures et 5 % de surface foliaire détruite.



b. Période de risque

Depuis la levée jusqu'au stade 3-4 feuilles.

c. Seuil indicatif de risque :

8 pieds sur 10 portants des morsures et 25 % de la surface foliaire détruite.

La vigilance doit se porter en priorité en bordure de parcelle.

Dans les zones où des repousses de colza sont présentes, la destruction de celles-ci entraîne un déplacement de population, et donc augmente le risque.



Pour le moment aucun cas de résistance des petites altises aux pyrèthrinoïdes n'a été mis en évidence.

d. Analyse du risque :

- pour les colzas où des dégâts ne sont pas observés (majorité des situations), le risque est encore **assez faible**. Surveiller en priorité les bordures et les parcelles à proximité d'anciens colzas.



- pour les colzas où des dégâts sont observés, la pression est pour le moment modérée : le risque est **moyen**. Surveiller régulièrement l'évolution des dégâts.



Remarque : afin ne pas déplacer les populations de petites altises, il est préférable d'attendre que les nouveaux colzas aient dépassé la période de risque (4-5 feuilles) avant de détruire les repousses.

Punaises des céréales

Les années chaudes et sèches, ces petites punaises peuvent attaquer les jeunes colzas en cours de levée, sans solution de lutte identifiée à ce jour. Seul le retour des précipitations peut contribuer à limiter et disperser les populations présentes.

Symptômes : flétrissement rapide, dessèchement, disparition des pieds. Les foyers sont souvent localisés en bordure de parcelles.

Observations : Des attaques de punaises sont régulièrement signalées, aussi bien au sein du réseau qu'en dehors, à travers toute la région. Les dégâts concernent principalement les bordures de parcelles, mais les populations peuvent localement progresser vers l'intérieur et occasionner des destructions sur des surfaces parfois très importantes.



colza flétri par les piqûres de punaises

Terres Inovia

Criquets italiens

Ils sont régulièrement observés hors réseau. Les températures chaudes semblent favorables à leur développement tandis que le sec raréfie leur source de nourriture « verte ».

Maintenir une vigilance dès la levée, notamment dans les situations avec peu de travail du sol et/ou de nombreux résidus.



Criquet italien

Muséum National d'Histoire Naturelle

Altises d'hiver (ou grosse altise)

Elles sont plus grosses que les altises des crucifères et se reconnaissent facilement avec leurs pattes en forme de « cuisses de grenouilles ».

Les dégâts occasionnés sont actuellement des dégâts liés aux adultes qui se nourrissent des jeunes feuilles de colza. Ces dégâts sont similaires à ceux des petites altises.

a. Observations :

Les premiers individus ont été capturés en Haute-Saône et dans l'Yonne.

b. Période de risque (dégâts des adultes) :

Depuis la levée jusqu'au stade 3 feuilles inclus.

c. Seuil indicatif de risque :

8 pieds sur 10 portants des morsures **et** 25 % de la surface foliaire détruite.

d. Analyse du risque :

A ce jour, peu d'individus capturés ou observés. Les dégâts sur feuilles sont, pour le moment, inféodés aux petites altises. Le risque est **faible**.



Limaces

Le colza est particulièrement appétant pour les limaces. Le risque est accru sur sol motteux, avec résidus pailleux. Un suivi régulier (observations, pièges) est indispensable.

a. Observations :

Etant donné les conditions sèches de l'année, aucun dégât n'est signalé.

b. Période de risque :

Depuis la levée jusqu'au stade 3-4 feuilles.

c. Seuil indicatif de risque :

Il n'y a pas de seuil indicatif de risque pour les limaces mais en cas de forte présence, la survie de la culture est en jeu.

d. Analyse du risque :

Risque **faible** actuellement. Il pourra être revu à la hausse si des orages surviennent et humidifient les sols.



Des solutions de biocontrôle à base de phosphate ferrique existent.

Adventices

Les levées de graminées (repousses et ray-grass) se sont enclenchées avec les précipitations reçues. Il convient de ne pas les laisser concurrencer les colzas pour l'accès à l'eau et à la lumière.



TOURNESOL

RESEAU 2026 - 2027

Stade

Les récoltes sont en cours. De la prédation (oiseaux, sangliers) est signalée.

Récoltez au bon stade



L'observation des plantes, notamment des capitules, doit vous permettre d'identifier le stade optimal de récolte. Les valeurs d'humidité sont indicatives. Elles peuvent varier en fonction des régions, du contexte climatique, du taux d'impuretés, de l'état sanitaire des capitules et de leur taille.

Terres Inovia



Dégâts de sanglier
G. Frémont - CA89



Mauvaise fécondation et remplissage (sécheresse et canicule)
M. Lautier - CA89



SOJA

RESEAU 2026 - 2027

Les sojas terminent de mûrir ou les récoltes sont en cours.

La maturité est atteinte quand toutes les graines sont libres et « sonnent » dans les gousses. Leur humidité se situe alors entre 14 et 16 %. Récoltez sans attendre. Des situations d'égrenage sont actuellement observées.



Soja égrené

Victoire LEFEVRE - Terres Inovia

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté et rédaction animée par ARVALIS-Institut du Végétal, Terres Inovia et les Chambres d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté.



Bulletin édité à partir des observations réalisées par :



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux-mêmes réalisées sur leurs parcelles ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques de leurs conseillers.