



Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Région Île de France sur la base d'observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, il ne peut se substituer à une observation personnelle dans sa parcelle.

Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.

Pour vous abonner faites votre demande à ecophyto@idf.chambagri.fr en spécifiant la filière.

Financé dans le cadre de la stratégie **écophyto**

GOVERNEMENT
Liberté
Égalité
Fraternité



**La stratégie
écophyto 2030**
Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

A RETENIR (CTRL – CLIC POUR SUIVRE LE LIEN) :

Colza : semis réalisé, parcelles en cours de levée. Mise en place des cuvettes. Présence de punaises localement.

Betterave : progression de la cercosporiose. Rouille et oïdium absents. Présence de teigne importante. Présence de rhizopus parfois importante.

Maïs : Toutes les parcelles ont atteint le stade grains durs. Baisse du vol de pyrale.

METEO

STATION DE LIEUSAIN (77)

	mar. 8	mer. 9	jeu. 10	ven. 11	sam. 12	dim. 13	lun. 14
	1.4	0	0	0	0	0	0
	40 / 86	39 / 84	38 / 88	50 / 82	45 / 98	37 / 83	32 / 77
	16 / 26	13 / 21	10 / 22	12 / 22	12 / 25	13 / 25	14 / 27

Source : Sencrop - Modèle : METEOBLUE

COLZA


10 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES

Les semis ont eu lieu entre le 21 août et le 04 septembre. Les conditions sèches du mois d'août ont retardé le semis des parcelles de colza.

50 % des parcelles sont au stade prélevée, 20 % ont atteint le stade cotylédons et 30 % ont la première feuille étalée.

Répartition des stades (en %)
par semaine d'observation - Automne 2026



RAVAGEURS

• Altises des crucifères (petites altises)

RISQUE FAIBLE


RISQUE FORT

Cette semaine, seulement 2 parcelles présentent des morsures d'altises :

- 100 % des pieds touchés et 0,5 % de la surface foliaire détruite à Saint-Martin-de-Bréthencourt (78)
- 2 % des pieds touchés et 1 % de surface foliaire détruite à Vallangoujard (95).

Il n'y a aucune parcelle qui dépasse le seuil indicatif de risque.

Piégeage : Dès le semis, enterrez une cuvette jaune afin de connaître le début du vol. Venez observer 2 à 3 fois par semaine pendant la phase de levée.



A RETENIR

Risque : faible.

Stade de sensibilité : de la levée au stade 3 feuilles.

Seuil indicatif de risque : 8 pieds / 10 avec morsures et 25 % de surface foliaire atteinte.

• Punaies

Certaines parcelles sont infestées par des punaises qui sont présentes ponctuellement et **spécifiquement après les conditions chaudes et sèches de cet été**. Ces punaises sont phytophages, polyphages, autrement dit « généralistes » et recherchent des végétaux encore verts lorsque leurs plantes hôtes se dessèchent ou disparaissent.

Plusieurs espèces peuvent être impliquées mais dans la majorité des attaques, il s'agit de *Nysius cymoides*, aussi appelée fausse punaise des céréales.

Les attaques causées par des punaises au stade larvaire **commencent en bordure de parcelle** avant de progresser rapidement vers l'intérieur de la parcelle. Les dégâts sont associés à des **populations très importantes et facilement visibles**.

Les punaises prélèvent la sève et engendrent le **flétrissement puis le dessèchement des jeunes plantes en phase de levée**.




Illustration de différents stades de l'espèce *Nysius cymoides* - a) Larve stade III (1,0 mm) ; b) Larve stade IV (1,5 mm) ; c) Larve stade V (2,2 mm) ; d) Adulte mâle (2,5 mm). La taille correspond à la mesure entre l'extrémité de la tête et l'extrémité de l'abdomen (photos : laboratoire d'Eco-Entomologie - J.-D. Chapelin-Viscardi).


Aucune solution insecticide n'est actuellement homologuée contre ces insectes sur colza. Lors des précédentes attaques, les précipitations (voire irrigations) contribuaient à disperser les larves.

BETTERAVE

30 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES

50 % des parcelles sont à moins de 50 % de couverture, et à l'inverse, plus d'un tiers des parcelles ont 100 % de couverture.



RAVAGEURS

• Jaunisse

Sur les 3 parcelles dont des informations sur la jaunisse sont renseignées, toutes présentent des symptômes de jaunisse de 0,5 à 5 % de surface impactée.

La sécheresse actuelle rend difficile l'observation des symptômes de jaunisse.


• Teignes



Sur 5 pièges relevés cette semaine, tous remontent la présence de papillons avec 11 papillons piégés en moyenne. Il y a de grandes différences de captures, avec seulement 2 papillons capturés à D'Huison-Longueville (91) contre 18 à Saint-Martin-de-Bréthencourt (78).

Le deuxième vol semble donc terminé.

Parmi les 19 parcelles renseignées, 18 présentent des dégâts frais dont 16 au-dessus du seuil de risque, allant de 1 et jusqu'à 100 % de plantes touchées.



Présence de rhizopus dans 100 % des parcelles renseignées pour cette maladie (17 parcelles), allant de 1 % de la surface parcellaire touchée à 40 % à D'Huison-Longueville (91).

A RETENIR

Risque : fort.

Stade de sensibilité : à partir de la couverture.

Seuil indicatif de risque : en présence de stress hydrique, 10 % de plantes touchées avec présence de dégâts frais ou chenilles.

• Pégomyies



Sur 9 parcelles renseignées, toutes sont sous le seuil indicatif de risque.

A RETENIR

Risque : faible.


Stade de sensibilité : toute la période de végétation.

Seuil indicatif de risque : avant couverture du sol : 10 % de plantes avec au moins 1 galerie.
après couverture du sol : 50 % de plantes avec au moins 1 galerie ou présence d'asticots.

• Noctuelles



9 parcelles sur 13 observées pour ce ravageur remontent la présence de dégâts de noctuelles, allant de 1 % à 80 % de betteraves touchées.



A RETENIR

Risque : faible en culture irriguée.
moyen en culture sèche.

Stade de sensibilité : de 6 feuilles à la récolte.

Seuil indicatif de risque : 50 % de plantes avec traces de morsures ou déjections récentes.

• Charançon lixus



11 parcelles sur 12 observées remontent la présence de piqures de pontes allant de 5 % à 100 % de betteraves touchées à Noisy-Rudignon (77).


MALADIES DU FEUILLAGE

22 parcelles renseignées

• Cercosporiose



Une carte interactive sur le site de l'ITB permet de consulter le statut des parcelles par seuil de traitement <https://alerte.itbfr.org/maladies/>.



Près d'un quart des parcelles est indemne de cercosporiose.

A l'inverse, une parcelle atteint le seuil du troisième traitement.

Avec des conditions météorologiques plus favorables à la maladie, la cercosporiose progresse.

Une protection est rarement justifiée à 45 jours de la récolte.

• Rouille et oïdium



Seules 4 parcelles remontent la présence d'oïdium entre 1 et 8 % de betteraves touchées.

Absence d'oïdium et de ramulariose sur les parcelles.

A RETENIR

Risque : moyen pour la cercosporiose.

faible pour la rouille, l'oïdium et la ramulariose.

Stade de sensibilité : dès la couverture.

Seuil indicatif de risque : début de la protection avant la mi-août.

% de feuilles avec symptômes :

	T1	T2	T3
Cercosporiose	1ers symptômes	20%	25%
Ramulariose	5%	20%	25%
Oïdium	15%	30%	30%
Rouille	15%	40%	40%

début de la protection après la mi-août.

% de feuilles avec symptômes :

	T1	T2	T3
Cercosporiose	20%	25%	Pas de traitement
Ramulariose	20%	25%	Pas de traitement
Oïdium	30%	Pas de traitement	Pas de traitement
Rouille	40%	Pas de traitement	Pas de traitement

STADES


Toutes les parcelles ont atteint le stade grains durs.

RAVAGEURS

• Pyrales



6 relevés. Les captures ont baissé par rapport à la semaine dernière, avec 2 papillons par piège en moyenne. Une parcelle capture 24 papillons dans le 91.



A RETENIR

Risque : faible

Stade de sensibilité : 10-12 feuilles à floraison.

Vous trouverez sur le site de la DRIAf les fiches des Organismes Réglementés de la filière :

<https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-grandes-cultures-r739.html>,

<https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-pomme-de-terre-r737.html>

Les notes nationales de biodiversité sont consultables sous <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/notes-nationales-biodiversite-r607.html>

Pour en savoir plus sur :

-Les résistances : <https://www.r4p-inra.fr/fr/home/>

-Les produits de biocontrôle : <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/liste-officielle-biocontrrole-avril-2023-a1709.html>

-Les adventices : <https://www.infloweb.fr/>

- **Observations :**

AGRICULTEURS, COOP 110 BOURGOGNE, CERESIA, ARVALIS, CARIDF, CENTREXPE, COOPERATIVE ILE DE FRANCE SUD, COOP SEVEPI, Ets SOUFFLET AGRICULTURE, FREDON IDF, ITB IDF, SRAL, SUCRERIE CRISTAL UNION, SUCRERIE TEREOS, TERRES INOVIA.

- **Rédaction :**

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE : Hugues BERGAMINI, Nicolas GREAUME, Valentine BOULLENGER, Clément LECLERCQ, Claire TURILLON.

FREDON Ile de France : Céline GUILLEM.

- **Comité de relecture :**

ARVALIS, Chambre d'Agriculture de Région Île de France, TERRES INOVIA, ITB, SRAL.