



N° 34

29/09/26

A RETENIR (CTRL – CLIC POUR SUIVRE LE LIEN) :

Colza : parcelles en cours de levée à 5 feuilles vraies. Augmentation des captures de grosses altises. Augmentation des morsures de petites et grosses altises. Peu de dégâts de limaces. Augmentation de la pression pucerons verts. Présence de punaises.

METEO

STATION DE LIEUSAIN (77)

mar. 29	mer. 30	jeu. 1	ven. 2	sam. 3	dim. 4
0	0.8	11.3	0	0	0
42 / 89	45 / 92	63 / 97	53 / 99	54 / 92	50 / 89
16 / 28	19 / 27	12 / 21	9 / 21	11 / 24	14 / 25

Source : Sencrop - Modèle : METEOBLUE

COLZA

20 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES

Les colzas continuent d'évoluer lentement du fait des conditions sèches.

Les stades sont souvent hétérogènes au sein d'une parcelle, avec une partie de colzas non levés.

Nous avons également observé des pertes de pieds dans les parcelles les moins favorables.

15 % des parcelles du réseau sont encore aux stades prélevée ou cotylédons, malgré des semis qui datent de plus de 3 semaines.

Les parcelles les plus avancées sont au stade 5 feuilles vraies.

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Région Île de France sur la base d'observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, il ne peut se substituer à une observation personnelle dans sa parcelle.

Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.

Pour vous abonner faites votre demande à ecophyto@idf.chambagri.fr en spécifiant la filière.


Financé dans le cadre
de la stratégie **ecophyto**


GOUVERNEMENT
Liberté
Égalité
Fraternité



**La stratégie
ecophyto 2030**
Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

Répartition des stades (en %) par semaine d'observation - Automne 2026



RAVAGEURS

• Altises des crucifères (petites altises)



Des individus ont été capturés dans 3 parcelles parmi les 14 relevées :

- 2 à Mondreville (78) ;
- 3 à Villiers-Saint-Frédéric (78) ;
- 3 à Mérobert (91).

A RETENIR

Risque : faible.

Stade de sensibilité : de la levée au stade 3 feuilles.


Seuil indicatif de risque : 8 pieds / 10 avec morsures et 25 % de surface foliaire atteinte.

• Grosses altises (altises d'hiver)



19 parcelles observées cette semaine. La fréquence de capture est stable par rapport à la semaine dernière. Elle est légèrement inférieure à la moyenne des 10 dernières années.


Suivi des fréquences de captures de grosses altises à l'automne 2026 en région Ile-de-France




Source : CARIDF

La pression est en augmentation par rapport à la semaine dernière, avec en moyenne 8,4 individus capturés par piège. Les captures ont été multipliées par 4 en une semaine.

Suivi des captures de grosses altises à l'automne 2026 en région Ile-de-France




Piégeage : Dès le semis, enterrez une cuvette jaune afin de connaître le début du vol. Venez observer 2 à 3 fois par semaine pendant la phase de levée.



Des morsures d'altises (des crucifères et des altises d'hiver confondues) sont observées dans l'ensemble des parcelles observées (13 au total) :


Dégâts d'altises - % de plante porteuses de piqûres
Réseau BSV Ile de France - Semaine 40 - 2026



60 % des parcelles du réseau sont au stade de sensibilité aux morsures d'altises.

La pression est stable par rapport à la semaine dernière. En moyenne, 35 % des plantes présentent des morsures. La surface foliaire détruite est en augmentation, avec en moyenne 9,5 % de la surface concernée, contre 6,5 % la semaine dernière.

Suivi des attaques d'altises sur plantules à l'automne 2026 en région Ile-de-France



A RETENIR

Risque : faible à moyen.

Stade de sensibilité : de la levée au stade 3 feuilles.

Seuil indicatif de risque : 8 pieds / 10 avec morsures et 25 % de surface foliaire atteinte.

• Limaces



Seule la parcelle de Leudeville (91) signale 15 % de surface foliaire détruite.

Le retour de la pluie dans les prochains jours pourrait être favorable à l'activité des limaces.

Il est nécessaire de surveiller le risque à la parcelle. Le risque est plus important dans les parcelles avec de nombreux résidus de pailles et/ou avec une préparation de sol motteuse.

Piégeage :

Vous pouvez disposer 4 bâches de 0,25 m² bien humidifiées et maintenues au sol. Les pièges sont installés le soir pour un relevé le lendemain matin de bonne heure. La localisation des pièges devra être modifiée à chaque relevé.

A RETENIR

Risque : faible.

Stade de sensibilité : de la levée au stade 3 feuilles.

Seuil indicatif de risque : présence de dégâts foliaires visibles et conditions favorables à l'activité des limaces.

• Pucerons verts



Les signalements sont en augmentation cette semaine. Des pucerons verts ont été observés dans 46 % des parcelles du réseau (15 observées) :

Commune	Variété / tolérance TuYV	% de plantes avec individus
Sancy-les-Provins (77)		15 %
Saint-Illiers-la-Ville (78)	Mélange : tolérantes	1 %
Villiers-Saint-Frédéric (78)		5 %
Gironville-sur-Essonne (91)	Mélange	15 %
Videlles (91)	CEOS : tolérante	20 %
Attainville (95)	KWS DOMINGOS : tolérante	5 %
Vallangoujard (95)	KWS DOMINGOS : tolérance	20 %

Toutes les parcelles sont au stade de sensibilité (≤ 6 feuilles vraies).

Aucune parcelle ne dépasse le seuil indicatif de risque pour des variétés non résistantes.

- **Comment observer ce ravageur ?**

En retournant les feuilles et en observant minutieusement la face inférieure.

A RETENIR

Risque : faible.

Stade de sensibilité : de la levée au stade 6 feuilles.

Seuil indicatif de risque sur variétés non résistante TuYV : 20 % de plantes porteuses d'au moins un puceron vert.

- **Charançon du bourgeon terminal**



Seule la parcelle d'Abbeville-la-Rivière (91) a capturé un individu.

A ne pas confondre avec le baris (insecte sans poils, noir à reflet bleu-vert de même taille que le charançon du bourgeon terminal - 2,5 à 3,5 mm) et le charançon gallicole du chou qui est de plus petite taille (2-2,5 mm), de couleur gris noirâtre avec le bout des pattes noir.

A RETENIR

Risque : faible.

Stade de sensibilité : de la levée (stade A cotylédons étalés) au stade rosette, 82 % des parcelles de colza sont au stade sensible.

Seuil indicatif de risque : il n'existe pas de seuil de risque pour le charançon du bourgeon terminal. On considère que 8-10 jours après le début du vol (en pratique au PIC DE VOL), les femelles ont acquis la capacité de ponte, ce qui représente un risque pour la culture dès lors que les conditions climatiques sont favorables à l'activité de l'insecte.

- **Punaies**

Les conditions extrêmes de l'été 2026 ont conduit à des pullulations de ces insectes polyphages thermophiles, dont plusieurs espèces ont déjà été identifiées en France. Les punaises cherchent actuellement des sources de nourriture (repousses de colza, jeunes colzas en cours de levée, mais aussi d'autres espèces céréales, graminées, légumineuses...) dans un contexte de pénurie liée à la sécheresse.

Les colonisations se font via les parcelles adjacentes et se caractérisent par des déplacements en masse « en ordre serré » dans les parcelles, en commençant par les 20-30 m de bords de champs. Dépourvues d'ailes à ce stade (stade larvaire), les punaises fourmillent, piquent les feuilles et épuisent les plantules qui fanent très rapidement.

Les signalements sont en hausse en Ile-de-France, et plus particulièrement dans le sud de la région. L'arrivée de la pluie dans les prochains jours devrait permettre de réduire l'activité de ce ravageur.

- Plus d'infos [en cliquant ici](#) sur le site de Terres Inovia.

- Signaler les attaques sur colza via [l'enquête mise en ligne](#) par Terres Inovia.



Illustration de différents stades de l'espèce *Nysius cymoides* - a) Larve stade III (1,0 mm) ; b) Larve stade IV (1,5 mm) ; c) Larve stade V (2,2 mm) ; d) Adulte mâle (2,5 mm). La taille correspond à la mesure entre l'extrémité de la tête et l'extrémité de l'abdomen (photos : laboratoire d'Eco-Entomologie – J.-D. Chapelin-Viscardi).

Aucune méthode de lutte n'est actuellement homologuée contre ces insectes sur colza. Lors des précédentes attaques, les précipitations (voire irrigations) contribuaient à disperser les larves.

Vous trouverez sur le site de la DRIAf les fiches des Organismes Réglementés de la filière :

<https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-grandes-cultures-r739.html>,

<https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-pomme-de-terre-r737.html>

Les notes nationales de biodiversité sont consultables sous <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/notes-nationales-biodiversite-r607.html>

Pour en savoir plus sur :

-Les résistances : <https://www.r4p-inra.fr/fr/home/>

-Les produits de biocontrôle : <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/liste-officielle-biocontrôle-avril-2023-a1709.html>

-Les adventices : <https://www.infloweb.fr/>

- **Observations :**

AGRICULTEURS, COOP 110 BOURGOGNE, CERESIA, ARVALIS, CARIDF, CENTREXPE, COOPERATIVE ILE DE FRANCE SUD, COOP SEVEPI, Ets SOUFFLET AGRICULTURE, FREDON IDF, ITB IDF, SRAL, SUCRERIE CRISTAL UNION, SUCRERIE TEREOS, TERRES INOVIA.

- **Rédaction :**

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE : Hugues BERGAMINI, Nicolas GREAUME, Valentine BOULLENGER, Clément LECLERCQ, Claire TURILLON.

FREDON Ile de France : Céline GUILLEM.

- **Comité de relecture :**

ARVALIS, Chambre d'Agriculture de Région Île de France, TERRES INOVIA, ITB, SRAL.