



Grandes cultures

N°24
17/09/2026



Animateurs filières

Céréales à paille / Maïs

Philippe MOUQUOT / CDA 33
p.mouquot@gironde.chambagri.fr

Suppléance : ARVALIS
t.sidisaid@arvalis.fr
a.peyhorgue@arvalis.fr

Oléagineux

Quentin LAMBERT / Terres Inovia
q.lambert@terresinovia.fr

Prairies

Marie-Claude MAREAUX / CDA 64
mc.mareaux@pa.chambagri.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre Régionale
Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

Supervision site de Poitiers

La stratégie

écophyto 2030

Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.

Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Grandes
cultures N°X du JJ/MM/AA »

Edition **Aquitaine**

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT**
en cliquant sur [formulaire d'abonnement au BSV](#)

Ce qu'il faut retenir

Colza

- **Petites altises** : risque modéré pour les parcelles n'ayant pas atteint le stade 3 feuilles, nul ailleurs. Quelques piqûres, mais peu de dégâts signalés à ce jour, que ce soit dans ou en dehors du réseau.
- **Grosse altise** : risque modéré dans les parcelles n'ayant pas atteint le stade 4 feuilles, faible ailleurs. De premières captures en cuvette, mais pas ou peu de dégâts constatés en parcelle. Au regard des évolutions de températures en cours, il convient de surveiller attentivement les dynamiques de vol au cours des prochains jours !
- **Limaces** : risque faible pour les colzas n'ayant pas dépassé le stade 3 feuilles. Au regard des conditions météorologiques actuelles et des prévisions de pluies pour les 15 prochains jours, le risque demeure globalement faible.
- **Héliothis** : risque fort vis-à-vis des larves pour les parcelles en cours de levée, jusqu'au stade 3-4 feuilles. Des remontées hors réseau de dégâts impressionnants dans le Gers en en Dordogne, à l'origine de possible re-semis ou retournement de parcelles.

Annexes :

Reconnaissance des stades du colza à l'automne
Fiche ambrosie

Prairies


- Les vols de papillons s'intensifient à BIDARRAY, GARINDEIN et à LA BASTIDE-CLAIRENCE.
- Des chenilles ont été vues à ARETTE et GARINDEIN en faible densité. D'autres ont été observées à LASSEUBE (hors-réseau) en densité plus importante.
- Il est donc nécessaire de continuer à surveiller les prairies sensibles.



ANALYSE DE RISQUE ELABOREE A L'ECHELLE DU TERRITOIRE OUEST OCCITANIE

Parcelles BSV observées du 2026-09-08 au 2026-09-15

Le réseau d'observations colza de la Surveillance Biologique du Territoire (SBT) est en cours de construction. L'élaboration de l'analyse de risque 2026-2027 est établie sur les territoires Aquitaine et Ouest-Occitanie à partir de parcelles fixes qui font l'objet d'observations hebdomadaires. Cette semaine, l'analyse de risque est établie à partir de **6 parcelles observées**.



Vous êtes agriculteur, conseiller agricole, etc. ? La surveillance de l'état sanitaire et la performance du colza vous intéresse ?

Alors n'hésitez plus, intégrez le réseau BSV en Aquitaine et Midi-Pyrénées/Ouest-Audois et **devenez observateur colza !**



Demandez plus d'information à vos animateurs filières Terres Inovia : q.level@terresinovia.fr pour les départements 24, 32, 33, 40, 47, 64, 65 ou

q.lambert@terresinovia.fr pour les départements 09, 11, 12, 31, 46, 81, 82.

• Stades phénologiques et état des cultures

Du fait de dates de semis très éparées selon les secteurs (précocité des préparations de sols, cumuls de pluies au cours des mois d'août et de septembre), les stades s'étalent de semis en cours à B5 (BBCH 15 : 5 feuilles vraies étalées ou déployées) à l'échelle du réseau. Le faible nombre de remontées d'observations ne permet pas de définir de manière représentative la répartition des stades en présence.

Alors que les intentions de semis sont fortes et croissantes pour la culture de colza depuis maintenant 2 ans, le démarrage de la campagne 2027 est marqué par des conditions de semis et de levée globalement défavorables, voire très défavorables dans les secteurs n'ayant pas ou peu bénéficié des pluies d'orages du mois d'août et de début septembre. Si certaines parcelles ont pu être semées autour de la mi- ou de la fin-août, grâce à une préparation suffisamment précoce, une profondeur de semis maîtrisée (3 cm) et à des averses significatives (les parcelles présentant le meilleur état de développement à ce jour), d'autres ont été semées en conditions sèches ou insuffisamment réhumectées, et/ou à des profondeurs aléatoires (2 à plus de 5 cm), source de levées retardées, hétérogènes, et/ou d'échaudage au regard de conditions chaudes et sèches de début-septembre. A l'inverse, en sols limoneux, la réalisation de semis en amont de pluies d'orages localisées et significatives a pu entraîner des phénomènes de battance, dégradant les conditions de levée de la culture. Enfin, les conditions sèches du mois de septembre et l'absence de pluies prévues pour les 15 prochains jours découragent les semis encore non-réalisés (25 à 75 % de semis non-réalisés selon les secteurs), avec de premiers échos de retours de semence chez les fournisseurs.

Pour les quelques semis qui ont pu lever dans de bonnes conditions voient leur état de salissement être rapidement dégradé par la présence, parfois en nombre, d'adventices plutôt habituelles pour la culture (repousses de céréales notamment), mais aussi d'adventices estivales (sétaires, panic, parfois datura, xanthium, etc.), en lien avec les fortes chaleurs de cette fin d'été.

Avertissement :

Au regard du contexte particulièrement chaud et sec de l'été 2026, certaines espèces phytophages, dont les ressources alimentaires habituelles sont actuellement limitées dans leur habitat naturel, peuvent migrer vers les colzas, occasionnant par endroits d'importants dégâts. Il convient d'être particulièrement vigilant sur l'évolution de l'état physiologique des colzas dès la levée, et de signaler tout symptôme ou disparition de pieds suspecte auprès de votre technicien.

• Héliothis ou noctuelle de la tomate (*Helicoverpa armigera*)

D'importants dégâts provoqués par des larves d'Héliothis ont été signalés sur certaines parcelles situées en Dordogne, dans le Tarn et dans le Gers, plus précisément dans les secteurs de Seissan, Simorre et l'Isle-en-Dodon. La surveillance reste de mise pour les colzas en cours de levée n'ayant pas dépassés le stade 4-5 feuilles.

N'hésitez pas à alerter votre technicien en cas de doute sur l'origine d'un manque de peuplement ou de surface foliaire fortement impactée sur votre parcelle, en l'absence d'autres ravageurs connus (limaces, altises, etc.).



Larves d'Héliothis sur feuilles de Colza
(photos NOVASOL).

• Altises des crucifères ou Petites Altises (*Phyllotreta* sp.)

Les morsures sur plantes indiquent la présence de petites altises dans 1 parcelle sur 3. Elle indique des morsures sur plantes, à hauteur de 10 % de pieds touchés. Néanmoins, le taux de surface foliaire détruite n'excède pas 1 %.

Les signalements sont courants mais peu/pas d'attaque fulgurante sont remontées à ce jour.

Attention toutefois, l'évaluation du risque se fait sur plante, en prenant en compte le nombre de pieds avec morsures et la surface foliaire touchée. Ne pas protéger hâtivement une parcelle sans avoir atteint le seuil indicatif de risque. L'observation du ravageur peut être complétée par des relevés sur la cuvette jaune.

Soyez attentifs dans les bordures de parcelles et maintenez en place les repousses de colza dans les parcelles avoisinantes.



Cuvette jaune en situation
(photo Terres Inovia)

Période de risque : de la levée jusqu'au stade 3 feuilles compris.

Seuil indicatif de risque : 8 pieds sur 10 avec morsures et 25 % de la surface foliaire atteinte.

Evaluation du risque : **risque modéré dans les parcelles n'ayant pas dépassé le stade 3 feuilles. Nul dans les autres situations.**

Le ravageur est présent mais les attaques sont peu intenses. Cependant, au regard des conditions de levée et de développement de la culture, la surveillance reste de mise !

• Altise d'hiver ou Grosse altise (*Psylliodes chrysocephala*)

A date, quelques individus isolés peuvent être observés dans les cuvettes mais les conditions climatiques n'ont pas encore été favorables au déclenchement du vol. Le léger refroidissement actuel des températures et les remontées prévues les prochains jours sont susceptibles de déclencher de premiers vols.



Grosse altise sur colza
(photo Terres Inovia).

Période de risque : de la levée jusqu'au stade 4 feuilles compris.

Seuil indicatif de risque : 8 pieds sur 10 avec morsures et 25 % de la surface foliaire atteinte. 3 pieds sur 10 pour les levées tardives au-delà du 15/09.

Evaluation du risque : **risque modéré pour les semis tardifs peu vigoureux, n'ayant pas dépassés le stade 4 feuilles, faible pour les colzas ayant dépassé le stade de sensibilité.**

De premières captures en cuvette, mais pas ou peu de dégâts constatés en parcelle. Au regard des évolutions de températures en cours, et de la faible croissance des colzas en conditions sèches, il convient de surveiller attentivement les dynamiques de vol au cours des prochains jours, notamment pour les derniers semis en date !

• Limaces

Les conditions météorologiques sont globalement très défavorables au développement et à l'activité des limaces. Quelques morsures observées en parcelles, à des niveaux très faibles (1% de surface foliaire touchée).

Les conditions sèches prévues pour les 7 à 15 prochains jours limiteront grandement la pression exercée par ce ravageur.


Le risque limace est à moduler en fonction du stade, de la dynamique de croissance, de la conduite d'irrigation (attention en contexte d'arrosage au démarrage), de l'historique de la parcelle, des pratiques d'interculture, et de l'état de surface du sol (présence de résidus végétaux, de mottes, état de fermeture du sillon).

Période de risque : de la levée jusqu'au stade 3 feuilles compris.

Evaluation du risque : risque faible dans les parcelles n'ayant pas atteint le stade 3 feuilles. Nul pour les parcelles ayant dépassé ce stade.

Au regard des conditions météorologiques actuelles et des prévisions de pluies pour les 15 prochains jours, le risque demeure globalement faible. Les parcelles irriguées, motteuses, ou avec une quantité importante de résidus pailleux en surface nécessitent une surveillance renforcée.

Parcelles BSV observées du 2026-09-08 au 2026-09-15



Piege enterre : Nb d'altises d'hiver (grosses altises) : ● [0-0] ● [0-2]

- Tenthrède de la rave**

Des adultes peuvent être observés dans la cuvette jaune (sans danger direct, indique la présence du ravageur dans la parcelle). Aujourd'hui, aucun dégât n'est observé sur le réseau. Ce ravageur est à suivre jusqu'à l'atteinte du stade 6 feuilles.

Période de risque : de la levée jusqu'au stade 6 feuilles.

Seuil indicatif de risque : 25 % de la surface foliaire détruite par les larves de tenthrèdes.



Larve de tenthrède de la rave sur colza (photos Terres Inovia).



Tenthrèdes de la rave adultes en cuvette (photos Terres Inovia)

Evaluation du risque : risque nul à ce jour.

A ce jour, pas d'attaque. Surveillez vos parcelles jusqu'au stade 6 feuilles. Soyez vigilant et très réactif en cas de pullulation.

• **Autres ravageurs**

Taupins

Des signalements ponctuels hors réseau (Pyrénées Atlantiques, Tarn), difficilement quantifiables au regard du caractère très localisé et irrégulier des attaques. Certains facteurs peuvent aggraver les risques d'attaques (précédent jachère ou prairie, sols très riches en MO, attaques au cours des 3-4 dernières campagnes, etc.)

N'hésitez pas à alerter votre technicien en cas de doute sur l'origine d'un manque de peuplement sur certaines zones de votre parcelle.

Fourmis

Ici aussi, des signalements ponctuels hors réseau (Tarn, Dordogne), difficilement quantifiables au regard du caractère très localisé des attaques.

Annexe – Notes nationales Biodiversité – BSV (*cliquer sur les images*)



Annexe - Reconnaissance des stades du colza à l'automne



A- Stade cotylédonaire - stade A (10)

Levée : les jeunes plantes marquent la ligne.
Pas de feuilles "vraies".
Seuls les deux cotylédons sont visibles.




B- Formation de la rosette - stades B1 et B4

Stade B : apparition des feuilles.
Pas d'entre-nœuds entre les pétioles. Absence de vraie tige.
Stade B1 (11) : 1 feuille vraie étalée ou déployée (*voir ci-contre*).
Stade B2 (12) : 2 feuilles vraies étalées ou déployées.
Stade B3 (13) : 3 feuilles vraies étalées ou déployées.
Stade B4 (14) : 4 feuilles vraies étalées ou déployées (*voir ci-contre*).
Stade Bn (1n) : n feuilles vraies étalées ou déployées.
Jusqu'à B9 (19) ou davantage de feuilles étalées
ou fin de la formation de la rosette.

Cirphis - Les observations de la semaine

La tournée de ce lundi est résumée par la carte ci-dessous :



Niveaux de présence des chenilles et papillons Cirphis le 14 septembre 2026 (CA64).

• Observations

Situation sur le terrain

Des papillons ont été capturés sur quasiment l'ensemble du réseau : à ARZACQ-ARRAZIGUET (7), AYHERRE (4), BIDARRAY (49, piège TIPI), BRISCOUS (4), CAMBO-LES-BAINS (2), ESQUIULE (1), GAMARTHE (2, piège TIPI), GARINDEIN (72, piège TIPI), IHDY (1), ITXASSOU (1), LA BASTIDE-CLAIRENCE (43, piège TIPI), LOUHOSSOA (3), MACAYE (2), et VIELLESEGURE (3).



**Papillon cirphis
(à ITXASSOU)
(CA64)**



**Chenille cirphis à un
stade avancé (5 cm)
(à HASPARREN)
(CA64)**

Les plus grosses captures sont observées dans des pièges TIPI (plus gros et réputés plus efficaces en termes de prises que les pots pièges classiques).

Des chenilles ont été observées en faible densité (2/m²) à ARETTE, AYHERRE et GARINDEIN. Des chenilles en densité plus importante ont été vues à LASSEUBE (hors-réseau) et aux alentours de GARINDEIN (hors-réseau).

Des traces de morsures sont présentes, là aussi, sur l'ensemble du réseau : à ARBONNE, ARETTE, AYHERRE, BRISCOUS, CAMBO-LES-BAINS, ESQUIULE, GARINDEIN, HASPARREN, IHDY, LOUHOSSOA, JUXUE, MACAYE, SAINT-PEE-SUR-NIVELLE et VIELLESEGURE.

• Informations

Les températures plus fraîches la nuit rendent les conditions plus favorables au développement des cirphis. Les graminées estivales qui ont reverdi dans certaines prairies restent attractives pour abriter les pontes des papillons et fournir de la nourriture aux chenilles.

Pour le moment, la densité de chenilles est faible sur la majorité du réseau (le seuil d'alerte étant à 10 chenilles/m² en conditions non poussantes, et 20/m² en conditions poussantes). Mais nous sommes dans la période habituelle des fortes attaques.

Au vu des conditions et des observations hors-réseau, il est essentiel de continuer à surveiller les prairies sensibles tous les 2 à 3 jours. Pour repérer les cirphis au plus tôt, profitez des restes d'orages et/ou de la pluie matinale (lorsqu'il y en a !) pour marcher dans les prés : les chenilles, surtout les toutes petites, se collent aux chaussures. Les vols d'étourneaux peuvent aussi être un indicateur d'une éventuelle présence de chenilles plus âgées. Enfin, les crottes de chenilles (petits cubes noirs, souvent dans des pieds de dactyle) indiquent la présence de ces dernières.

Les zones de prairies composées de multiples espèces sont habituellement moins touchées, contrairement à celles majoritairement pourvues de dactyle.

Le piétinement, le fauchage et l'application de Bt, en cas de présence avérée de chenilles encore jeunes (moins de 15 mm), permettent de limiter leur présence.

• Critères de reconnaissance

D'une envergure de 3 cm environ, le papillon est identifiable par sa tache blanche sur ses ailes brun-acajou.

La chenille possède quant à elle des couleurs variables, selon son stade de développement et son régime alimentaire. Elle est toutefois reconnaissable grâce à ses trois lignes longitudinales dorsales blanchâtres et sa bande longitudinale latérale jaune. Elle a un aspect lisse et sans poil, et elle s'enroule lors d'un stress (lorsqu'on la touche par exemple).



Cirphis (*Mythimna unipuncta*) aux stades adultes et larvaires. (CA64)

• Se tenir informé

- site internet de la Chambre d'agriculture (<https://pa.chambres-agriculture.fr/sinformer/produire-et-innover/herbe-et-fourrages/cirphis>)
- presse hebdomadaire agricole (Le Sillon : <https://www.lesillon.info/>)
- affichage dans les coopératives agricoles
- Facebook (groupe Prairies.64).

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine Grandes cultures / Edition Aquitaine sont les suivantes : Act'Agro, AREAL, ARVALIS Institut du Végétal, ASTRIA64, CDA 24, CDA 33, CDA 40, CDA 47, CDA 64, CETA de Guyenne, Terres Inovia, Terres conseils, Ets Sansan, Euralis, FREDON 64, FREDON Nouvelle-Aquitaine, GRCETA SFA, Groupe Maisadour, La Périgourdine, Lur Berri, SCAR, Sodepac, Groupe Terres du Sud, Viti Vista

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).