



N°25
24/09/2026



Animateurs filières

Céréales à paille / Maïs

Philippe MOUQUOT / **CDA 33**
p.mouquot@gironde.chambagri.fr

Suppléance : ARVALIS
t.sidisaid@arvalis.fr
a.peyhorgue@arvalis.fr

Oléagineux

Quentin LAMBERT / **Terres Inovia**
q.lambert@terresinovia.fr

Prairies

Marie-Claude MAREAUX / **CDA 64**
mc.mareaux@pa.chambagri.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre Régionale
Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

Supervision site de Poitiers

La stratégie

écophyto 2030

Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

**Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.**

**Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Grandes
cultures N°X du JJ/MM/AA »**

Edition **Aquitaine**

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT**
en cliquant sur [formulaire d'abonnement au BSV](#)

Ce qu'il faut retenir

Colza

- **Petites altises** : risque faible à modéré pour les parcelles n'ayant pas atteint le stade 3 feuilles, nul ailleurs. Quelques piqûres, mais peu de dégâts signalés à ce jour, que ce soit dans ou en dehors du réseau.
- **Grosse altise** : risque faible à ce jour dans les parcelles n'ayant pas atteint le stade 4 feuilles, nul ailleurs !
- **Limaces** : risque faible pour les colzas n'ayant pas dépassé le stade 3 feuilles. Au regard des conditions météorologiques actuelles et des prévisions de pluies pour les 15 prochains jours, le risque demeure globalement faible.
- **Héliothis** : risque fort vis-à-vis des larves pour les parcelles en cours de levée, jusqu'au stade 3-4 feuilles. Des remontées hors réseau signalent des dégâts importants, à l'origine de possible re-semis ou retournement de parcelles.
Des dégâts de taupins, fourmis et vers gris sont aussi régulièrement observés en parcelle.

Annexes :


Reconnaissance des stades du colza à l'automne
Fiche ambrosie



ANALYSE DE RISQUE ELABOREE A L'ECHELLE DU TERRITOIRE OUEST OCCITANIE

Parcelles BSV observées du 2026-09-08 au 2026-09-15

Le réseau d'observations colza de la Surveillance Biologique du Territoire (SBT) est en cours de construction. L'élaboration de l'analyse de risque 2026-2027 est établie sur les territoires Aquitaine et Ouest-Occitanie à partir de parcelles fixes qui font l'objet d'observations hebdomadaires. Cette semaine, l'analyse de risque est établie à partir de **10 parcelles observées**.



Vous êtes agriculteur, conseiller agricole, etc. ? La surveillance de l'état sanitaire et la performance du colza vous intéresse ?

Alors n'hésitez plus, intégrez le réseau BSV en Aquitaine et Midi-Pyrénées/Ouest-Audois et **devenez observateur colza** !



Demandez plus d'information à vos animateurs filières Terres Inovia : q.level@terresinovia.fr pour les départements 24, 32, 33, 40, 47, 64, 65 ou

q.lambert@terresinovia.fr pour les départements 09, 11, 12, 31, 46, 81, 82.

• Stades phénologiques et état des cultures

Du fait de dates de semis très éparées selon les secteurs (précocité des préparations de sols, cumuls de pluies au cours des mois d'août et de septembre), les stades s'étalent de levée en cours à B5 (BBCH 15 : 5 feuilles vraies étalées ou déployées) à l'échelle du réseau. Le faible nombre de remontées d'observations ne permet pas de définir de manière représentative la répartition des stades en présence. Les stades évoluent peu cette semaine.

Alors que les intentions de semis sont fortes et croissantes pour la culture de colza depuis maintenant 2 ans, le démarrage de la campagne 2027 est marqué par des conditions de semis et de levée globalement défavorables, voire très défavorables dans les secteurs n'ayant pas ou peu bénéficié des pluies d'orages du mois d'août et de début septembre. Si certaines parcelles ont pu être semées autour de la mi- ou de la fin-août, grâce à une préparation suffisamment précoce, une profondeur de semis maîtrisée (3 cm) et à des averses significatives (les parcelles présentant le meilleur état de développement à ce jour), d'autres ont été semées en conditions sèches ou insuffisamment réhumectées, et/ou à des profondeurs aléatoires (2 à plus de 5 cm), source de levées retardées, hétérogènes, et/ou d'échaudage au regard de conditions chaudes et sèches de début-septembre. A l'inverse, en sols limoneux, la réalisation de semis en amont de pluies d'orages localisées et significatives a pu entraîner des phénomènes de battance, dégradant les conditions de levée de la culture. Enfin, les conditions sèches du mois de septembre et l'absence de pluies prévues pour les 15 prochains jours découragent les semis encore non-réalisés (25 à 75% de semis non-réalisés selon les secteurs), avec de premiers échos de retours de semence chez les fournisseurs.

Les quelques semis qui ont pu lever dans de bonnes conditions voient leur état de salissement être rapidement dégradé par la présence, parfois en nombre, d'adventices plutôt habituelles pour la culture (repousses de céréales notamment), mais aussi d'adventices estivales (sétaires, panic, parfois datura, xanthium, etc.), en lien avec les fortes chaleurs de cette fin d'été.

Avertissement :

Au regard du contexte particulièrement chaud et sec de l'été 2026, certaines espèces phytophages, dont les ressources alimentaires habituelles sont actuellement limitées dans leur habitat naturel, peuvent migrer vers les colzas, occasionnant par endroits d'importants dégâts. Il convient d'être particulièrement vigilant sur l'évolution de l'état physiologique des colzas dès la levée et de signaler tous symptômes ou disparition de pieds suspecte auprès de votre technicien.

• Héliothis ou noctuelle de la tomate (*Helicoverpa armigera*)

Les retours de dégâts sont toujours importants cette semaine. D'importants dégâts provoqués par des larves d'Héliothis ont été signalés sur certaines parcelles situées en Dordogne, en Haute-Garonne, dans l'Aude, le Tarn et le Gers. La surveillance reste de mise pour les colzas en cours de levée n'ayant pas dépassés le stade 4-5 feuilles.

N'hésitez pas à alerter votre technicien en cas de doute sur l'origine d'un manque de peuplement ou de surface foliaire fortement impactée sur votre parcelle, en l'absence d'autres ravageurs connus (limaces, altises, etc.).



Larves d'Héliothis sur feuilles de Colza
(photos NOVASOL).

Evaluation du risque : risque fort, surveillez vos parcelles.

• Autres ravageurs

Taupins

Des signalements ponctuels hors réseau (Pyrénées Atlantiques, Tarn), difficilement quantifiables au regard du caractère très localisé et irrégulier des attaques. Certains facteurs peuvent aggraver les risques d'attaques (précédent jachère ou prairie, sols très riches en MO, attaques au cours des 3-4 dernières campagnes, etc.)

N'hésitez pas à alerter votre technicien en cas de doute sur l'origine d'un manque de peuplement sur certaines zones de votre parcelle.

Fourmis

Ici aussi, des signalements ponctuels hors réseau (Haute-Garonne, Aude, Tarn, Dordogne), difficilement quantifiables au regard du caractère très localisé des attaques.

Vers gris

Des dégâts très localisés sont remontées sur le territoire

- **Altises des crucifères ou Petites Altises (*Phyllotreta* sp.)**

Les morsures sur plantes indiquent la présence de petites altises dans près d'une parcelle sur trois. Elle indique des morsures sur plantes, à hauteur de 10 % en moyenne de pieds touchés. Néanmoins, le taux de surface foliaire détruite n'excède pas 8 %.

Les signalements sont courants mais peu/pas d'attaques fulgurantes sont remontées à ce jour.

Attention toutefois, l'évaluation du risque se fait sur plante, en prenant en compte le nombre de pieds avec morsures et la surface foliaire touchée. Ne pas protéger hâtivement une parcelle sans avoir atteint le seuil indicatif de risque. L'observation du ravageur peut être complétée par des relevés sur la cuvette jaune.

Soyez attentifs dans les bordures de parcelles et maintenez en place les repousses de colza dans les parcelles avoisinantes.



Cuvette jaune en situation
(photo Terres Inovia)

Période de risque : de la levée jusqu'au stade 3 feuilles compris.

Seuil indicatif de risque : 8 pieds sur 10 avec morsures et 25 % de la surface foliaire atteinte.

Evaluation du risque : risque modéré dans les parcelles n'ayant pas dépassé le stade 3 feuilles. Nul dans les autres situations.

Le ravageur est présent mais les attaques sont peu intenses. Cependant, au regard des conditions de levée et de développement de la culture, la surveillance reste de mise !

- **Altise d'hiver ou Grosse altise (*Psylliodes chrysocephala*)**

Comme la semaine dernière, quelques individus isolés peuvent être observés dans les cuvettes mais les conditions climatiques n'ont pas encore été favorables au déclenchement du vol. A ce jour, il n'est pas prévu de refroidissement des températures susceptible de déclencher de premiers vols.

Période de risque : de la levée jusqu'au stade 4 feuilles compris.

Seuil indicatif de risque : 8 pieds sur 10 avec morsures et 25 % de la surface foliaire atteinte. 3 pieds sur 10 pour les levées tardives au-delà du 15/09.



Grosse altise sur colza
(photo Terres Inovia).

Evaluation du risque : risque modéré pour les semis tardifs peu vigoureux, n'ayant pas dépassé le stade 4 feuilles. Risque nul pour les colzas ayant dépassé le stade de sensibilité.

De premières captures en cuvette, mais pas ou peu de dégâts constatés en parcelle. Au vu de la faible croissance des colzas en conditions sèches, il convient de surveiller attentivement les dynamiques de vol au cours des prochaines semaines, notamment pour les derniers semis en date!

- **Limaces**

Les conditions météorologiques sont globalement très défavorables au développement et à l'activité des limaces. Quelques morsures observées en parcelles, à des niveaux très faibles (inférieur à 1% de surface foliaire touchée).

Les conditions sèches prévues pour les 7 prochains jours limiteront grandement la pression exercée par ce ravageur. Attention lors du retour des pluies !

Le risque limace est à moduler en fonction du stade, de la dynamique de croissance, de la conduite d'irrigation (attention en contexte d'arrosage au démarrage), de l'historique de la parcelle, des pratiques d'interculture, et de l'état de surface du sol (présence de résidus végétaux, de mottes, état de fermeture du sillon).

Période de risque : de la levée jusqu'au stade 3 feuilles compris.

Evaluation du risque : risque faible dans les parcelles n'ayant pas atteint le stade 3 feuilles. Nul pour les parcelles ayant dépassé ce stade.

Au regard des conditions météorologiques actuelles et des prévisions de pluies pour les 7 prochains jours, le risque demeure globalement faible. Les parcelles irriguées, motteuses, ou avec une quantité importante de résidus pailleux en surface nécessitent une surveillance renforcée.

- **Tenthrede de la rave**

Des adultes peuvent être observés dans la cuvette jaune (sans danger direct, indique la présence du ravageur dans la parcelle). Aujourd'hui, aucun dégât n'est observé sur le réseau. Ce ravageur est à suivre jusqu'à l'atteinte du stade 6 feuilles.

Période de risque : de la levée jusqu'au stade 6 feuilles.

Seuil indicatif de risque : 25 % de la surface foliaire détruite par les larves de tenthrèdes.



Larve de tenthrède de la rave sur colza (photos Terres Inovia).

Tenthredes de la rave adultes en cuvette (photos Terres Inovia)



Evaluation du risque : risque nul à ce jour.

A ce jour, pas d'attaque. Surveillez vos parcelles jusqu'au stade 6 feuilles. Soyez vigilant et très réactif en cas de pullulation.

Annexe – Notes nationales Biodiversité – BSV (cliquer sur les images)



Annexe - Reconnaissance des stades du colza à l'automne



A- Stade cotylédonaire - stade A (10)
 Levée : les jeunes plantes marquent la ligne.
 Pas de feuilles "vraies".
 Seuls les deux cotylédons sont visibles.



B- Formation de la rosette - stades B1 et B4
 Stade B : apparition des feuilles.
 Pas d'entre-nœuds entre les pétioles. Absence de vraie tige.
 Stade B1 (11) : 1 feuille vraie étalée ou déployée (voir ci-contre).
 Stade B2 (12) : 2 feuilles vraies étalées ou déployées.
 Stade B3 (13) : 3 feuilles vraies étalées ou déployées.
 Stade B4 (14) : 4 feuilles vraies étalées ou déployées (voir ci-contre).
 Stade Bn (1n) : n feuilles vraies étalées ou déployées.
 Jusqu'à B9 (19) ou davantage de feuilles étalées
 ou fin de la formation de la rosette.