



**FLASH
PRAIRIE
01/09/2026**



Animateurs filières

Céréales à paille / Maïs
Philippe MOUQUOT / CDA 33
p.mouquot@girond.chambagri.fr

Suppléance : ARVALIS
t.sidisaid@arvalis.fr

Oléagineux
Quentin LAMBERT / Terres Inovia
q.lambert@terresinovia.fr

Prairies
Marie-Claude MAREAUX / CDA 64
mc.mareaux@pa.chambagri.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre Régionale Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

Supervision site de Poitiers

La stratégie écophyto 2030

Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

**Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.
Reproduction partielle
autorisée avec la mention
« extrait du bulletin de
santé du végétal Nouvelle-
Aquitaine Grandes
cultures N°X du
JJ/MM/AA »**

Edition **Aquitaine**

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT**
en cliquant sur [formulaire d'abonnement au BSV](#)


Ce qu'il faut retenir

Prairies :

- Les vols de papillons – modérés - continuent.
- Des chenilles sont présentes en faible densité à **AYHERRE, BIDARRAY, BRISCOUS, GARINDEIN, JUXUE et SAINT-PEE-SUR-NIVELLE.**
- Il est nécessaire de continuer à faire le tour des prairies sensibles tous les 2 à 3 jours.

Cirphis - Les observations de la semaine

La tournée de ce lundi est résumée par la carte ci-dessous :



Niveaux de présence des chenilles et papillons Cirphis le 31 août 2026 (CA64).

• Observations

Situation sur le terrain

Des papillons ont été capturés à BOSDARROS (11), et en plus faible nombre à ARZACQ-ARRAZIGUET (6), BIDARRAY (3), GAMARTHE (17), GARINDEIN (1), JUXUE (5), LA BASTIDE-CLAIRENCE (4), LASSEUBE (2), LOUHOSSOA (2), MACAYE (1), ROQUIAGUE (4) et VIELLESEGURE (1).

Des chenilles à un stade larvaire avancé ont été vues en faible densité ($<1/m^2$) à BIDARRAY, HASPARREN, JUXUE et SAINT-PEE-SUR-NIVELLE.

Des larves plus jeunes ont été observées, aussi en faible densité, à AYHERRE ($3/m^2$) et à BRISCOUS ($1/m^2$).

Des traces de morsures sont présentes à sur plusieurs sites, tous secteurs géographiques du réseau.



Chenille cirphis à un stade avancé (4 cm) (à AYHERRE) (CA64)



Chenille cirphis à un stade jeune (2 cm) (à AYHERRE) (CA64)

• Informations

Les températures plus fraîches et l'humidité nocturnes rendent les conditions plus favorables au développement des cirphis. Les graminées estivales qui ont reverdi dans certaines prairies restent attractives pour abriter les pontes des papillons et fournir de la nourriture aux chenilles.

Les vols sont en cours, les pontes probablement aussi. Pour le moment, la densité de chenilles est faible (le seuil d'alerte étant à $10 \text{ chenilles}/m^2$ en conditions non poussantes, et $20/m^2$ en conditions poussantes). Mais on a vu par le passé que le fait d'avoir des prairies grillées n'empêchait pas les pullulations soudaines. Or on se rapproche de la période habituelle de fortes attaques. Il importe donc, en ce moment et malgré la situation de sec, de se mettre en mode « tour des prairies sensibles » tous les 2 à 3 jours.

Pour repérer les cirphis au plus tôt, profitez des restes d'orages et/ou de la pluie matinale (lorsqu'il y en a !) pour marcher dans les prés : les chenilles, surtout les toutes petites, se collent aux chaussures. Les vols d'étourneaux peuvent aussi être un indicateur d'une éventuelle présence de chenilles plus âgées. Enfin, les crottes de chenilles (petits cubes noirs, souvent dans des pieds de dactyle) indiquent la présence de ces dernières.

Les zones de prairies composées de multiples espèces sont habituellement moins touchées, contrairement à celles majoritairement pourvues de dactyle.

Le piétinement, le fauchage et l'application de Bt, en cas de présence avérée de chenilles encore jeunes (moins de 15 mm), permettent de limiter leur présence.

• Critères de reconnaissance

D'une envergure de 3 cm environ, le papillon est identifiable par sa tache blanche sur ses ailes brun-acajou.

La chenille possède quant à elle des couleurs variables, selon son stade de développement et son régime alimentaire. Elle est toutefois reconnaissable grâce à ses trois lignes longitudinales dorsales blanchâtres et sa bande longitudinale latérale jaune. Elle a un aspect lisse et sans poil, et elle s'enroule lors d'un stress (lorsqu'on la touche par exemple).



Cirphis (*Mythimna unipuncta*) aux stades adultes et larvaires. (CA64)

• Se tenir informé

- site internet de la Chambre d'agriculture (<https://pa.chambres-agriculture.fr/sinformer/produire-et-innover/herbe-et-fourrages/cirphis>)
- presse hebdomadaire agricole (Le Sillon : <https://www.lesillon.info/>)
- affichage dans les coopératives agricoles
- Facebook (groupe Prairies.64).

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine Grandes cultures / Edition Aquitaine sont les suivantes : Act'Agro, AREAL, ARVALIS Institut du Végétal, ASTRIA64, CDA 24, CDA 33, CDA 40, CDA 47, CDA 64, CETA de Guyenne, Terres Inovia, Terres conseils, Ets Sansan, Euralis, FREDON 64, FREDON Nouvelle-Aquitaine, GRCETA SFA, Groupe Maisadour, La Périgourdine, Lur Berri, SCAR, Sodepac, Groupe Terres du Sud, Viti Vista

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).