



BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL de Bourgogne-Franche-Comté



SOMMAIRE

P. 1 Météo

P. 2 Biodiversité et santé des agrosystèmes

P. 3 Colza

A RETENIR

Colza :

- Croissance des colzas mise en difficulté par le manque d'eau. Densités de peuplement parfois très faibles.
- Intensification du vol de grosses altises mais dégâts foliaires encore inférieurs aux seuils. Maintenir une surveillance active d'autant plus si les colzas sont peu développés.

METEO

Prévisions à 7 jours :

MARDI 29	MERCREDI 30	JEUDI 01	VENDREDI 02	SAMEDI 03	DIMANCHE 04	LUNDI 05
						
14° / 29°	17° / 27°	17° / 23°	12° / 24°	11° / 24°	13° / 22°	12° / 21°
► 25 km/h 55 km/h	▲ 20 km/h 40 km/h	▲ 10 km/h	► 10 km/h	↻ 5 km/h	► 5 km/h	► 10 km/h

(Source : Météo France, Sevrey (71100), 29/09/2026 à 10h00. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))

Biodiversité et santé des agrosystèmes

Toutes les fiches biodiversité et santé des agrosystèmes ainsi que les fiches réglementaires sont disponibles sur le site de la Chambre régionale de Bourgogne Franche-Comté.

Biodiversité et santé des agrosystèmes

Ces notes biodiversité visent à accompagner la démarche agroécologique portée par le bulletin de santé du végétal.





COLZA

RESEAU 2026 - 2027

Cette semaine, le BSV a été rédigé à partir des observations réalisées dans 77 parcelles..


Stade

En l'absence de pluie significative, la situation se répète de semaine en semaine : colzas peu poussants, pieds qui dessèchent dans certaines parcelles, attaques de punaises dans d'autres... En pleine après-midi, il n'est pas rare de voir des plantes faner.

Les stades restent hétérogènes, de la « levée en cours » pour les derniers (re)semés jusqu'au stade 8-9 feuilles pour les parcelles semées précocement et ayant bénéficié de cumuls de pluie plus généreux (Est BFC). La majorité des colzas se situe toutefois entre 3 et 6 feuilles. La moitié des parcelles a dépassé le stade 4 feuilles et sont donc moins exposées aux grosses altises.

Des ressemis ont eu lieu, avec plus ou moins de réussite ...

Les retournements de parcelles débutent, notamment dans l'Yonne.



Au-delà de la croissance des plantes, le sec a localement fortement impacté le peuplement. Les comptages de cette semaine font état d'une densité comprise entre 4,5 et 34 plantes / m².



Colza fané
E. Courbet - CA70

Mise en œuvre des pièges

Pièges à limaces : voir BSV précédents

Les cuvettes jaunes : voir BSV précédents

Ravageurs


Altises d'hiver (ou grosse altise)

Elles sont plus grosses que les altises des crucifères et se reconnaissent facilement avec leurs pattes en forme de « cuisses de grenouilles ».

Les dégâts occasionnés sont actuellement des dégâts liés aux adultes qui se nourrissent des jeunes feuilles de colza. Ces dégâts sont similaires à ceux des petites altises.

a. Observations :

Le vol des grosses altises continue de s'intensifier. 54 parcelles sur 65 font état de leur présence dans les cuvettes jaunes enterrées. Les populations capturées sont encore en hausse, avec une moyenne de 22 individus. La pression semble notamment importante en Côte d'Or et dans l'Yonne.




Captures de grosses altises dans les cuvettes enterrées entre le 23 et le 29 septembre 2026.



Morsures de grosses altises

G. Frémont - CA89



Les morsures observées sur feuilles peuvent être inféodées aux grosses altises comme aux petites altises. Les dégâts sont en augmentation en termes de fréquence et d'intensité par rapport à la semaine dernière. Cependant aucune parcelle du réseau n'atteint les seuils indicatifs de risque.

b. Période de risque (dégâts des adultes) :

Depuis la levée jusqu'au stade 3 feuilles inclus.

c. Seuil indicatif de risque :

8 pieds sur 10 portants des morsures **et** 25 % de la surface foliaire détruite.

d. Analyse du risque :

Pour les parcelles ayant moins de 4 feuilles et où des individus sont capturés, le risque est **assez fort**. Le suivi des dégâts foliaires est indispensable.



Pour les parcelles encore sans captures et à moins de 4 feuilles, le risque est **faible à moyen** pour le moment. La surveillance reste de mise.



Pour les parcelles qui ont plus de 4 feuilles, le risque est **faible**.



Une large majorité des grosses altises du colza en région Bourgogne-Franche-Comté présente des résistances aux pyréthréinoïdes.

Il n'existe aucun moyen de lutte chimique contre les grosses altises adultes dans ces secteurs.

Altises des crucifères ou petites altises

Voir BSV précédents.

La vigilance doit se porter en priorité en bordure de parcelle.

Dans les zones où des repousses de colza sont présentes, la destruction de celles-ci entraîne un déplacement de population, et donc augmente le risque.


Punaises des céréales

Les années chaudes et sèches, ces petites punaises peuvent attaquer les jeunes colzas en cours de levée, **sans solution de lutte identifiée à ce jour**. Seul le retour des précipitations peut contribuer à limiter et disperser les populations présentes.

Symptômes : flétrissement rapide, dessèchement, disparition des pieds. Les foyers sont souvent localisés en bordure de parcelles.

Observations : Les attaques de punaises continuent d'être signalées à travers la région. Les dégâts concernent principalement les bordures de parcelles, mais les populations peuvent localement progresser vers l'intérieur et occasionner des destructions sur des surfaces parfois très importantes.

Déclaration des dégâts : [Enquête sur les punaises s'attaquant au colza | Terres Inovia](#)



Dégâts de punaises

C. Dieudonné - Seine Yonne

Limaces

Voir BSV précédents

3 parcelles rapportent la présence de traces : moins de 2 % de surface foliaire détruite.

Charançon du bourgeon terminal (CBT)

Coléoptère de 2,5 à 3,7 mm de long. De couleur noire, brillant, avec l'extrémité des pattes rousses et présence d'une tache dorsale blanche.

a. Observations :

Quelques individus ont été capturés dans 3 parcelles (Yonne et Côte d'Or).

b. Période de risque :

Du développement des premières larves jusqu'au décollement du bourgeon terminal. La lutte contre les larves étant impossible, c'est l'arrivée des adultes qui va déclencher le début de la période de risque. La cuvette jaune (positionnée au-dessus de la végétation) est indispensable pour effectuer ce piégeage. Les vols de CBT peuvent avoir lieu de fin septembre jusqu'à l'entrée de l'hiver.

Pour garantir une observation fiable, il est indispensable que le bas des cuvettes soit positionné au niveau de la végétation et qu'elle soit de couleur vive. C'est la vision du « jaune » qui attire les CBT !

Terres Inovia a développé un outil pour prédire les vols de CBT : <https://www.terresinovia.fr/fr/oad/prediction-des-vols-de-ravageurs>

c. Analyse du risque :

Risque **faible** actuellement.



La gestion du risque CBT sur colza doit prendre en compte les phénomènes de résistances aux pyréthrinoides.

Autres ravageurs

Localement, la présence de noctuelles ou de tenthrèdes, ainsi que de pucerons vert est parfois signalée, avec une pression variable.

Fourmis et criquet sont aussi parfois significativement présents.

Adventices

Les graminées occasionnent des pertes de pieds dans les situations où elles n'ont pas été gérés (derrière les andains de moissonneuse par exemple). Avec la sécheresse, la concurrence est d'autant plus forte cette année.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté et rédaction animée par ARVALIS-Institut du Végétal, Terres Inovia et les Chambres d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté.



Bulletin édité à partir des observations réalisées par :



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux-mêmes réalisées sur leurs parcelles ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques de leurs conseillers.