

Sommaire

[Données météo P2](#)

[Colza](#)

[P2/P7](#)

Légende :



Risque global très faible



Risque global très fort



Prophylaxie



Biocontrôle



Résistance

Avec le soutien financier de



Financé dans le cadre de la stratégie **écophyto**

GOVERNEMENT
Liberté
Égalité
Fraternité

**La stratégie
écophyto 2030**
Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

	Indicateur de risque	L'essentiel
Colza : Majoritairement entre les stades « cotylédons et deux feuilles ».		
Les altises	Cotylédons - 3F	Une hausse des dégâts est constatée mais sans dépassement du seuil. Cependant les conditions climatiques des prochains jours seront très favorables aux altises.
	Au-delà de 3F	
Les limaces		De rares dégâts ont été observés. Le retour du sec sera défavorable aux limaces.
Les pucerons du colza		Les pucerons sont très rarement observés.
Autres		Plusieurs parcelles avec des tenthrèdes adultes de capturés, peu de dégâts ont été observés pour le moment.
Maïs :		
• <u>Avant la récolte</u> : pensez à faire un sondage afin d'évaluer la pression exercée par les larves de pyrale et sésamie. • <u>Après la récolte</u> : pensez au broyage des résidus (cannes, collets,...) pour réduire la pression larvaire.		
Les plantes exotiques envahissantes : identifier et lutter contre le datura stramoine. Il est possible d'avoir des plants de datura levés pendant l'interculture après la récolte des céréales. Soyez vigilant. Consultez la note régionale Datura en cliquant ici		

ACTUS TECHNIQUES :

Cuvettes jaunes à poser dans les parcelles de colza.

Elles vous permettront de détecter l'arrivée de principaux ravageurs du colza dont les altises.

Pour bien la positionner, creuser un trou de telle sorte que le bord de la cuvette soit au niveau du sol.



Plus de détails sur le site de Terres-inovia. « [La cuvette jaune le piège incontournable](#) ». [Cliquez-ici](#)

ACTU SANITAIRE :

Les punaises des champs :

Elles pullulent et elles peuvent provoquer des dégâts sur des jeunes colzas. Aucune solution phytopharmaceutique n'est actuellement homologuée contre ce ravageur.

Dans ce contexte, une enquête est menée par Terres Inovia afin de mieux comprendre le ravageur. Pour y répondre : [enquête punaise - cliquez ici](#)



ACTU BIODIVERSITE :



Données météo

[Retour sommaire](#)


Stations météo		Températures moyennes en °C août (Normales)	Températures moyennes en °C 1-15 septembre (Normales)	Précipitations Cumul en mm août (Normales)	Précipitations Cumul en mm 1-15 septembre (Normales)
Ille-et-Vilaine	Rennes	22.1 (19.2)	20.0 (16.6)	54.6 (43.5)	4.2 (56.6)
	Miniac-Morvan	20.7 (19.2)	19.0 (16.6)	14.0 (43.5)	9.0 (56.6)
	Langon	22.7 (19.2)	20.3 (16.6)	30.6 (43.5)	4.6 (56.6)
Finistère	Brest	19.4 (16.9)	17.4 (15.4)	49.8 (75.3)	23.3 (78.6)
	Landivisiau	19.1 (16.9)	17.5 (15.4)	43.6 (75.3)	18.5 (78.6)
	Quimper	20.7 (16.9)	18.4 (15.4)	37.6 (75.3)	11.3 (78.6)
Morbihan	St-Avé	22.5 (18.3)	19.8 (16.1)	43.0 (53.3)	3.0 (65.7)
	Neulliac	20.9 (18.3)	18.8 (16.1)	51.0 (53.3)	8.6 (65.7)
	Taupont	21.9 (18.3)	20.2 (16.1)	30.4 (53.3)	2.0 (65.7)
Côtes-d'Armor	St Brieuc	19.9 (17.4)	18.6 (15.5)	26.9 (44.5)	6.8 (52.4)
	Louargat	18.8 (17.4)	17.6 (15.5)	31.2 (44.5)	9.8 (52.4)
	St Glen	20.2 (17.4)	18.7 (15.5)	37.7 (44.5)	9.2 (52.4)



Données météo, du 1^{er} août au 15 septembre 2026 : source MétéoData. Normales de saison : Source MétéoFrance.

Commentaire : Cette première quinzaine de septembre est similaire aux mois précédents. Les températures restent bien au-dessus des normales de saison, tandis que les précipitations demeurent faibles et inégalement réparties.

Colza

Stades

26 parcelles ont été suivies entre le 10 septembre et le 15 septembre 2026 (semaine 38).



Graphique 1: stades des parcelles de colza du réseau.

Carte 1: stades du colza observés entre le 10/09 et le 15/09.

Les colzas sont majoritairement entre les stades cotylédons et 2 feuilles. Par conséquent, les colzas sont sensibles aux dégâts des ravageurs.

Levée hétérogène des colzas, avec des stades variables intra parcellaire. Il faut observer ses parcelles.




Altise d'hiver (grosse altise) et altise des crucifères (petite altise)


• Observations issues des parcelles du réseau

Période de suivi	Nb parcelles suivies	Parcelles dans la période de risque (Cotylédons étalés - 3 feuilles vraies)			
		Nb parcelles dans la période de risque	Nb parcelles avec dégâts	Nb parcelles au seuil de risque	Dégâts moyens % pieds mordus - % surface foliaire détruite
10/09-15/09	26	19	18	0	64% - 4.7%
03/09-08/09	9	8	4	0	39% - 6.5%

Résultat des piégeages : 26 pièges ont été relevés cette semaine, 9 sont positifs. 42 grosses altises et 10 petites altises.



Carte 2 : parcelles observées pour les dégâts d'altises entre le 10/09 et le 15/09 (sem.38)



Graphique 2 : Dynamique de captures d'altises

• Analyse de risque et prévisions

Les dégâts sont en hausse, mais sans dépassement du seuil pour le moment. Les conditions climatiques chaudes et sèches actuelles risquent de ralentir la croissance des colzas semés début septembre. De plus, cette météo est favorable à l'activité des altises. Il convient de surveiller attentivement l'évolution des dégâts dans les parcelles qui n'ont pas encore atteint le stade 3 feuilles.

Risque global colza stade Cotylédons - 3F : moyen à fort.

Risque globale colza stade au-delà de 3 F : faible.

• Gestion du risque

Période de suivi et seuil indicatif de risque :

De levée à 3 feuilles (B3) inclus. 80% des pieds avec des morsures et 25% de la surface foliaire détruite.



La gestion des altises, petites comme grosses, se fait principalement par leur détection via les cuvettes jaunes puis par l'observation de l'évolution des dégâts.

Pour la grosse altise, il faut aussi tenir compte de la dynamique de pousse du colza aux tous premiers stades de développement et des conditions climatiques favorables ou non à une sortie rapide du colza de la période de sensibilité.

Pour la petite altise : Ne pas détruire vos repousses de colza des parcelles environnantes juste avant ou pendant la levée des colzas afin de limiter les déplacements de populations vers les parcelles en cours de levée.



Attention au risque de résistances aux pyréthrinoides. Plus de détails sur le site de [Terres inovia—les résistances au pyréthrinoides](#).



Pour vous aider dans la gestion du risque, il existe un Outil d'Aide à la Décision (OAD) pour estimer le risque lié aux prélèvements foliaires par les altises, pour des levées avant le 1er octobre. Cliquez sur l'icône à gauche ou retrouvez l'OAD sur [le site de Terres-inovia en cliquant-ici](#). Nécessite la création d'un compte et c'est gratuit !!

• Informations sur le ravageur

[Retour](#)
[sommaire](#)



Altises des crucifères (ou petites altises)

Description

Coléoptère de petite taille (2 à 2.5 mm) et de couleur noire ou bicolore (noir avec deux bandes longitudinales jaunes sur les élytres).



Dégâts

Ils sont liés à l'activité des adultes car la larve est totalement inoffensive. Ils se caractérisent par de multiples morsures circulaires de l'ordre de 1 à 2 mm de diamètre sur les cotylédons ou les jeunes feuilles.



Conditions et facteurs favorables

Surtout en période chaude et ensoleillée. Les repousses de colza ne doivent pas être détruites dans les parcelles environnantes pendant la levée des nouveaux colzas pour limiter les déplacements des populations d'une parcelle à l'autre.

Altises d'hiver (ou grosses altises)

Description

Gros coléoptère (de 3 à 5 mm) de couleur noir et brillant avec des reflets bleus sur le dos. Les fémurs de ses pattes postérieures sont renflés.



Dégâts (adultes et larves)

Les adultes provoquent des morsures circulaires, perforantes de quelques millimètres dans les cotylédons et les jeunes feuilles.

Les larves pénètrent dans les pétioles par les feuilles plus âgées. Elles peuvent ensuite parvenir jusqu'au bourgeon terminal.

Des dissections sont à réaliser en fin d'hiver afin de déterminer le taux éventuel d'attaque larvaire.



Conditions et facteurs favorables

Les altises d'hiver sortent de leur diapause estivale suite à un stimulus climatique, lorsque les températures baissent et remontent brutalement au-dessus de 20°C au cours du mois de septembre.

**Limace grise (*Deroceras reticulatum*) et limace noire (*Arion hortensis*)**• **Observations issues des parcelles du réseau**

Période de suivi	Nb parcelles suivies	Parcelles dans la période de risque (Cotylédons étalés - 3 feuilles vraies)		
		Nb parcelles dans la période de risque	Nb parcelles avec dégâts	Dégâts moyens (min-max) % surface foliaire détruite
10/09-15/09	17	14	3	5% (5%-5%)
03/09-08/09	7	7	0	0%

• **Analyse de risque et prévisions**

De rares dégâts. Le retour du sec sera défavorable aux limaces.

Risque global :



faible.

• **Gestion du risque**

Période de suivi et seuil indicatif de risque :

Du semis au stade 3 feuilles (B3). Il n'existe pas de seuil indicatif de risque.

Il est donc important de surveiller vos parcelles pour anticiper les dégâts avec l'observation des plantes et le piégeage.

L'évaluation du risque doit se baser sur différents éléments :


- la dynamique des populations de limaces (relever les pièges tous les 2 / 3 jours),
- l'activité des limaces sur plantes (évaluation de l'évolution des dégâts sur plantes),
- le stade du colza (risque accru à la levée),
- la vitesse de développement du colza (culture peu poussante plus sensible aux limaces),
- l'évaluation du risque parcellaire potentiel vis-à-vis des limaces [grâce à une grille, cliquez-ici](#)
- les conditions climatiques (températures douces et humidité),
- la présence ou non d'auxiliaires ([découvrez les fiches auxiliaires en cliquant-ici](#)), tels que [les carabes](#) ou [les staphylins](#).

B

Des produits de biocontrôles existent : par exemple ceux à base de phosphate ferrique.

• **Informations sur le ravageur****La limace grise**

Couleur rose violacé pour les jeunes et de couleur gris beige pour les adultes.
Taille au repos est de 4 à 5 cm.

**La limace noire**

Couleur gris bleuâtre pour les jeunes et de couleur noire pour les adultes.
Taille au repos est de 2.5 à 4 cm.

Article Terres-inovia sur [la gestion limace en cours de campagne - cliquez ici](#) et sur [l'estimation du risque - cliquez ici](#)



Pucerons du colza (*Puceron vert du pêcher, puceron du navet et le puceron cendré du chou*)

- **Observations issues des parcelles du réseau**

Sur les quinze parcelles du réseau qui ont été suivies pour ce ravageur, seule une a des pucerons verts sur 5% de ses plantes.

- **Analyse de risque et prévisions**

Les pucerons sont très rarement observés. Les conditions climatiques sont assez favorables.

Risque global colza stade Cotylédons - 3F:  **faible.**

- **Gestion du risque**

Période de suivi et seuil indicatif de risque :

Du semis au stade 6 feuilles (B6). Le seuil de risque est de 20% de plantes infestées pour les variétés non résistantes au virus du TUYV et qui n'ont pas dépassé le stade 6 feuilles. Pour rappel, le puceron vert du pêcher est le plus préjudiciable puisqu'il peut transmettre 3 virus.



La gestion du risque est principalement variétale mais aussi par la présence d'auxiliaire

- Afin de vérifier si votre variété présente une résistance au virus, consultez sa fiche sur [le site de myVar cliquez-ici](#).
- Les auxiliaires jouent un rôle non négligeable sur la gestion des pucerons ([découvrez les fiches auxiliaires en cliquant-ici](#)).



Attention au risque de résistances du puceron vert face aux pyrèthrinoïdes et au pyrimicarbe. Plus de détails sur le site de Terres inovia—les pucerons

- **Informations sur le ravageur**



Puceron vert du pêcher (aptère et ailé)



Puceron cendré du chou



Puceron du navet

Le puceron vert, le puceron cendré du chou et le puceron du navet peuvent coloniser le colza à l'automne. Les dégâts directs dus à la présence de ces insectes dans les cultures restent exceptionnels. Ces trois pucerons peuvent cependant transmettre des viroses, essentiellement, deux mosaïques (CaMV et TuMV) et une jaunisse (TuYV).

Le puceron vert du pêcher est le plus redouté. Plus de détails sur le site de Terres Inovia : [les pucerons—cliquez ici](#)



Autres signalements :

La tenthrède de la rave :

Ce ravageur a été observé dans dix parcelles réparties dans la région. Il s'agit principalement d'adultes qui ont été capturés. Des dégâts liés aux larves n'ont été observés que dans une seule parcelle située en Ile-et-Vilaine. Ces dégâts restent limités, avec 5 % de la surface foliaire touchée sur 15 % des plants.

Pour rappel : la période de sensibilité est du stade de la levée à 6 feuilles (B6). Le risque est atteint si plus d'1/4 de la surface foliaire est détruite par la larve.



Larve de tenthrède de la rave



Adulte de tenthrède de la rave

Maïs

Gestion du risque pyrale et sésamie en fin de saison



Méthodes prophylactiques :

- Avant la récolte : faites un sondage larvaire

Avant la récolte, il est souhaitable d'aller dans les parcelles de maïs pour y réaliser des sondages larvaires afin d'évaluer la pression exercée par les larves de pyrale et de sésamie. **Cette observation réalisée juste avant la récolte (septembre – octobre) permet de bien connaître la situation et de prévoir la pression éventuelle pour la prochaine campagne.**

Méthode d'observation :

Il faut prélever 5 pieds à suivre sur cinq placettes prises au hasard, les disséquer et dégager les épis. Les larves doivent être dénombrées sur ces 25 plantes.



Larve de pyrale (source Arvalis).

Les larves mesurent de 2-3 mm à 20 mm selon le stade larvaire. De couleur gris clair, elles présentent sur le dos une ligne longitudinale gris foncé.



Larve de sésamie (source Arvalis).

La chenille de longueur finale e 40 mm, est rose pâle. La présence de points noirs de chaque côté est caractéristique.

- Après la récolte : faite un broyage des cannes

Le broyage fin et au ras des cannes de maïs est fortement recommandé pour, notamment, détruire les larves de sésamie et de pyrale présentes à l'automne. L'enfouissement des résidus complètera le broyage en permettant une meilleure dégradation de ces résidus. Les larves sont très résistantes au froid. Mais, la pluie et les températures douces entraînent des développements de pathogènes sur les larves diapausantes, permettant aussi de diminuer les populations de sésamie et de pyrale.

Plantes exotiques envahissantes

[Retour
sommaire](#)


Le datura stramoine : *Datura stramonium*

Le datura stramoine (*Datura stramonium*) est en période de fructification. Ses grandes fleurs blanches et ses fruits sphériques, recouverts de nombreuses épines permettent de facilement l'identifier. Le risque sanitaire provient de sa consommation volontaire ou accidentelle. La totalité de la plante est toxique.



Plus de détails [sur le site de Fredon Bretagne—datura stramoine](#) et [sur écophyto—pic datura stramoine](#).
(photo : FREDON Bretagne)

Signaler la présence du datura sur [le site « alerte espèces » en cliquant-ici.](#)

L'ambrosie à feuilles d'armoïse : *Ambrosia artemisiifolia*

Ambrosia artemisiifolia est une plante dont le pollen est très allergisant. L'émission des grains de pollen a commencé en Bretagne depuis mi-août. Elle va se poursuivre jusqu'en octobre, passant par un maximum en septembre (pic pollinique).



Plus de détails sur [le site de Fredon Bretagne—ambrosie à feuille d'armoïse](#) et sur [écophyto—pic-ambrosie](#).

Signaler la présence d'ambrosie sur [le site « alerte espèces » en cliquant-ici.](#)

Ambrosie à feuilles d'armoïse en fleur
(photo : FREDON Bretagne)

PROCHAIN BSV: MARDI 22 SEPTEMBRE 2026

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations réalisées eux-mêmes dans leurs cultures et/ou sur les préconisations de bulletins techniques.

L'ensemble des observations contenues dans ce bulletin a été réalisées par les partenaires suivants :
CRA BRETAGNE, D2N, EAS, EUREDEN, FREDON BRETAGNE.

Rédigé par : FREDON Bretagne, 5, Rue A. de St Exupéry 35235 THORIGNE FOUILLARD.
Animateur Grandes Cultures—Damien Leclercq. Tél : 07 63 57 60 84

Direction de Publication : Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne, ZAC Atalante Champeaux 35 042 RENNES.
Contact : Françoise MAHEO. Animatrice inter-filières - Tél : 02 97 46 22 63

Comité de Relecture :
Arvalis, Chambres d'Agriculture de Bretagne, DRAAF-SRAL, FREDON Bretagne, Terres Inovia.

Vous pouvez retrouver l'ensemble des BSV Grandes Cultures sur les sites internet suivants :
La FREDON Bretagne : <https://fredon-bretagne.com/>
La Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne : <https://bretagne.chambres-agriculture.fr/>
La DRAAF Bretagne : <https://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/>

Pour recevoir gratuitement les BSV : inscrivez-vous sur le site de FREDON Bretagne : [Formulaire d'inscription](#)
Ou inscrivez-vous sur le site de la chambre d'agriculture de Bretagne : [Formulaire pour envoi de mail.](#)