



N° 32

15/09/26

A RETENIR (CTRL – CLIC POUR SUIVRE LE LIEN) :

Colza : semis réalisés, parcelles en cours de levée à 3 feuilles vraies. Faibles pressions petites et grosses altises. Quelques dégâts de limaces. Premiers signalements de pucerons verts. Présence de punaises localement.

Betterave : très forte dégradation des parcelles en raison des conditions climatiques toujours sèches, avec de nombreuses betteraves pourries, un feuillage très petit et donc des observations très complexes.

METEO

STATION DE LIEUSAIN (77)

	mar. 15	mer. 16	jeu. 17	ven. 18	sam. 19	dim. 20	lun. 21
	0	0	0	0	0	0	0
	23 / 79	38 / 86	39 / 86	35 / 83	44 / 74	44 / 90	38 / 100
	16 / 33	13 / 22	10 / 22	12 / 22	13 / 25	15 / 25	12 / 26

Source : Sencrop - Modèle : METEOBLUE

COLZA

17 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES

Les conditions sèches du mois d'août ont retardé le semis des parcelles de colza.

41% des parcelles sont au stade cotylédons et 18 % d'entre elles ne sont pas encore levées. Les parcelles restantes sont aux stades 1 à 3 feuilles.

Les levées sont hétérogènes dans les parcelles souffrant de l'état de sécheresse actuel.

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Région Île de France sur la base d'observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, il ne peut se substituer à une observation personnelle dans sa parcelle.

Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.


Pour vous abonner faites votre demande à ecophyto@idf.chambagri.fr en spécifiant la filière.

Financé dans le cadre
de la stratégie **ecophyto**

 **GOUVERNEMENT**
Liberté
Égalité
Fraternité



**La stratégie
ecophyto 2030**
Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos



RAVAGEURS

• Altises des crucifères (petites altises)



Des altises des crucifères ont été capturées dans 2 parcelles (11 pièges relevés) :

- 10 individus à Saint-Germain-Laxis (77) ;
- 8 individus à Villiers-Saint-Frédéric (78).

Des morsures d'altises sont observées dans 10 parcelles parmi les 13 observées :

Ville	Stade	% plantes porteuses de morsures
Jouy-le-Chatel (77)	B3	3 %
Saint-Germain-Laxis (77)	B2	5 %
Mondreville (78)	Pré-levée / cotylédons	1 %
Saint-Illiers-la-Ville (78)	A	5 %
Saint-Martin-de-Bréthencourt (78)	B3	35 %
Gironville-sur-Essonne (91)	A	35 %
Leudeville (91)	B1	10 %
Videlle (91)	Pré-levée / cotylédons	20 %
Attainville (95)	B1	8 %
Vallangoujard (95)	B2	5 %

82 % des parcelles du réseau sont au stade de sensibilité aux morsures d'altises. En moyenne, 9,7 % des plantes présentent des morsures. La surface foliaire détruite reste cependant faible : au maximum 5 % à Jouy-le-Chatel (77) et Attainville (95).

Il n'y a aucune parcelle qui dépasse le seuil indicatif de risque.

A RETENIR

Risque : faible.

Stade de sensibilité : de la levée au stade 3 feuilles.


Seuil indicatif de risque : 8 pieds / 10 avec morsures et 25 % de surface foliaire atteinte

• Grosses altises (altises d'hiver)



12 parcelles observées cette semaine. La fréquence de capture est faible à moins de 20 %, quand la moyenne 2015-2025 est de 40 %.

Suivi des fréquences de captures de grosses altises à l'automne 2026 en région Ile-de-France




Source : CARIDF


La pression est également faible, avec en moyenne 0,5 individu capturé par piège

Les conditions climatiques des prochains jours devraient être favorables à une généralisation du vol des grosses altises.

Suivi des captures de grosses altises à l'automne 2026 en région Ile-de-France



Piégeage : Dès le semis, enterrez une cuvette jaune afin de connaître le début du vol. Venez observer 2 à 3 fois par semaine pendant la phase de levée.



A RETENIR

Risque : faible.

Stade de sensibilité : de la levée au stade 3 feuilles.

Seuil indicatif de risque : 8 pieds / 10 avec morsures et 25 % de surface foliaire atteinte.

• Limaces



Parmi les 13 parcelles observées cette semaine, des dégâts de limaces sont signalés dans 4 parcelles :

- Saint-Martin-de-Bréthencourt (78) : 0,2 %
- Gironville-sur-Essonne (91) : 0,2 % de surface foliaire détruite ;
- Leudeville (91) : 0,7 %
- Vallangoujard (95) : 5 %.

Les conditions climatiques des prochains jours ne seront pas favorables à l'activité des limaces ni à une croissance dynamique des colzas.

Il est nécessaire de surveiller le risque à la parcelle. Le risque est plus important dans les parcelles avec de nombreux résidus de pailles et/ou avec une préparation de sol motteuse.

Piégeage :

Vous pouvez disposer 4 bâches de 0,25 m² bien humidifiées et maintenues au sol. Les pièges sont installés le soir pour un relevé le lendemain matin de bonne heure. La localisation des pièges devra être modifiée à chaque relevé.

A RETENIR

Risque : faible.

Stade de sensibilité : de la levée au stade 3 feuilles.

Seuil indicatif de risque : présence de dégâts foliaires visibles et conditions favorables à l'activité des limaces.

• Pucerons verts



Seule la parcelle de Vallangoujard (95) signale 3 % de plantes porteuses de pucerons verts (variété tolérante).

• Comment observer ce ravageur ?

En retournant les feuilles et en observant minutieusement la face inférieure.

A RETENIR

Risque : faible.

Stade de sensibilité : de la levée au stade 6 feuilles.

Seuil indicatif de risque sur variétés non résistante TuYV : 20 % de plantes porteuses d'au moins un puceron vert.

• Charançon du bourgeon terminal



Aucune capture cette semaine.

A ne pas confondre avec le baris (insecte sans poils, noir à reflet bleu-vert de même taille que le charançon du bourgeon terminal - 2.5 à 3.5mm) et le charançon gallicole du chou qui est de plus petite taille (2-2.5mm), de couleur gris noirâtre avec le bout des pattes noir.

A RETENIR

Risque : faible.

Stade de sensibilité : de la levée (Stade A cotylédons étalés) au stade Rosette, 82% des parcelles de colza sont au stade sensible.

Seuil indicatif de risque : il n'existe pas de seuil de risque pour le charançon du bourgeon terminal. On considère que 8-10 jours après le début du vol (en pratique au PIC DE VOL), les femelles ont acquis la capacité de ponte, ce qui représente un risque pour la culture dès lors que les conditions climatiques sont favorables à l'activité de l'insecte.

• Punaies

Les conditions extrêmes de l'été 2026 ont conduit à des pullulations de ces insectes polyphages thermophiles, dont plusieurs espèces ont déjà été identifiées en France. Les punaises cherchent actuellement des sources de nourriture (repousses de colza, jeunes colzas en cours de levée, mais aussi d'autres espèces céréales, graminées, légumineuses...) dans un contexte de pénurie liée à la sécheresse.

Les colonisations se font via les parcelles adjacentes et se caractérisent par des déplacements en masse « en ordre serré » dans les parcelles, en commençant par les 20-30 m de bords de champs. Dépourvues d'ailes à ce stade (stade larvaire), les punaises fourmillent, piquent les feuilles et épuisent les plantules qui fanent très rapidement.

Les signalements sont en hausse en Ile-de-France, et plus particulièrement dans le sud de la région. Les conditions climatiques à venir vont être favorables à un maintien de cette forte pression.

- Plus d'infos [en cliquant ici](#) sur le site de Terres Inovia

- Signaler les attaques sur colza via [l'enquête mise en ligne](#) par Terres Inovia.



Illustration de différents stades de l'espèce *Nysius cymoides* - a) Larve stade III (1,0 mm) ; b) Larve stade IV (1,5 mm) ; c) Larve stade V (2,2 mm) ; d) Adulte mâle (2,5 mm). La taille correspond à la mesure entre l'extrémité de la tête et l'extrémité de l'abdomen (photos : laboratoire d'Eco-Entomologie – J.-D. Chapelin-Viscardi).


Aucune méthode de lutte n'est actuellement homologuée contre ces insectes sur colza. Lors des précédentes attaques, les précipitations (voire irrigations) contribuaient à disperser les larves.

BETTERAVE

17 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

STADES

1/3 des parcelles avoisinent 50 % de couverture et la moitié proche de la couverture totale. Quelques parcelles ont été récoltées



RAVAGEURS

• Jaunisse


Sur les 9 parcelles dont des informations sur la jaunisse sont renseignées, toutes présentent des symptômes de jaunisse de 0,5 à 10 % de surface impactée.

La sécheresse actuelle rend difficile l'observation des symptômes de jaunisse.

• Teignes



Sur 5 pièges relevés cette semaine, tous remontent la présence de papillons avec 15 papillons piégés en moyenne. Il y a de grandes différences de captures, avec seulement 3 papillons capturés à d'Huisson-Longueville (91) et Noisy Rudignon (77) contre 42 à Labbeville (95).



Parmi les 10 parcelles renseignées, 9 présentent des dégâts frais dont 7 au-dessus du seuil de risque, allant de et jusqu'à 100 de plantes touchées.

Parmi les 10 parcelles ayant des informations sur le rhizopus, seulement 2 en sont dépourvues et sur les 8 autres parcelles, la maladie s'étend 1 % de la surface parcellaire touchée à 50 % à Noisy-Rudignon (77).

A RETENIR

Risque : fort.

Stade de sensibilité : à partir de la couverture.

Seuil indicatif de risque : en présence de stress hydrique, 10 % de plantes touchées avec présence de dégâts frais ou chenilles.

• Pégomyies et Noctuelles



En raison de l'état foliaire dégradée d'une grande majorité des parcelles, il est très difficile de réaliser des observations fiables concernant ces deux ravageurs.

• Charançon lixus



A l'approche des récoltes, 25 betteraves par parcelles ont été décollées pour noter les galeries de Lixus dans les betteraves.

Il existe une très forte disparité allant de 1 % de betteraves impactées jusqu'à 100 % (Noisy-Rudignon, 77), avec, en moyenne presque 40 % de betteraves concernées.

De plus, en moyenne, les betteraves touchées ont environ 2 galeries dans la racine, voire jusqu'à 7 galeries sur 100 % des betteraves dans la parcelle de Noisy-Rudignon (77).

MALADIES DU FEUILLAGE


16 parcelles renseignées.

• Cercosporiose



Une carte interactive sur le site de l'ITB permet de consulter le statut des parcelles par seuil de traitement

<https://alerte.itbfr.org/maladies/>.



Plus d'un quart des parcelles est indemne de cercosporiose

A l'inverse, une parcelle atteint le seuil du troisième traitement.

Les nouvelles hausses de températures, avec très peu d'hygrométrie, vont limiter le développement des maladies

Une protection est rarement justifiée à 45 jours de la récolte.

• Rouille et oïdium



Aucune parcelle ne remonte ces maladies

A RETENIR

Risque : moyen pour la cercosporiose.

faible pour la rouille, l'oïdium et la ramulariose.

Stade de sensibilité : dès la couverture.

Seuil indicatif de risque : début de la protection avant la mi-août.

% de feuilles avec symptômes :

	T1	T2	T3
Cercosporiose	1ers symptômes	20%	25%
Ramulariose	5%	20%	25%
Oïdium	15%	30%	30%
Rouille	15%	40%	40%

début de la protection après la mi-août.

% de feuilles avec symptômes :

	T1	T2	T3
Cercosporiose	20%	25%	Pas de traitement
Ramulariose	20%	25%	Pas de traitement
Oïdium	30%	Pas de traitement	Pas de traitement
Rouille	40%	Pas de traitement	Pas de traitement

Vous trouverez sur le site de la DRIAf les fiches des Organismes Réglementés de la filière :

<https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-grandes-cultures-r739.html>,

<https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-pomme-de-terre-r737.html>

Les notes nationales de biodiversité sont consultables sous <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/notes-nationales-biodiversite-r607.html>

Pour en savoir plus sur :

-Les résistances : <https://www.r4p-inra.fr/fr/home/>

-Les produits de biocontrôle : <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/liste-officielle-biocontrôle-avril-2023-a1709.html>

-Les adventices : <https://www.infloweb.fr/>

- **Observations :**

AGRICULTEURS, COOP 110 BOURGOGNE, CERESIA, ARVALIS, CARIDF, CENTREXPE, COOPERATIVE ILE DE FRANCE SUD, COOP SEVEPI, Ets SOUFFLET AGRICULTURE, FREDON IDF, ITB IDF, SRAL, SUCRERIE CRISTAL UNION, SUCRERIE TEREOS, TERRES INOVIA.

- **Rédaction :**

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE : Hugues BERGAMINI, Nicolas GREAUME, Valentine BOULLENGER, Clément LECLERCQ, Claire TURILLON.

FREDON Ile de France : Céline GUILLEM.

- **Comité de relecture :**

ARVALIS, Chambre d'Agriculture de Région Île de France, TERRES INOVIA, ITB, SRAL.