



N°29
22/09/2026



Animateur filières

Céréales à paille / Maïs
Khalid KOUBAÏTI
FREDON Nouvelle-Aquitaine
khalid.koubaiti@fredon-na.fr

Oléagineux - Protéagineux
Solana VERA / Terres Inovia
s.vera@terresinovia.fr

Animateurs délégués

Céréales à paille / Maïs
Clément GRAS / ARVALIS
c.gras@arvalis.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre Régionale
Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

Supervision site de Poitiers

La stratégie

écophyto 2030

Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

**Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.**

**Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Grandes
cultures N°29 du 22/09/26 »**

Edition **Poitou-Charentes**

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT**
en cliquant sur **formulaire d'abonnement au BSV**

Ce qu'il faut retenir

Colza


- **Stade** : levée en cours à 6 feuilles (B6).
- **Grosses altises** : quelques captures, **installez vos pièges et surveillez les colzas de moins de 4 feuilles.**
- **Pucerons verts du pêcher** : à surveiller
- **Adultes et larves de tenthrèdes de la rave** : à surveiller.
- **Petites altises** : non observées.
- **Limaces** : non observées.
- **Autres bioagresseurs** : fausse punaise des céréales.




• Stade phénologique et état de la culture

Cette semaine 22 parcelles de colzas sont observées en Poitou-Charentes. Le réseau est toujours en cours de construction.

Les stades des colzas observés sont très hétérogènes, ils s'échelonnent de la levée au stade 6 feuilles (B6). 36% des parcelles ont atteint ou dépassé le stade 4 feuilles.



Carte des parcelles de colza observées du 16 au 22 septembre 2026
(Terres Inovia)




Evolution des stades du colza en % de parcelles
(Terres Inovia)

• Grosses altises (altises d'hiver)

Les grosses altises sont piégées en cuvettes cette semaine dans 9 parcelles du réseau sur 20 renseignées. Les captures vont de 1 à 8 individus.

7 parcelles sur 14 observent entre 15 et 50% de plantes avec morsures, et 7 parcelles relèvent entre 2 et 5% de surface foliaire détruite (moyenne à 4%).

Pour rappel : la cuvette n'est qu'un indicateur d'arrivée ou de présence du ravageur dans la parcelle. Le risque pour le colza s'évalue en croisant l'intensité et la fréquence des attaques sur les feuilles avec le stade de la culture, et non selon le nombre d'altises capturées.



Carte des piégeages de grosses altises du 16 au 22 septembre 2026

Point orange : grosses altises capturées (9 parcelles)

Point vert : grosses altises absentes (non piégées en cuvette enterrée – 11 parcelles)
(Terres Inovia)

Période de risque : de la levée au stade 3 feuilles inclus.

Seuil indicatif du risque : 8 pieds sur 10 portants des morsures et 25 % de la surface foliaire détruite.



Moins de 25 % de la surface touchée



Plus de 25 % de la surface touchée

Évaluation du risque

Des grosses altises sont capturées dans 9 parcelles du réseau cette semaine. 7 parcelles observées présentent des morsures, mais aucune ne dépasse le seuil de risque en surface foliaire détruite.

Le vol n'a pas encore débuté. Le risque est actuellement **faible** au regard des températures actuelles. Les prévisions météo de la semaine ne semblent pas favorables au déclenchement du vol. **A surveiller de près.**

Pour estimer plus précisément le risque, [consultez l'outil en ligne](#) :



Attention : la grosse altise est résistante aux pyréthriinoïdes.



• Pucerons verts du pêcher

Les pucerons verts du pêcher sont observés sur une parcelle du réseau cette semaine à GENOUILLÉ (86), avec 10% de plantes avec présence.

Période de risque : de la levée au stade 6 feuilles. La nuisibilité est due au prélèvement de sève et/ou aux transmissions de viroses.

Seuil indicatif du risque : 20 % de plantes porteuses.

Évaluation du risque

Le risque est à ce jour **faible**.

Maintenez les observations pour les colzas de moins de 6 feuilles.

Ne pas oublier que le risque est réduit pour les variétés à résistance partielle au TuYV, une des viroses transmises par ce vecteur.



Attention : le puceron vert est résistant aux pyréthriinoïdes et au pirimicarbe.

• Adultes et larves de tenthrèdes de la rave

Les adultes de tenthrèdes de la rave sont observés sur 4 parcelles sur 14 cette semaine, avec 1 à 3 individus. À SAINT- GENOUILLÉ (86) avec 1 individu. Sur 3 parcelles 5% de la surface foliaire est détruite.

Leur présence ne présage en rien du niveau d'attaque par les larves. Il est néanmoins important de rester vigilant quant à l'arrivée des larves qui en cas de fortes attaques, défolient rapidement la parcelle.



Adulte (à gauche) et larve (à droite) de tenthrède de la rave

(Terres Inovia)

Période de risque : de la levée au stade 6 feuilles inclus.

Seuil indicatif du risque : 25 % de la surface foliaire détruite.

Évaluation du risque

Avec les observations actuelles, le risque est **faible** dans le réseau.

Pour aller plus loin :

[Gestion des ravageurs secondaires](#)

• **Petites altises (altises des crucifères)**

Les petites altises ne sont pas observées cette semaine dans les parcelles du réseau.

Il est nécessaire de rester vigilant pour les colzas de moins de 3 feuilles.

Attention à la destruction des repousses pendant la levée des nouveaux colzas : cela peut entraîner le déplacement des populations de petites altises d'une parcelle à l'autre. Décaler les déchaumages s'il y a des colzas de moins de 3 feuilles dans le voisinage. Surveillez les bordures des jeunes colzas en priorité régulièrement.

Période de risque : de la levée au stade 3 feuilles inclus.

Seuil indicatif du risque : 8 pieds sur 10 portants des morsures et 25 % de la surface foliaire détruite.



Moins de 25 % de la surface touchée



Plus de 25 % de la surface touchée

Évaluation du risque

Les petites altises ne sont pas observées dans les parcelles du réseau cette semaine. Le risque est **faible**. Restez vigilants en surveillant régulièrement les jeunes colzas.

Pour aller plus loin :

[Gestion des petites altises \(altises des crucifères\)](#)

• **Limaces**

Les limaces ne sont pas observées cette semaine.

Période de risque : du semis au stade 3-4 feuilles.

La nuisibilité est fonction de l'apparition de zones d'éclaircissement dans les parcelles et de leur progression. Les attaques les plus dommageables peuvent parfois conduire au ressemis (partiel ou total). Une surveillance des parcelles, par la pose de pièges avant les semis, permettent d'anticiper les dégâts.

Évaluation du risque

Les températures actuellement élevées et l'absence de pluie ne sont pas favorables aux limaces. Le risque est **faible**.

Surveillez les colzas levés ou en cours de levée, jusqu'au stade 3-4 feuilles.

• **Autres bioagresseurs**

Fausse punaise des céréales

De nombreux cas, beaucoup plus fréquents que d'habitude, sont rapportés cette année (Centre, Bretagne, Normandie, Poitou-Charentes, Bourgogne...).

Les conditions extrêmes de l'été 2026 ont conduit à des pullulations de ces insectes polyphages thermophiles, dont plusieurs espèces ont déjà été identifiées en France. Les punaises cherchent actuellement des sources de nourriture (repousses de colza, jeunes colzas en cours de levée, mais aussi d'autres espèces céréales, graminées, légumineuses...) dans un contexte de pénurie liée à la sécheresse.

Les colonisations se font via les parcelles adjacentes et se caractérisent par des déplacements en masse « en ordre serré » dans les parcelles, en commençant par les 20-30 m de bords de champs. Dépourvus d'ailes à ce stade (stade larvaire), les punaises fourmillent, piquent les feuilles et épuisent les plantules qui fanent très rapidement.

Cet insecte n'est pas classé parmi les organismes réglementés, il n'y a à ce jour aucun moyen de lutte conventionnel.

Hors réseau, plusieurs cas de dégâts sont signalés en Vienne, en Charente et dans les Deux-Sèvres.

- Plus d'infos en [cliquant ici](#) sur le site de Terres Inovia
- Signaler les attaques sur colza via [l'enquête mise en ligne par Terres Inovia](#)

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine Grandes cultures / Edition Poitou-Charentes sont les suivantes : Agriculteurs, CA17-79, CA86, COOP MANSLE-AUNAC, ELICITPLANT, OCEALIA, OXAGRI, Soufflet Agriculture, Terre Atlantique, Terres Inovia, VSN NEGOCE

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).