



N°30
29/09/2026



Animateur filières

Céréales à paille / Maïs
Khalid KOUBAÏTI
FREDON Nouvelle-Aquitaine
khalid.koubaiti@fredon-na.fr

Oléagineux - Protéagineux
Solana VERA / Terres Inovia
s.vera@terresinovia.fr

Animateurs délégués

Céréales à paille / Maïs
Clément GRAS / ARVALIS
c.gras@arvalis.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre Régionale
Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

Supervision site de Poitiers

La stratégie

écophyto 2030

Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

**Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.**

**Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Grandes
cultures N°30 du 29/09/26 »**

Edition **Poitou-Charentes**

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT**
en cliquant sur **formulaire d'abonnement au BSV**

Ce qu'il faut retenir

Colza


- **Stade** : levée en cours à 6 feuilles (B6).
- **Grosses altises** : captures dans 81% des parcelles, **surveillance prioritaire des colzas de moins de 4 feuilles**.
- **Adultes et larves de tenthrèdes de la rave** : à surveiller.
- **Limaces** : discrètes.
- **Pucerons verts du pêcher** : non observés.
- **Autres bioagresseurs** : fausse punaise des céréales, charançons gallicoles du chou, charançon du bourgeon terminal, petites altises, héliothis.




• Stade phénologique et état de la culture

Cette semaine 23 parcelles de colzas sont observées en Poitou-Charentes.

Les stades des colzas observés sont très hétérogènes, ils s'échelonnent de la levée au stade 6 feuilles (B6). 57% des parcelles ont atteint ou dépassé le stade 4 feuilles.



Carte des parcelles de colza observées du 23 au 29 septembre 2026
(Terres Inovia)




Evolution des stades du colza en % de parcelles
(Terres Inovia)

• Grosses altises (altises d'hiver)

Les grosses altises sont piégées en cuvettes cette semaine dans 17 parcelles du réseau sur 21 renseignées. Les captures vont de 1 à 45 individus.

10 parcelles sur 12 observent entre 5 et 75% de plantes avec morsures (moyenne à 30%), et 6 parcelles relèvent entre 5 et 20% de surface foliaire détruite (moyenne à 8%).

Pour rappel : la cuvette n'est qu'un indicateur d'arrivée ou de présence du ravageur dans la parcelle. Le risque pour le colza s'évalue en croisant l'intensité et la fréquence des attaques sur les feuilles avec le stade de la culture, et non selon le nombre d'altises capturées.



Carte des piégeages de grosses altises du 23 au 29 septembre 2026

Point orange : grosses altises capturées (17 parcelles)

Point vert : grosses altises absentes (non piégées en cuvette enterrée – 4 parcelles)
(Terres Inovia)

Période de risque : de la levée au stade 3 feuilles inclus.

Seuil indicatif du risque : 8 pieds sur 10 portants des morsures et 25 % de la surface foliaire détruite.



Moins de 25 % de la surface touchée



Plus de 25 % de la surface touchée

Évaluation du risque

Des grosses altises sont capturées dans 81% des parcelles du réseau cette semaine. 10 parcelles observées présentent des morsures, mais aucune ne dépasse le seuil de risque en surface foliaire détruite.

Les attaques dans le réseau sont globalement supportables, mais seulement 57% des parcelles ont atteint ou dépassé le stade 4 feuilles.

Le risque est **fort pour les parcelles de moins de 4 feuilles.**

Le risque est **modéré pour les parcelles ayant atteint ou dépassé le stade 4 feuilles.**

Pour estimer plus précisément le risque, [consultez l'outil en ligne](#) :



Attention : la grosse altise est résistante aux pyréthriinoïdes.



• Adultes et larves de tenthrèdes de la rave

Les adultes de tenthrèdes de la rave sont observés sur 1 parcelle sur 10 cette semaine, à CHAMBON (17) avec 0,7 individu.

1 parcelle présente 5% de plantes avec larves, et 3 parcelles ont entre 5 et 15% de la surface foliaire est détruite.

Leur présence ne présage en rien du niveau d'attaque par les larves. Il est néanmoins important de rester vigilant quant à l'arrivée des larves qui en cas de fortes attaques, défolient rapidement la parcelle.



Adulte (à gauche) et larve (à droite) de tenthrède de la rave

(Terres Inovia)

Période de risque : de la levée au stade 6 feuilles inclus.

Seuil indicatif du risque : 25 % de la surface foliaire détruite.

Évaluation du risque

Avec les observations actuelles, le risque est **faible** dans le réseau.

Vigilance pour les parcelles avec larves, les attaques peuvent progresser rapidement.

Pour aller plus loin :

[Gestion des ravageurs secondaires](#)

• Limaces

Une parcelle située à LA FOYE-MONJAULT (79) présente 15% de surface foliaire détruite.

Période de risque : du semis au stade 3-4 feuilles.

La nuisibilité est fonction de l'apparition de zones d'éclaircissement dans les parcelles et de leur progression. Les attaques les plus dommageables peuvent parfois conduire au resemis (partiel ou total). Une surveillance des parcelles, par la pose de pièges avant les semis, permettent d'anticiper les dégâts.

Évaluation du risque

Le risque est **faible** pour le moment.

Surveillez les colzas levés ou en cours de levée, jusqu'au stade 3-4 feuilles, avec les conditions humides actuelles.

• Pucerons verts du pêcher

Les pucerons verts du pêcher ne sont pas observés dans les parcelles du réseau cette semaine.

Période de risque : de la levée au stade 6 feuilles. La nuisibilité est due au prélèvement de sève et/ou aux transmissions de viroses.

Seuil indicatif du risque : 20 % de plantes porteuses.

Évaluation du risque

Le risque est à ce jour **faible**. Les conditions climatiques actuelles ne sont pas favorables aux pucerons.

Maintenez les observations pour les colzas de moins de 6 feuilles.

Ne pas oublier que le risque est réduit pour les variétés à résistance partielle au TuYV, une des viroses transmises par ce vecteur.



Attention : le puceron vert est résistant aux pyréthrinoïdes et au pirimicarbe.

• Autres bioagresseurs

Fausse punaise des céréales

De nombreux cas, beaucoup plus fréquents que d'habitude, sont rapportés cette année (Centre, Bretagne, Normandie, Poitou-Charentes, Bourgogne...).

Les dégâts de fausses punaises des céréales sont encore relevés cette semaine dans le sud de la Vienne.

Les conditions extrêmes de l'été 2026 ont conduit à des pullulations de ces insectes polyphages thermophiles, dont plusieurs espèces ont déjà été identifiées en France. Les punaises cherchent actuellement des sources de nourriture (repousses de colza, jeunes colzas en cours de levée, mais aussi d'autres espèces céréales, graminées, légumineuses...) dans un contexte de pénurie liée à la sécheresse.

Les colonisations se font via les parcelles adjacentes et se caractérisent par des déplacements en masse « en ordre serré » dans les parcelles, en commençant par les 20-30 m de bords de champs. Dépourvus d'ailes à ce stade (stade larvaire), les punaises fourmillent, piquent les feuilles et épuisent les plantules qui fanent très rapidement.

Cet insecte n'est pas classé parmi les organismes nuisibles, **il n'y a à ce jour aucun moyen de lutte conventionnel.**

Hors réseau, plusieurs cas de dégâts sont signalés en Vienne, en Charente et dans les Deux-Sèvres.

- Plus d'infos en [cliquant ici](#) sur le site de Terres Inovia
- Signaler les attaques sur colza via [l'enquête mise en ligne par Terres Inovia](#)

Charançon gallicole du chou

Les charançons gallicoles du chou ne sont pas observés cette semaine.


Charançon du bourgeon terminal

Les charançons du bourgeon terminal ne sont pas observés dans le réseau Poitou-Charentes.

Attention aux confusions avec le charançon gallicole :

Charançon Gallicole

Adulte : ne pas confondre avec le charançon du Bourgeon Terminal



Petites altises (altises des crucifères)

Les petites altises sont observées dans deux parcelles sur réseau cette semaine, à LUZAY (79) et à LANDES (17), avec 1 et 4 individus piégés.

Il est nécessaire de rester vigilant pour les colzas de moins de 3 feuilles.

Pour aller plus loin :

[Gestion des petites altises \(altises des crucifères\)](#)

Héliothis :

Une parcelle située à COURS (79) signale la présence de larves d'Héliothis dans les colzas.

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine Grandes cultures / Edition Poitou-Charentes sont les suivantes : Agriculteurs, CA17-79, CA86, COOP MANSLE-AUNAC, EI BOTET, ELICITPLANT, LYCEE AGRICOLE XAVIER BERNARD, NEOLIS, OCEALIA, OXAGRI, Soufflet Agriculture, Terre Atlantique, Terres Inovia, VSN NEGOCE

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).