



FREDON
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

PRAIRIES

N°4 du 18 septembre 2026

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL de Bourgogne-Franche-Comté

SOMMAIRE

P1. Evaluation des niveaux d'infestations en campagnols terrestres et taupes

P2. Niveau d'infestation en campagnol terrestre et taupe euporéenne


P4. Point de situation *Popillia japonica*

Evaluation des niveaux d'infestations en campagnols terrestres (*Arvicola amphibius*) et taupes européennes (*Talpa europaea*)

Localisation des balises suivies dans le Doubs et le Jura - Septembre 2026


Grâce à l'application « Arvicola obs », 4 secteurs ont été suivis en septembre 2026 : Montbenoît, Frasne, Levier et Nozeroy.

Les balises permettent d'être plus précis dans nos observations et d'estimer les niveaux d'infestations par interpolation spatiale, notamment entre deux balises suivies.



Niveau d'infestation en campagnol terrestre et taupe européenne

Evaluation des niveaux d'infestation en campagnols terrestres Septembre 2026



Les prospections réalisées en septembre 2026, à la suite des épisodes de sécheresse et de canicules estivales, ont mis en évidence un ralentissement de l'activité du campagnol terrestre. Cependant, attention : un été sec ne signifie pas sa disparition. En période de sécheresse, sa présence se manifeste différemment, notamment par des trous de sortie directement en surface, en remplacement des tumulis habituels.


Des opérations de piégeage récentes sur le secteur de Levier, menées en l'absence d'indices frais comme les tumulis, ont d'ailleurs confirmé la présence d'individus. Il est donc essentiel de rester très vigilant et de parcourir régulièrement vos parcelles, en particulier après un épisode pluvieux, qui pourrait révéler des indices frais et confirmer la reprise de son activité.

Sur les secteurs de Levier, Montbenoît et à l'ouest du secteur de Frasne (coloration jaune/ orange sur la carte ci-dessus), les taux d'infestation par le campagnol terrestre sont globalement élevés, avec de nombreux foyers actifs localisés. Ces secteurs sont donc en croissance forte avec une pullulation attendue à l'automne en fonction de la pluviométrie. Il ne faut donc pas baisser la garde, en particulier sur les parcelles où la lutte est continue depuis le début du cycle (méthode de lutte directe couplée à des moyens de lutte alternatifs complémentaires).

Sur le secteur de Nozeroy et le reste du secteur de Frasne, les taux d'infestation en campagnol terrestre sont faibles, avec quelques foyers actifs localisés voire de forte infestation sur Onglières. Ces secteurs seraient en phase de croissance faible. Il est donc important d'initier une lutte raisonnée dès l'apparition d'indices frais afin de limiter les foyers de démarrage et réussir à maintenir les populations de campagnols à faible densité.

Suite à cette longue période de sécheresse, les prospections d'automne seront donc très importantes pour confirmer la tendance de dynamique des populations de campagnols sur ces 4 secteurs.

Evaluation des niveaux d'infestation en taupes européennes Septembre 2026



Point de situation *Popillia japonica*

Dans le cadre de la surveillance mise en place face au scarabée japonais, 2 individus ont été capturés les 16 juin et 7 juillet 2026, respectivement sur les aires de service des communes d'Écot (25) et Pont (21).

La surveillance a été renforcée autour de ces points de capture. Aucun autre individu n'a été capturé depuis.

Pour rappel, *Popillia japonica* est un petit scarabée originaire d'Asie classé comme organisme de quarantaine prioritaire au titre de la réglementation européenne, avec une obligation de surveillance et de lutte, en raison de sa nuisibilité importante. En effet, il s'attaque à plus de 300 espèces de plantes alimentaires, forestières ou encore ornementales parmi lesquelles la vigne, les arbres fruitiers, les petits fruits, les gazons et le maïs... L'insecte est présent en Italie depuis 2014 et en Suisse depuis 2017. Il a été détecté pour la première fois en France (région Grand Est, Haut-Rhin) durant l'été 2025 ; il s'agissait également d'interceptions.

Les adultes s'attaquent aux parties tendres des feuilles, leur donnant un aspect de dentelle, tandis que les larves, qui se développent dans le sol, se nourrissent des racines de graminées, pouvant aller jusqu'à la création de tâches dans la culture. Les femelles privilégient les gazons entretenus et irrigués pour pondre.

Le pic de vol est dépassé depuis fin juillet mais des adultes peuvent encore être observés jusqu'en octobre. En cas de suspicion, il convient de capturer l'individu et de contacter le Service Régional de l'Alimentation en envoyant une photo : alerte-vegetaux-sral.draaf-bourgogne-franche-comte@agriculture.gouv.fr.

Pour plus d'informations sur le scarabée japonais, rendez-vous sur le site de la DRAAF : <https://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/focus-sur-le-scarabee-japonais-popillia-japonica-r615.html>.

Si vous souhaitez faire remonter tout signalement de bioagresseurs des prairies (hanneton, campagnol, taupe...), ou pour tout autre renseignement, veuillez contacter FREDON Bourgogne Franche-Comté :

contact@fredonbfc.fr - 03 81 47 79 20

Animatrice filière Prairie : Julie MONTAZ – 06 07 19 47 48 – jmontaz@fredonbfc.fr

Suppléance : Geoffroy COUVAL – 06 07 19 47 15 – gcouval@fredonbfc.fr

Bulletin édité sous la responsabilité de FREDON Bourgogne-Franche-Comté et rédigé par Julie MONTAZ à partir des observations ponctuelles réalisées dans les prairies de Bourgogne Franche-Comté.