



CÉRÉALES À PAILLE

BSV-Bilan 2025-2026

SOMMAIRE

Réseau 2025-2026	1
Blé tendre et blé dur	2
Orge d'hiver	6
Orge de printemps	8
Bilan	9
Résistance aux produits phytosanitaires	10
Notes nationales	11

Rédacteurs

ARVALIS

Observateurs 2025-2026

AGRICULTEURS, AGRO
CENTRE, CA18, CA28, CA36,
CA37, CA41, CA45, CETA
CHAMPAGNE BERRICHONNE,
FDGEDA DU CHER, SOUFFLET
AGRICULTURE, UCATA

Directeur de publication

Maxime BUIZARD-BLONDEAU

Président de la Chambre
régionale d'agriculture du
Centre-Val de Loire

13 avenue des Droits de
l'Homme – 45921 ORLEANS

Ce bulletin est produit à
partir d'observations
ponctuelles. Il donne une
tendance de la situation
sanitaire régionale, qui ne
peut pas être transposée
telle quelle à la parcelle.

La Chambre régionale
d'agriculture du Centre-Val
de Loire dégage donc toute
responsabilité quant aux
décisions prises par les
agriculteurs pour la
protection de leurs cultures.

Action du plan Ecophyto
pilote par les ministères en
charge de l'agriculture, de
l'écologie, de la santé et de la
recherche, avec l'appui
technique et financier de
l'Office français de la
Biodiversité.

EN BREF

Blé tendre : Peu de piétin-verse. Septoriose restée sur les feuilles du bas, freinée par le temps sec à partir de mi-avril. Quelques cas de rouille jaune dès mars mais bien gérés. Pression plus forte pour la rouille brune en mai sur variétés sensibles dans la région. Peu de cécidomyies cette année, quelques cas hors réseau en Sud Loire.

Blé dur : Pression maladie faible cette année, avec peu de septoriose et une quasi-absence de rouilles. Peu de fusariose des épis.

Orge d'hiver : Pression maladies faible pour les OH. Pour les OPsA : pression moyenne à forte rhynchosporiose et moyenne pour l'helminthosporiose.


Orge de printemps : Absence de maladie cette année avec les conditions climatiques sèches du printemps.




Le BSV céréales à paille en région Centre – Val de Loire vise à décrire l'état sanitaire hebdomadaire de la région en s'appuyant sur l'observation d'un réseau de parcelles. Il cible principalement les bioagresseurs les plus préjudiciables des blés (tendres et durs) et des orges (d'hiver et de printemps). Ce dernier bulletin dresse le bilan de l'état sanitaire de la campagne 2025-2026.

20 organismes ont participé au réseau d'observation dans le cadre du BSV, pour un total de 159 parcelles suivies dont 141 parcelles suivies très régulièrement.


Parcelles de Blé Tendre




Parcelles de Blé dur



Parcelles d'Orge d'hiver




Parcelles d'Orge de printemps






STADES

Comparaison interannuelle des stades de développement des blés tendres au cours de l'automne





Comparaison interannuelle des stades de développement des blés tendres au cours du printemps




PIETIN VERSE

L'automne et l'hiver plutôt doux et les pluies importantes de février ont engendré un indice de risque climatique moyen à fort selon la précocité de semis, supérieur à l'an dernier (modèle TOP). Avec globalement des semis plus précoces que d'habitude en lien avec les difficultés de semis de ces 2 années dernières années (cf. suivi de stades).



Modèle TOP (département 45 avec 2 hypothèses de semis).





Toutefois, les observations de terrain ont montré une expression limitée de la maladie dans les parcelles suivies.

Notations Piétin-verse en Blé tendre d'hiver
55 parcelles observées, 3 notations en fin de cycle épiaison-floraison

ROUILLE JAUNE

La rouille jaune a été présente sur le réseau, à partir de mars au sud de la région et à partir d'avril pour le nord. Beaucoup de cas sont sur variétés sensibles PRESTANCE (3), CELEBRITY (4), on retrouve également des cas sur CHEVIGNON (5) KAROQUE (6), LG ABSALON (6) et en mélanges. Maladie maîtrisée cette année avec une perte de vitesse liée au climat sec dès avril.







ROUILLE BRUNE

Premiers signalements tôt au début du printemps sans explosion de la maladie avec le sec d'avril. Retour d'une pression plus importante suite aux pluies du mois de mai.

Les variétés les plus touchées dans le réseau sont des variétés sensibles : THERMIDOR (4), Izalco CS (5), REBELDE (5) rouille présente également sur : PRESTANCE (6), CHEVIGNON (6), LG Absalon (7) et en mélange.




Notations rouille brune
46 parcelles observées




SEPTORIOSE


A la mi-avril, le modèle Septo-LIS d'ARVALIS présente un risque moyen sur variétés sensibles et moyennement sensibles à la septoriose pour le sud de la région, recommandant l'observation au stade 3 nœuds - DFP. Au stade DFE passage en risque fort pour le même profil de variétés en Indre et Indre-et-Loire. Risque resté faible à moyen pour le Nord de la région.



Septoriose confinée sur les feuilles du bas cette année avec le climat sec dès avril.





En blé dur même constat, la pression septoriose a été faible.



CECIDOMYIES ORANGES

Peu de captures, présence surtout au sud de la région en hors réseau, « pic » en semaine 21 pour les cécidomyies orange.




19 cuvettes relevées

Orge d'hiver




STADES

Comparaison interannuelle des stades de développement des orges d'hiver au cours de l'automne




Comparaison interannuelle des stades de développement des organes d'hiver au cours du printemps



RHYNCHOSPORIOSE


La pression a été globalement assez faible cette année. Plus marquée en orge de printemps semé à l'automne.



32 parcelles observées en Orge d'hiver / Orge de Printemps semée d'Automne

HELMINTHOSPORIOSE


La pression a été globalement assez faible cette année. Plus marquée en orge de printemps semé à l'automne.



31 parcelles observées en Orge d'hiver / Orge de Printemps semée d'Automne

ROUILLE NAINE

La pression en rouille a été faible cette année.



31 parcelles observées en Orge d'hiver / Orge de Printemps semée d'Automne

RAMULARIOSE


Une pression qui a été faible à modérée pour la ramulariose cette année.

Orge de printemps



RHYNCHOSPORIOSE


La pression rhynchosporiose a été faible cette année (printemps sec).



6 parcelles observées en Orge de printemps

HELMINTHOSPORIOSE


La pression helminthosporiose a été faible cette année en OP, pression restée sur les F3.



6 parcelles observées en Orge de printemps

ROUILLE NAINE

Absence de rouille naine cette année sur orge de printemps.




6 parcelles observées en Orge de printemps

Bilan



Fréquence et intensité des attaques de bio-agresseurs observés dans le réseau d'observation BSV Centre-Val de Loire / Filière Céréales à paille - Campagne 2025-2026



■ Fréquence d'attaque (= régularité des attaques/dégâts observés) (0 à 3)
 (-/+/-) (=évolution de la pression/campagne précédente)

■ Intensité d'attaque (= gravité des attaques/dégâts observés) (0 à 3)

Résistance aux produits phytosanitaires



Afin de limiter les risques d'évolution de résistances et maintenir une efficacité satisfaisante des solutions disponibles, retrouvez les résultats de la note 2025 corédigée par l'INRAE, l'Anses et ARVALIS, dressant l'état des lieux, par maladie et par mode d'action, des résistances aux fongicides utilisés pour lutter contre les maladies des céréales à paille : [Note commune ARVALIS / ANSES / INRAE résistances aux fongicides | ARVALIS](#)

Des outils et informations sont disponibles sur le site Internet du réseau R4P (Réseau de Réflexion et de Recherche sur la Résistance aux Pesticides) de l'INRA : <https://www.r4p-inra.fr/fr/home/>.

1451 abonnés au BSV Céréales à Paille



**ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT
AUX BSV DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE**

<http://bsv.centre.chambagri.fr>



Notes nationales



Popillia japonica



La menace est toujours présente. Ouvrez l'œil ! Pour en savoir plus : [lien](#)

Site Internet : <https://www.popillia.eu/>

Flyer d'information et de procédure de signalement par application dédiée : <https://www.popillia.eu/downloads>



Datura stramoine

*Datura
stramonium*



Une nouvelle note nationale a été publiée en février 2025 ayant pour sujet la Datura Stramoine (*Datura stramonium*). Vous pourrez la retrouver en cliquant sur le lien suivant : [lien Internet DRAAF](#).

Pour plus d'informations sur les différentes espèces de Datura, cliquez sur le lien suivant : [lien Internet DRAAF vers le dossier des fiches espèces Datura](#)

Notes nationales



La réglementation a évolué en 2022, vous pouvez la retrouver en cliquant sur le lien ci-dessous :

[Protection des pollinisateurs-Région Centre - Val de Loire](#)

[Liste des cultures non attractives en vigueur depuis le 05 juillet 2024](#)