



SOMMAIRE :

- **Mildiou :**
 - **Situation sur le terrain :** Quelques taches sporulantes en parcelles.
 - **Risques :** réserve de spores potentielle globalement très élevée. **Seuil indicatif de risque atteint sur la quasi totalité des postes.**
- **Limaces :** A surveiller dans les parcelles à risques.
- **Taupins :** Présence généralement modérée sur quelques parcelles. Poursuivez vos comptages de la récolte au stockage pour estimer le risque.



Variété Fontane. 90% de sénescence.
Neuville Saint Vaast (62)
Photo : C.HACCART—CA59/62

OBSERVATIONS : 25 parcelles ont été observées cette semaine.

SITUATION DANS LA PLAINE :

Dans le Nord et le Pas de Calais, sur les 7 derniers jours la pluviométrie moyenne enregistrée est de 1mm (de 1mm à 5mm selon les secteurs).

La plupart des parcelles sont désormais en sénescence avancée, en cours de défanage ou défanées. Certains retardent le défanage pour essayer de gagner quelques tonnes et du calibre.

Dans les parcelles de variétés tardives et semi-tardives qui présentent encore une végétation assez verte, les températures douces associées à la présence d'humidité dans la buttes sont favorables au grossissement des tubercules.

En terme de qualité, si l'eau a un impact positif en entraînant une baisse des matières sèches, des phénomènes de désordres physiologiques plus ou moins importants sont observés en parcelle.

Dans le réseau de la Chambre d'Agriculture, les prélèvements effectués semaine 36 sur 20 parcelles de variété Fontane et Challenger montrent que le retour des pluies a permis de réduire l'écart de rendement avec la moyenne pluriannuelle. Toutefois, les rendements et les calibres restent faibles avec des situations très hétérogènes en fonction du facteur irrigation avec globalement : des rendements nets en dessous de la moyenne (-13%), une proportion de gros calibres faible (-30%), une tubérisation >35mm assez élevée, des matières sèches moyennes, un taux de défauts faible. Les situations irriguées montrent un net avantage par rapport aux parcelles conduites en sec aussi bien en rendement (+46%) qu'en calibre (+116% de +50mm).

Dans les départements Picards, Sur les 7 derniers jours, la pluviométrie moyenne enregistrée est de 3 mm (de 0 à 6 mm selon les secteurs). 1/3 des parcelles sont au stade « 50 % de sénescence » et les 2/3 restants au stade « récolte ». Les pluies enregistrées au cours des dernières semaines ont permis une amélioration de l'état hydrique des parcelles et ont pu favoriser la poursuite du grossissement des tubercules dans les situations où l'appareil foliaire était encore fonctionnel. La capacité des plantes à poursuivre le remplissage des tubercules est désormais fortement réduite et devient quasiment nulle dans les parcelles totalement sénescentes.

Les estimations réalisées par la Coopérative Féculière de Vecquemont sur 109 parcelles le 1er septembre font ressortir que les récentes pluies ont favorisé la croissance des tubercules et à entraîné une baisse de la richesse féculière (20,8%) ainsi que la présence de repousses physiologiques (14% des parcelles observées). La présence de l'irrigation en parcelles est positive. Enfin, à l'échelle de la région, les rendements sur le départements de l'Oise seraient en retrait, en lien avec un cumul de pluviométrie moins favorable.

METEO : Pour les jours à venir, les prévisions météo annoncent un temps plutôt sec (hormis quelques pluies annoncées ce mardi) avec des températures douces. L'hygrométrie nocturne et matinale est toutefois élevée et devrait le rester localement d'ici à la fin de semaine.



Fontane irriguée, 30% de sénescence — Nord de Lille (59)
Photo : C.Haccart—CA59/62



Parcelle qui a bien reverdit suite aux pluies : nouvel étage foliaire, bouton floraux et quelques fleurs.
Pas de rejumelage sur tubercules—Gavrelle (62)
Photo : C.Haccart—CA59/62



Taches récentes de mildiou sporulant sur variété Fontane — Secteur Nord de Lille
Photo : C.Haccart—CA 59/62

MILDIU :



Evolution du risque



Situation sur le terrain

La pression est en augmentation avec le retour de conditions météo favorables au mildiou et l'enregistrement de nouvelles contaminations depuis une quinzaine de jours.



Quelques taches de mildiou sporulantes ont été observées en parcelles en ce début de semaine : à Gavrelle (62) sur Fontane et au nord de Lille (59) sur Fontane. Voir photos page précédente.

➔ **Restez très vigilants, observez et suivez bien vos parcelles jusqu'au défanage complet de la végétation. Tant qu'il reste du « vert » le mildiou peut s'installer.**

➔ **En cette fin de campagne, les pluies combinées à la présence de crevasses sur les buttes peuvent favoriser la descente des spores jusqu'aux tubercules.**

Interprétation du tableau des risques mildiou et seuils indicatifs de risque :

Pour que le seuil indicatif de risque soit atteint, il faut que les deux conditions suivantes soient réunies :

❶ **Réserve de spores potentielle** ayant atteint les niveaux suivants:

- **MOYENNE** pour les variétés sensibles,
- **ELEVEE** pour les variétés intermédiaires,
- **TRES ELEVEE** pour les variétés résistantes,



❷ **conditions météorologiques** (température et hygrométrie) **favorables aux contaminations.**

☒ **Les dernières colonnes du tableau des risques vous indiquent en fonction de la sensibilité de vos variétés si le seuil indicatif de risque est atteint (OUI) ou pas (NON).**

Précisions importantes :

-Les tableaux mildiou relatent une situation globale issue de l'interprétation de l'ensemble des variables de Miléos. Cette situation peut différer de l'analyse des risques issue de l'OAD Miléos à la parcelle.

-La colonne « réserve spore potentielle » tient compte de la réserve de spores et du potentiel de sporulation. Cela nous permet de prendre une « marge de sécurité » lors de situations où les conditions météo sont changeantes et les risques incertains, dans la mesure où seuls 1 à 2 BSV sont rédigés par semaine (un abonnement individuel à l'OAD Miléos® vous permet de disposer des risques actualisés plusieurs fois par jour et adaptés à votre parcelle).

-Attention, les risques donnés dans le tableau des risques sont valables pour des parcelles non irriguées. L'irrigation peut augmenter le risque en fonction des heures où elle est positionnée.

▶ **Voir le BSV n° 7 pour connaître le classement des variétés selon leur sensibilité au mildiou.**



Les couples « mildiou/fluazinam », « mildiou/mandipropamide et CAA », « mildiou/oxathiapiprolin » et « mildiou/mefenoxam » sont exposés à un risque de résistance. Vous pouvez trouver toutes les informations sur les phénomènes de résistance sur le site R4p via le lien www.r4p-inra.fr/fr



Il existe des produits de biocontrôle autorisés sur le mildiou de la pomme de terre. Il s'agit de la substance active suivante : *phosphonate de potassium*. Retrouvez la liste actualisée des produits de biocontrôle sur le site : <https://ecophytopic.fr/reglementation/protger/liste-des-produits-de-biocontrle>

Les conditions climatiques favorables aux contaminations:

La contamination est possible dès que l'hygrométrie est supérieure à 87%, associée à :



- une température de 21°C durant 8 heures consécutives.
- une température de 14°C durant 10 heures consécutives.
- une température de 10°C durant 13 heures consécutives.



DEPARTEMENTS PICARDS

Départements Picards -Tableau des risques mildiou établi à partir du modèle Mileos® le 8 septembre 2026 :

	Stations météorologiques	Dates de dépassement du seuil indicateur de risque durant les 7 derniers jours	Réserve de spores potentielle	Seuil indicatif de risque atteint du 08 au 10 septembre			Pluviométrie depuis le 01 septembre
				Variété sensible	Variété intermédiaire	Variété résistante	
Grand Amiénois / 3 Vallées	Vron	Du 01 au 04 septembre & le 06 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	6
	Boves	Le 04 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	2
	Inval	Du 03 au 04 septembre	Très élevée	OUI	NON	NON	1
	Thieulloy l'Abbaye	Du 28 au 31 août	Très élevée	OUI	OUI	OUI	1
Chaunois / Soissonnais	Coucy la Ville	Du 01 au 02 septembre & du 04 au 05 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	0
	Saint Christophe à Berry	Le 01 septembre & du 04 au 05 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	6
Grand Laonnois	Ebouleau	Le 01 septembre & du 04 au 05 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	0
	Marchais	Aucune	Pas de données				
Santerre Hauts de Somme / Saint Quentinnois / Source et vallées	Attilly	Du 04 au 05 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	1
	Templeux le Guérard	Du 01 au 02 septembre & du 04 au 05 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	1
	Curlu	Du 04 au 05 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	3
	Aizecourt le Haut	Le 01 septembre & du 04 au 05 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	2
Sud de l'Aisne	Verdilly	Du 04 au 05 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	3
Compiègnais / Grand Beauvaisis / Thelle Vixin sablons / Sud de l'Oise	Barbery	Le 04 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	1
	Catenoy	Du 01 au 02 septembre & du 04 au 05 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	4
	Rothois	Le 01 septembre & du 04 au 05 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	4
Thierache	Grougis (Forté)	Le 01 septembre & du 04 au 05 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	5
	Le Hérie la Vieville	Le 05 septembre	Très élevée	OUI	OUI	NON	5
Trait Vert	Attichy	Le 01 septembre & du 04 au 05 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	6
	Marcelcave	Le 01 septembre & du 04 au 05 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	2
	Vauvillers	Du 04 au 05 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	1

Le tableau des risques mildiou est réalisé à partir de prévisions météorologiques à 48 heures. Si les conditions météorologiques constatées diffèrent des prévisions (pluies, brumes, brouillard...) il se peut que les risques évoluent.

Départements Picards - Situation au niveau de Mileos® et analyse des risques du 8 au 10 septembre :

SITUATION AU NIVEAU DE MILEOS®

De nombreux déclenchements ont été enregistrés depuis la semaine dernière, avec une concentration particulièrement marquée entre mercredi et jeudi, à la suite des précipitations.

Ces épisodes pluvieux, associés à des températures douces et au maintien d'hygrométries matinales élevées, ont généré des conditions favorables à la sporulation. Ces conditions climatiques ont ainsi entraîné une augmentation des potentiels de sporulation et ainsi une réalimentation des réserves de spores.

Le contexte climatique récent est donc particulièrement favorable au mildiou, les réserves de spores constituées seront mobilisées dès lors que les conditions seront favorables aux contaminations. **La vigilance doit ainsi être maintenue.**

ANALYSE DES RISQUES

- Le seuil de risque est atteint à partir, d'aujourd'hui, **sur variétés sensibles uniquement pour le poste d'Inval.**
- Le seuil de risque est atteint à partir, d'aujourd'hui, **sur variétés sensibles et intermédiaires pour le poste de Le Hérie la Vieville.**
- Le seuil de risque est atteint à partir, d'aujourd'hui, **pour toutes variétés pour les postes d'Aizecourt le Haut, Attichy, Attilly, Barbery, Boves, Catenoy, Coucy la Ville, Curlu, Ebouleau, Grougis, Marcelcave, Rothois, St Christophe à Berry, Templeux le Guerard, Thieulloy l'Abbaye, Vauvillers, Verdilly et Vron.**

☒ Utiliser en priorité des moyens de lutte alternatifs aux traitements conventionnels, des méthodes biologiques ou des solutions de biocontrôle autorisées. En cas de nécessité d'intervention chimique de synthèse, privilégier les produits présentant le plus faible risque pour la santé et l'environnement.

DEPARTEMENTS NORD et PAS DE CALAIS

Nord et Pas De Calais -Tableau des risques mildiou établi à partir du modèle Mileos® le 8 septembre 2026 :

	Stations météorologiques	Dates de dépassement du seuil indicateur de risque durant les 7 derniers jours	Réserve de spores potentielle	Seuil indicateur de risque atteint du 8 au 10 septembre			Pluviométrie depuis le 1er septembre
				Variété sensible	Variété intermédiaire	Variété résistante	
Scarpe / Hainaut / Cambrésis/Thiérache	Avesne les Aubert	Du 1er au 5 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	1
	Esnes	Du 1er au 5 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	3
	Fressies	Du 1er au 5 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	4
	Ohain	Aucune	Faible	NON	NON	NON	2
	Thiant	Les 1er, 4 et 5 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	2
Artois / Ternois / Pays de Montreuil	Ambricourt	Du 1er au 4 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	6
	Aix Noulette	Du 1er au 5 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	1
	Berles au Bois	Du 1er au 5 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	1
	Bonnières	Du 1er au 5 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	3
	Boursies	Du 1er au 5 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	2
	Croisette	Du 1er au 6 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	3
	Ecuires						
	Gomiecourt	Du 1er au 5 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	7
	Haucourt	Aucune	Très élevée	OUI	OUI	NON	3
	Hermaville	Du 1er au 5 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	1
	Izel-les-Equerchin	Du 1er au 5 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	0
	Saint Pol sur Ternoise	Du 1er au 5 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	1
	Ternas	Du 1er au 7 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	3
	Tilloy Les Mofflaines	Du 1er au 5 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	0
Bethunois / Plaine de la Lys / Pays d'Aire	Auchy les Mines	Les 1er et 4 septembre	Très élevée	OUI	OUI	NON	0
	Calonne Sur La Lys	Du 1er au 4 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	1
	Hesdigneul Les Béthune	Du 1er au 5 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	1
	Lillers	Du 1er au 4 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	1
	Lorgies	Du 1er au 4 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	0
	Mametz	Du 1er au 4 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	1
Région de Lille / pévèle	Allesnes les Marais	Du 1er au 4 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	0
	Frelinghien	Du 1er au 4 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	0
	Orchies	Du 1er au 4 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	1
Flandres / Wateringues / Collines guinoises	Andres	Du 1er au 7 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	5
	Bailleul	Du 1er au 6 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	0
	Caestre	Du 1er au 6 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	0
	Hondschoote	Du 1er au 6 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	0
	Merckeghem	Aucune	Moyenne	OUI	NON	NON	0
	Pitgam	Du 1er au 6 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	0
	Steenbecque	Du 1er au 6 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	0
	Teteghem	Du 1er au 6 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	0
	Vieille Eglise	Du 2 au 4 septembre	Très élevée	OUI	OUI	NON	1
	Wormhout	Du 1er au 6 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	0
	Zuytpeene	Du 1er au 7 septembre	Très élevée	OUI	OUI	OUI	1

Le tableau des risques mildiou est réalisé à partir de prévisions météorologiques à 48 heures. Si les conditions météorologiques constatées diffèrent des prévisions (pluies, brumes, brouillard...) il se peut que les risques évoluent.

Nord et Pas de Calais - Situation au niveau de Mileos® et analyse des risques du 8 au 10 septembre :

ANALYSE DES RISQUES

La pression mildiou est élevée depuis une quinzaine de jour.

Depuis le dernier BSV, La météo a été favorable au mildiou sur la période du 1er au 7 septembre (hygrométrie nocturne et matinale élevée, températures douces). **Des contaminations fréquentes voire continues ont été enregistrées et le seuil indicatif de risque a été atteint sur la quasi-totalité des postes** (voir le détail poste par poste en 3ème colonne du tableau des risques mildiou).

Les conditions climatiques favorables au mildiou relevées depuis mi-août ont relancé les cycles. **Les réserves de spores, alimentées par les contaminations régulières, sont à un niveau TRES ELEVE sur la très grande majorité des postes.**

☑ *Pour rappel, il faut que la réserve de spores soit au minimum à un niveau « moyen » et que les conditions météorologiques soient favorables au mildiou pour que le seuil indicatif de risque soit atteint (voir explications détaillées en page 3).*

- **Ce mardi, la météo est favorable au mildiou** (températures douces, hygrométrie nocturne et matinale élevée, précipitations prévues dans l'après-midi). **Des contaminations sont enregistrées par le Modèle Miléos sur la quasi-totalité des postes.**

- Mercredi et jeudi, la météo devrait rester localement propice au mildiou avec une hygrométrie nocturne et matinale élevée par endroit, il faudra rester vigilant.

SITUATION AU NIVEAU DE MILEOS®

Les parcelles sont pour la plupart en sénescence avancée.

Quelques taches de mildiou sont signalées en parcelles cette semaine, conséquence des contaminations enregistrées depuis une quinzaine de jours.

- **Le seuil indicatif de risque est atteint à compter D'AUJOURD'HUI, pour les variétés sensibles, intermédiaires et résistantes, sur les postes de** Avesnes Les Aubert, Esnes, Fressies, Thiant, Ambricourt, Aix Noulette, Berles au Bois, Bonnières, Boursies, Gomicourt, Croisette, Hermaville, Izel Les Equerchins, Saint Pol sur Ternoise, Tilloy Les Mofflaines, Ternas, Calonne Sur La Lys, Hesdigneul Les Bethunes, Lillers, Lorgies, Mametz, Allesnes Les Marais, Frelinghien, Orchies, Andres, Bailleul, Caestre, Hondschoote, Pitgam, Steenbecque, Teteghem, Wormhout et Zuytpeene.
- **Le seuil indicatif de risque est atteint à compter D'AUJOURD'HUI, pour les variétés sensibles et intermédiaires, sur les postes de** Haucourt, Auchy Les Mines, et Vieille Eglise.
- **Le seuil indicatif de risque est atteint à compter D'AUJOURD'HUI, pour les variétés sensibles uniquement, sur le poste de** Merckeghem.

☒ *Utiliser en priorité des moyens de lutte alternatifs aux traitements conventionnels, des méthodes biologiques ou des solutions de biocontrôle autorisées. En cas de nécessité d'intervention chimique de synthèse, privilégier les produits présentant le plus faible risque pour la santé et l'environnement.*

- **Le seuil indicatif de risque n'est pas atteint quelle que soit la sensibilité variétale pour le poste de Ohain, Les parcelles peuvent rester sans protection.**

☒ *Sur la base des observations réalisées sur les seules parcelles du réseau d'épidémiosurveillance, l'évaluation du risque pour ce bioagresseur indique qu'aucune intervention n'est nécessaire à ce stade. Une observation directe de vos propres parcelles vous permettra de confirmer ou non cette évaluation du risque.*

LIMACES

RAPPEL SEUIL INDICATIF DE RISQUE :

4 limaces par m² (piégeage réalisé à l'aide de 4 pièges pour une surface totale de 1m²)



Evolution du risque



Le réseau de l'observatoire anti-limaces est un réseau de piégeage des limaces mis en place depuis plusieurs années en partenariat avec McCain, Pom'Alliance et la Chambre d'Agriculture du Nord Pas de Calais.

Le réseau de piégeage 2026 est composé de **24 parcelles présentant pour la plupart un risque limace avéré.**

Les relevés des pièges sont réalisés chaque lundi par les agriculteurs eux mêmes selon un protocole harmonisé.

- ▶ **Les précipitations significatives de ces dernières semaines sont favorables à l'activité des limaces,**
- ▶ **Surveillez les parcelles à risques.**

TAUPINS

Dans la continuité des observations effectuées la semaine passée, **19 parcelles** ont fait l'objet d'évaluation de l'activité des taupins cette semaine.

Ce qu'il faut retenir :

- **63 % (soit 12 parcelles)** d'entre-elles ne présentent **aucune activité de la larve**. Les secteurs observés sont Flandre Maritime, Hainaut - Cambrésis, Lille, Béthunois, Flandre intérieure, Artois, Cambrésis et Ternois.

Ceci n'est qu'un échantillonnage, il est nécessaire de réaliser des comptages dans vos parcelles, sur ces secteurs cités, puisque le taupin peut-être actif selon différents paramètres, comme type de sol, irrigation, type de variété, environnement de la parcelle (boisé)...

- **37 % (soit 7 parcelles)** d'entre-elles présentent **moins de 1 morsure par tubercule en moyenne**. Elles sont localisées sur les secteurs du Ponthieu, Flandre Maritime, Artois, Béthunois et Flandre intérieure. Les variétés concernées sont Fontane et Manitou.

Recommandations :

- Prenez soin d'observer les 3 à 5 premiers rangs de bordure des champs. Des dégâts pourraient y être présents, contrairement au reste de la parcelle. Cela permet de ne pas polluer un lot à destination de la commercialisation ;
- Poursuivez vos observations, au moment de la récolte et durant le stockage.

Les observations reposent sur les :

1- Observations à la récolte sur 25 tubercules

Réaliser des comptages sur 25 tubercules, issus de 5 pieds. Comptabilisés le nombre de morsures par tubercule et faites la moyenne sur les 25 tubercules.

2- Observations au triage - stockage sur 10 kg de pommes de terre

Il est courant de ne pas observer de morsures de taupin au moment de la récolte mais plutôt au conditionnement des pommes de terre. Nous vous invitons à poursuivre vos notations tout au long du stockage. L'appréciation se réalisera sur 10 kg de pommes de terre.

Larve de taupin sur variété Esmée
Photo : D. Boinet - Agriculteur



Quelle que soit la nature de l'observation, l'appréciation des dégâts s'effectue comme suit :

· Absence

· < à 1 morsure

· 1 à 2 morsures

· 3 à 5 morsures

· > à 5 morsures.

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l'écologie, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018.

Rédactrice et animatrice filière pour le secteur Nord-Pas de Calais : Christine Haccart - Chambre d'Agriculture du Nord Pas de Calais (Tél : 06.74.35.36.52)

Animateurs filière pour le secteur Picardie : Valérie Pinchon - FREDON Hauts de France (Tél : 03.22.33.67.11) et Pierre-Baptiste Blanchant—Chambre d'Agriculture de la Somme (Tél : 03.22.95.51.20)

Expertise Miléos : Arvalis Institut du Végétal

Bulletin édité sur la base des observations réalisées par les partenaires du réseau : AG Conseil, Arvalis Institut du Végétal, AgroPomConseil, Campus agro environnemental 62, CERESIA, CETA des Hauts de Somme, Chambre d'Agriculture de la Somme, Chambre d'Agriculture du Nord Pas de Calais, Chambre d'Agriculture de l'Oise, Chambre d'Agriculture de l'Aisne, Comité Nord, Coopérative de Vecquemont, Desmazières SA, Expandis, FREDON Hauts-de-France, Le GAPPI, GC la Pomme de Terre, Intersnack, IPM France, Ets Jourdain, Mc Cain, Pom'Alliance, Réseau Vitalis, Sana Terra, Select'up, le SETAB, SRAL, Touquet Savour.

Ferme des Tilleuls, M Debarge, M Henno, M Ruyssen, M Cabry, M Lefranc, M Gosse de Gorre, M Cannesson, M Dequeker, M Dequidt, M Clay, M Boinet.

Coordination et renseignements : Samuel Bueche - Chambre d'Agriculture du Nord Pas de Calais (Tél: 03.21.60.57.60)

Aurèle Albaut - Chambre d'Agriculture de la Somme (Tél : 03 22 85 32 11).

