



Grandes Cultures – Pommes de terre – Légumes industriels

N° 35

06/10/26

A RETENIR (CTRL – CLIC POUR SUIVRE LE LIEN) :

Colza : stade cotylédons à 7 feuilles vraies. Augmentation des captures de grosses altises. Augmentation des symptômes de morsures de petites et grosses altises. Peu de dégâts de limaces. Augmentation de la pression pucerons verts. Présence de punaises.

METEO

STATION DE LIEUSAIN (77)

	mar. 6	mer. 7	jeu. 8	ven. 9	sam. 10	dim. 11	lun. 12
	0	11.6	2.6	0.7	1.6	0	0
	37 / 74	68 / 96	41 / 89	63 / 87	48 / 83	44 / 93	40 / 72
	10 / 25	13 / 20	8 / 16	6 / 15	11 / 18	8 / 17	10 / 19

Source : Sencrop - Modèle : METEOBLUE

COLZA

20 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU


STADES

Les colzas continuent d'évoluer lentement et les écarts se creusent entre les parcelles.

Plusieurs parcelles du réseau ont été ressemées partiellement afin de compenser le manque de pieds.

Les parcelles les moins avancées sont au stade cotylédons, les plus avancées au stade 7 feuilles vraies.

Répartition des stades (en %)
par semaine d'observation - Automne 2026



Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Région Île de France sur la base d'observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, il ne peut se substituer à une observation personnelle dans sa parcelle.

Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.

Pour vous abonner faites votre demande à ecophyto@idf.chambagri.fr en spécifiant la filière.



La stratégie
écophyto 2030
Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

RAVAGEURS

Altises des crucifères (petites altises)



Des individus ont été capturés dans 3 parcelles parmi les 14 relevées :

- 5 à Sancy-lès-Provins (77) ;
- 2 à Mondreville (78) ;
- 6 à Videlles (91).

A RETENIR

Risque : faible.

Stade de sensibilité : de la levée au stade 3 feuilles.

Seuil indicatif de risque : 8 pieds / 10 avec morsures et 25 % de surface foliaire atteinte.

Grosses altises (altises d'hiver)




19 parcelles observées cette semaine. La fréquence de capture est en augmentation par rapport à la semaine dernière. Elle se situe dans la moyenne des 10 dernières années.




Source : CARIDF

Suivi des fréquences de captures de grosses altises à l'automne 2026 en région Ile-de-France




La pression continue d'augmenter par rapport à la semaine dernière, avec en moyenne 23,8 individus capturés par piège. Cette moyenne est fortement influencée par la parcelle de Saint-Martin-de-Bréthencourt (78) avec 186 individus capturés. En excluant cette parcelle, la moyenne s'établit à 14,8 individus / piège en moyenne, un niveau supérieur à la moyenne des dernières années.


Suivi des captures de grosses altises à l'automne 2026 en région Ile-de-France



Piégeage : Dès le semis, enterrez une cuvette jaune afin de connaître le début du vol. Venez observer 2 à 3 fois par semaine pendant la phase de levée.




Des morsures d'altises (des crucifères et des altises d'hiver confondues) sont observées dans l'ensemble des parcelles observées (15 au total) :



40 % des parcelles du réseau sont au stade de sensibilité aux morsures d'altises.

La pression est en augmentation par rapport à la semaine dernière. En moyenne, 57 % des plantes présentent des morsures. La surface foliaire détruite est également en hausse, avec 15,6 % de la surface affectée en moyenne, contre 9,5 % la semaine dernière.

La pression observée est supérieure à la moyenne des 10 dernières années.



A RETENIR

Risque : moyen, sortie progressive des parcelles du stade de sensibilité.

Stade de sensibilité : de la levée au stade 3 feuilles.

Seuil indicatif de risque : 8 pieds / 10 avec morsures **et** 25 % de surface foliaire atteinte.

• Limaces



2 parcelles signalent des dégâts de limaces :

- Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux (77) : 3 % de surface foliaire détruite ;
- Sancy-lès-Provins (77) : 1 % de surface foliaire détruite.

Il est nécessaire de surveiller le risque à la parcelle. Le risque est plus important dans les parcelles avec de nombreux résidus de pailles et/ou avec une préparation de sol motteuse.

Piégeage :

Vous pouvez disposer 4 bâches de 0,25 m² bien humidifiées et maintenues au sol. Les pièges sont installés le soir pour un relevé le lendemain matin de bonne heure. La localisation des pièges devra être modifiée à chaque relevé.


A RETENIR

Risque : faible.

Stade de sensibilité : de la levée au stade 3 feuilles.

Seuil indicatif de risque : présence de dégâts foliaires visibles et conditions favorables à l'activité des limaces.

• Pucerons verts



Les signalements sont en augmentation cette semaine. Des pucerons verts ont été observés dans 76 % des parcelles du réseau (17 observées) :

Commune	Variété / tolérance TuYV	% de plantes avec individus
Boitron (77)	CEOS : tolérante	5 %
Crisenoy (77)	BLACKPANTHER : tolérante	20 %
Jouy-le-Châtel (77)	KWS DOMINGOS : tolérante	15 %
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux (77)	Mélange : tolérantes	10 %
Sancy-lès-Provins (77)		80 %
Saint-Illiers-la-Ville (78)	Mélange : tolérantes	1 %
Saint-Martin-de-Bréthencourt (78)	Mélange : tolérantes	40 %
Abbéville-la-Rivière (91)	Mélange : non tolérantes	30 %
Gironville-sur-Essonne (91)	Mélange : non tolérantes	20 %
Mondreville (91)	HEDEN : tolérante	1 %
Videlles (91)	CEOS : tolérante	67 %
Attainville (95)	KWS DOMINGOS : tolérante	70 %
Vallangoujard (95)	KWS DOMINGOS : tolérante	80 %

95 % des parcelles sont au stade de sensibilité (≤ 6 feuilles vraies).

Le seuil indicatif de risque pour les variétés non tolérantes est dépassé sur deux parcelles du réseau : Abbéville-la-Rivière (91) et Gironville-sur-Essonne (91).

• Comment observer ce ravageur ?

En retournant les feuilles et en observant minutieusement la face inférieure.

A RETENIR

Risque : moyen.

Stade de sensibilité : de la levée au stade 6 feuilles.

Seuil indicatif de risque sur variétés non résistante TuYV : 20 % de plantes porteuses d'au moins un puceron vert.

• Charançon du bourgeon terminal



2 parcelles ont capturé chacune un individu : Boitron (77) et Saint-Martin-de-Bréthencourt (78).

A ne pas confondre avec le baris (insecte sans poils, noir à reflet bleu-vert de même taille que le charançon du bourgeon terminal - 2,5 à 3,5 mm) et le charançon gallicole du chou qui est de plus petite taille (2-2,5 mm), de couleur gris noirâtre avec le bout des pattes noir.

A RETENIR

Risque : faible.

Stade de sensibilité : de la levée (stade A cotylédons étalés) au stade rosette, 100 % des parcelles de colza sont au stade sensible.

Seuil indicatif de risque : il n'existe pas de seuil de risque pour le charançon du bourgeon terminal. On considère que 8-10 jours après le début du vol (en pratique au PIC DE VOL), les femelles ont acquis la capacité de ponte, ce qui représente un risque pour la culture dès lors que les conditions climatiques sont favorables à l'activité de l'insecte.

• Punaies

Les conditions extrêmes de l'été 2026 ont conduit à des pullulations de ces insectes polyphages thermophiles, dont plusieurs espèces ont déjà été identifiées en France. Les punaises cherchent actuellement des sources de nourriture (repousses de colza, jeunes colzas en cours de levée, mais aussi d'autres espèces céréales, graminées, légumineuses...) dans un contexte de pénurie liée à la sécheresse.

Les colonisations se font via les parcelles adjacentes et se caractérisent par des déplacements en masse « en ordre serré » dans les parcelles, en commençant par les 20-30 m de bords de champs. Dépourvues d'ailes à ce stade (stade larvaire), les punaises fourmillent, piquent les feuilles et épuisent les plantules qui fanent très rapidement.

Les signalements sont en hausse en Ile-de-France, et plus particulièrement dans le sud de la région. L'arrivée de la pluie dans les prochains jours devrait permettre de réduire l'activité de ce ravageur.




Illustration de différents stades de l'espèce *Nysius cymoides* - a) Larve stade III (1,0 mm) ; b) Larve stade IV (1,5 mm) ; c) Larve stade V (2,2 mm) ; d) Adulte mâle (2,5 mm). La taille correspond à la mesure entre l'extrémité de la tête et l'extrémité de l'abdomen (photos : laboratoire d'Éco-Entomologie - J.-D. Chapelin-Viscardij).

- Plus d'infos [en cliquant ici](#) sur le site de Terres Inovia.

- Signaler les attaques sur colza via [l'enquête mise en ligne](#) par Terres Inovia.

Aucune méthode de lutte n'est actuellement homologuée contre ces insectes sur colza. Lors des précédentes attaques, les précipitations (voire irrigations) contribuaient à disperser les larves.

Vous trouverez sur le site de la DRIAIF les fiches des Organismes Réglementés de la filière :

<https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-grandes-cultures-r739.html>,

<https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-pomme-de-terre-r737.html>

Les notes nationales de biodiversité sont consultables sous <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/notes-nationales-biodiversite-r607.html>

Pour en savoir plus sur :

-Les résistances : <https://www.r4p-inra.fr/fr/home/>

-Les produits de biocontrôle : <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/liste-officielle-biocontrôle-avril-2023-a1709.html>

-Les adventices : <https://www.infloweb.fr/>

• Observations :

AGRICULTEURS, COOP 110 BOURGOGNE, CERESIA, ARVALIS, CARIDF, CENTREXP, COOPERATIVE ILE DE FRANCE SUD, COOP SEVEPI, Ets SOUFFLET AGRICULTURE, FREDON IDF, ITB IDF, SRAL, SUCRERIE CRISTAL UNION, SUCRERIE TEREOS, TERRES INOVIA.

• Rédaction :

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE DE FRANCE : Hugues BERGAMINI, Nicolas GREAUME, Valentine BOULLENGER, Clément LECLERCQ, Claire TURILLON.

FREDON Ile de France : Céline GUILLEM.

• Comité de relecture :

ARVALIS, Chambre d'Agriculture de Région Île de France, TERRES INOVIA, ITB, SRAL.