

Abonnez-vous
gratuitement
aux BSV de la région
Occitanie



A retenir

COLZA

Petites altises : Risque faible pour les parcelles n'ayant pas atteint le stade 3 feuilles, nul ailleurs. A mesure que nous nous éloignons de la fin d'été, les vols de petites altises se font de plus en plus rares, limitant les risques d'attaques pour les colzas en cours de levée.

Grosse altise : Risque faible dans les parcelles n'ayant pas atteint le stade 4 feuilles, nul ailleurs. Surveillez les dynamiques de vol au cours des prochains jours, notamment en cas de baisses de températures à la suite d'éventuels épisodes pluvieux.

Limaces : Risque faible à modéré pour les colzas n'ayant pas dépassé le stade 3 feuilles, **à la date de ce BSV**. Au regard des prévisions de pluies pour les 8 prochains jours, il convient de surveiller attentivement d'éventuelles arrivées en parcelle, notamment pour les parcelles les moins avancées et/ou les plus pénalisées par le sec !

Héliothis : Risque modéré vis-à-vis des larves pour les parcelles en cours de levée, jusqu'au stade 3-4 feuilles.

Des dégâts de **taupins, fourmis et surtout vers gris** sont aussi régulièrement observés en parcelle.

Annexes

Reconnaissance des stades du colza à l'automne

Fiche ambroisie

Directeur de publication :

Denis CARRETIER
Président de la Chambre
Régionale d'Agriculture
d'Occitanie
BP 22107
31321 CASTANET
TOLOSAN Cx
Tel 05.61.75.26.00

Dépôt légal : à parution

Comité de validation :
Arterris, Arvalis Institut du
Végétal, Chambres
d'Agriculture de Hte-
Garonne et du Tarn,
Chambre régionale
d'Agriculture d'Occitanie,
DRAAF Occitanie, Qualisol,
RAGT, Terres Inovia, Val
de Gascogne, Vivadour,

écophyto
Réduire et améliorer l'utilisation des phytos


Action du plan Ecophyto piloté
par les ministères en charge de
l'agriculture, de l'écologie, de la
santé et de la recherche, avec
l'appui technique et financier de
l'Office français de la
Biodiversité

COLZA

ANALYSE DE RISQUE ELABOREE A L'ECHELLE DU TERRITOIRE OUEST OCCITANIE

Le réseau d'observations colza de la Surveillance Biologique du Territoire (SBT) est en cours de construction. L'élaboration de l'analyse de risque 2026-2027 est établie sur les territoires Aquitaine et Ouest-Occitanie à partir de parcelles fixes qui font l'objet d'observations hebdomadaires. Cette semaine, l'analyse de risque est établie à partir de **8 parcelles observées**.

Parcelles BSV observées du 2026-09-24 au 2026-09-30





Vous êtes agriculteur, conseiller agricole, etc. ? La surveillance de l'état sanitaire et la performance du colza vous intéresse ?

Alors n'hésitez plus, intégrez le réseau BSV en Aquitaine et Midi-Pyrénées/Ouest-Audois et devenez observateur colza !



Demandez plus d'information à vos animateurs filières Terres Inovia : q.level@terresinovia.fr pour les départements 24, 32, 33, 40, 47, 64, 65 ou


q.lambert@terresinovia.fr pour les départements 09, 11, 12, 31, 46, 81, 82.

AVERTISSEMENT

Au regard du contexte particulièrement chaud et sec de l'été 2026, certaines espèces phytophages, dont les ressources alimentaires habituelles sont actuellement limitées dans leur habitat naturel, peuvent migrer vers les colzas, occasionnant par endroits d'importants dégâts. Il convient d'être particulièrement vigilant sur l'évolution de l'état physiologique des colzas dès la levée, et de signaler tout symptômes ou disparition de pieds suspecte auprès de votre technicien.

• Stades phénologiques et état des cultures

Du fait de dates de semis très éparses selon les secteurs (précocité des préparations de sols, cumuls de pluies au cours des mois d'août et de septembre), les stades s'étalent de levée en cours à B7 (BBCH 17 : 7 feuilles vraies étalées ou déployées) à l'échelle du réseau. Le faible nombre de remontées d'observations (8 cette semaine) ne permet pas de définir de manière représentative la répartition des stades en présence.



Les conditions sèches du mois de septembre demeurent défavorables au développement des colzas, se traduisant, notamment pour les semis de fin-août à début septembre en conditions sèches ou faiblement réhumectées, par des levées échelonnées et hétérogènes, accompagnées de faibles niveaux d'accumulation de biomasse, augmentant la sensibilité de la culture vis-à-vis des ravageurs. Dans certaines situations, le manque d'eau empêche la germination des colzas, avec par endroits des levées non-déclenchées depuis plus de 15 jours. Parmi ces cas de figure, il peut être constaté la présence d'enveloppes de graines vidées de leur contenu, possiblement en raison d'un dessèchement précoce après germination et/ou d'attaques de ravageurs du sol. Les cumuls prévus pour les jours à venir, faibles (10 à 20mm) au regard de l'état de sécheresse exceptionnel des sols, et aléatoires, découragent les semis encore non-réalisés, hormis dans certains secteurs (Sud Landes, Pyrénées Atlantiques) où de nouvelles tentatives de semis pourraient avoir lieu en cas de pluies significatives (> 15mm) en raison d'une pression historiquement moindre vis-à-vis des ravageurs et de levées potentiellement rapides et

vigoureuses. Néanmoins, ces pluies soulageront, ne serait-ce que temporairement, les colzas les plus chétifs.

Localement, les attaques cumulées de divers ravageurs (taupins, vers gris, petites altises), couplées à des conditions défavorables de levée et de croissance des colzas, ont localement mené à des retournements partiels ou totaux de parcelles. Ailleurs, les quelques semis qui ont pu lever dans de bonnes conditions voient leur état de salissement être dégradé par la présence, parfois en nombre, d'adventices plutôt habituelles pour la culture (repousses de céréales notamment), mais aussi d'adventices estivales (sétaires, panic, parfois datura, xanthium, etc.), en lien avec les fortes chaleurs de cette fin d'été.

• **Autres ravageurs, pas si secondaires que ça cette année !**

Taupins

Des signalements ponctuels hors réseau (Pyrénées Atlantiques, Tarn, Lot-et-Garonne) au cours des semaines passées, difficilement quantifiables au regard du caractère très localisé et irrégulier des attaques. Certains facteurs peuvent aggraver les risques d'attaques (précédent jachère ou prairie, sols très riches en MO, attaques au cours des 3-4 dernières campagnes, etc.)

N'hésitez pas à alerter votre technicien en cas de doute sur l'origine d'un manque de peuplement sur certaines zones de votre parcelle.

Fourmis

Ici aussi, des signalements ponctuels hors réseau (Haute-Garonne, Aude, Tarn, Dordogne), difficilement quantifiables au regard du caractère très localisé des attaques.

Vers gris

Des attaques plus fréquentes et intenses qu'à l'accoutumée ont pu être remontées sur le territoire au cours des 15 derniers jours. Les facteurs de nuisibilité sont multiples, entre des conditions météorologiques favorables aux pontes de noctuelles terricoles, et des colzas peu vigoureux, peu dynamiques, davantage sensibles aux dégâts de ravageurs.

• **Altises des crucifères ou Petites Altises (*Phyllotreta* sp.)**

Hormis une parcelle ayant capturé quelques petites altises en cuvette (3), et en raison d'un faible nombre de remontées, ainsi que d'une majorité de colzas ayant dépassé le stade de sensibilité vis-à-vis des altises, il n'y a pas de remontées de dégâts en parcelle cette semaine au sein du réseau.

Pour rappel, l'évaluation du risque se fait sur plante, en prenant en compte le nombre de pieds avec morsures et la surface foliaire touchée. Ne pas protéger hâtivement une parcelle sans avoir atteint le seuil indicatif de risque. L'observation du ravageur peut être complétée par des relevés sur la cuvette jaune.

Soyez attentifs dans les bordures de parcelles, notamment pour les derniers semis en dates et/ou pour les colzas les plus chétifs et maintenez en place les repousses de colza dans les parcelles avoisinantes.



Cuvette jaune en situation (photo Terres Inovia).

Période de risque : de la levée jusqu'au stade 3 feuilles compris.

Seuil indicatif de risque : 8 pieds sur 10 avec morsures et 25% de la surface foliaire atteinte.

Évaluation du risque : Risque faible dans les parcelles n'ayant pas dépassées le stade 3 feuilles. Nul dans les autres situations.

A mesure que nous nous éloignons de la fin d'été, les vols de petites altises se font de plus en plus rares, limitant les risques d'attaques pour les colzas en cours de levée. La surveillance reste néanmoins de mise pour les parcelles n'ayant pas dépassé le stade 3 feuilles et/ou présentant un état chétif, notamment en bordures.

- **Altise d'hiver ou Grosse altise (*Psylliodes chrysocephala*)**

Comme la semaine dernière, quelques individus isolés peuvent être observés dans les cuvettes mais les conditions climatiques n'ont pas encore été favorables au déclenchement du vol. Les légères baisses de températures prévues cette semaine et en fin de semaine prochaine, en cas de pluies, seront susceptibles de déclencher de premiers vols.



Grosse altise sur colza (photo Terres Inovia).


Période de risque : de la levée jusqu'au stade 4 feuilles compris.


Seuil indicatif de risque : 8 pieds sur 10 avec morsures et 25% de la surface foliaire atteinte. 3 pieds sur 10 pour les levées tardives au-delà du 15/09.

Évaluation du risque : Risque faible à ce jour pour les semis tardifs peu vigoureux, n'ayant pas dépassés le stade 4 feuilles. Risque nul pour les colzas développés ayant dépassé le stade de sensibilité.

De premières captures en cuvette, mais pas de remontées de dégâts à l'échelle du réseau. Au vu de la faible croissance des colzas en conditions sèches, il convient de surveiller attentivement les dynamiques de vol au cours des prochaines semaines, notamment pour les derniers semis en date !

Comparaison pluriannuelle de la dynamique de piégeage de la grosse altise (GA)
Nb moyen de grosse altise / cuvette (hors valeurs nulles, et valeur maxi à 50 insectes)
Suivi BSV colza sur Aquitaine et Ouest Occitanie





Piege enterre : Nb d'altises d'hiver (grosses altises) : ● [0 - 0] ● [0 - 3]

• **Héliothis ou Noctuelle de la tomate (*Helicoverpa armigera*)**

Les retours de dégâts sont moindres cette semaine, témoignant d'attaques ponctuelles et rapides, avec parfois d'impressionnants dégâts constatés localement. La surveillance reste de mise pour les colzas en cours de levée n'ayant pas dépassés le stade 4-5 feuilles.

N'hésitez pas à alerter votre technicien en cas de doute sur l'origine d'un manque de peuplement ou de surface foliaire fortement impactée sur votre parcelle, en l'absence d'autres ravageurs connus (limaces, altises, etc.).



Larves d'Héliothis sur feuilles de Colza (photos NOVASOL).

Évaluation du risque : Risque modéré, surveiller vos parcelles.

• Limaces

Les conditions météorologiques demeurent défavorables au développement et à l'activité des limaces, avec aucune attaque recensée cette semaine. Néanmoins, les annonces de pluies à venir pourraient rapidement inverser cette situation.

Le risque limace est à moduler en fonction du stade, de la dynamique de croissance, de la conduite d'irrigation (attention en contexte d'arrosage au démarrage), de l'historique de la parcelle, des pratiques d'interculture, et de l'état de surface du sol (présence de résidus végétaux, de mottes, état de fermeture du sillon).

Période de risque : de la levée jusqu'au stade 3 feuilles compris.

Évaluation du risque : Risque faible à modéré dans les parcelles n'ayant pas atteint le stade 3 feuilles. Nul pour les parcelles ayant dépassées ce stade.

Les retours de pluies prévus pour les prochains jours pourront être favorables à l'arrivée en parcelle de populations de limaces. Il est donc important de suivre les déplacements et l'activité de ces ravageurs, notamment pour les implantations les plus tardives et/ou les plus difficiles (sols secs, motteux, présence de résidus pailleux, etc.), au regard de l'état de développement des colzas en présence.

• Tenthrede de la rave

Des adultes peuvent être observés dans la cuvette jaune (sans danger direct, indique la présence du ravageur dans la parcelle). Aujourd'hui, aucun dégât n'est observé sur le réseau. Ce ravageur est à suivre jusqu'à l'atteinte du stade 6 feuilles.

Période de risque : De la levée jusqu'au stade 6 feuilles.

Seuil indicatif de risque : 25 % de la surface foliaire détruite par les larves de tenthrèdes



Larve de tenthrède de la rave sur colza (photos Terres Inovia).

Évaluation du risque : Risque nul à ce jour.

A ce jour, pas d'attaque. Surveillez vos parcelles jusqu'au stade 6 feuilles. Soyez vigilant et très réactif en cas de pullulation.



Tenthrèdes de la rave adultes en cuvette (photos Terres Inovia).

Annexe – Notes nationales Biodiversité – BSV (cliquer sur les images)



REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Le bulletin de santé du végétal a été préparé :

- pour la filière colza par l'animateur filière de Terres Inovia et élaboré sur la base des observations réalisées par :

- Pour Ouest Occitanie : Chambres d'Agriculture de Haute-Garonne et du Tarn, Coop d'achats de Gaillac, ETS Ladeveze, Pioneer Selection, Agro Station, Terres Inovia
- Pour la région Aquitaine : Agriculteurs, Chambre d'Agriculture du Lot-et-Garonne, ETS Sansan, Terres Inovia

Ces bulletins sont produits à partir d'observations ponctuelles. S'ils donnent une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d'Occitanie dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.

Avec le soutien financier de



Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**



Annexe 1 : reconnaissance des stades du colza à l'automne



A- Stade cotylédonaire - stade A (10)

Levée : les jeunes plantes marquent la ligne.
Pas de feuilles "vraies".
Seuls les deux cotylédons sont visibles.



B- Formation de la rosette - stades B1 et B4

Stade B : apparition des feuilles.
Pas d'entre-nœuds entre les pétioles. Absence de vraie tige.
Stade B1 (11) : 1 feuille vraie étalée ou déployée (*voir ci-contre*).
Stade B2 (12) : 2 feuilles vraies étalées ou déployées.
Stade B3 (13) : 3 feuilles vraies étalées ou déployées.
Stade B4 (14) : 4 feuilles vraies étalées ou déployées (*voir ci-contre*).
Stade Bn (1n) : n feuilles vraies étalées ou déployées.
Jusqu'à B9 (19) ou davantage de feuilles étalées
ou fin de la formation de la rosette.