

Abonnez-vous
gratuitement
aux BSV de la région
Occitanie



A retenir

COLZA

Grosse altise : Grande vigilance dans les parcelles en cours de levées. Risque moyen à ce jour pour les situations n'ayant pas dépassés le stade 4 feuilles. Risque nul pour les colzas développés ayant dépassé le stade de sensibilité.

Limaces : Risque fort dans les parcelles n'ayant pas atteint le stade 4 feuilles et particulièrement dans les colzas en cours de levée. Nul pour les parcelles ayant dépassées ce stade.

Héliothis : Risque faible à moyen, surveiller vos parcelles.

Petites altises : Risque faible dans les parcelles n'ayant pas dépassées le stade 3 feuilles. Nul dans les autres situations.

Des dégâts de **taupins, fourmis et surtout vers gris** sont aussi régulièrement observés en parcelle, les conditions humides et plus fraîches devraient diminuer le risque.

Annexe


Reconnaissance des stades du colza à l'automne

COLZA

ANALYSE DE RISQUE ELABOREE A L'ECHELLE DU TERRITOIRE OUEST OCCITANIE

Le réseau d'observations colza de la Surveillance Biologique du Territoire (SBT) est en cours de construction. L'élaboration de l'analyse de risque 2026-2027 est établie sur les territoires Aquitaine et Ouest-Occitanie à partir de parcelles fixes qui font l'objet d'observations hebdomadaires. Cette semaine, l'analyse de risque est établie à partir de **13 parcelles observées**.

Parcelles BSV observées du 2026-10-01 au 2026-10-07



Directeur de publication :

Denis CARRETIER
Président de la Chambre
Régionale d'Agriculture
d'Occitanie
BP 22107
31321 CASTANET
TOLOSAN Cx
Tel 05.61.75.26.00

Dépôt légal : à parution

Comité de validation :
Arterris, Arvalis Institut du
Végétal, Chambres
d'Agriculture de Hte-
Garonne et du Tarn,
Chambre régionale
d'Agriculture d'Occitanie,
DRAAF Occitanie, Qualisol,
RAGT, Terres Inovia, Val
de Gascogne, Vivadour,

écophyto
Réduire et améliorer l'utilisation des phytos

Action du plan Ecophyto piloté
par les ministères en charge de
l'agriculture, de l'écologie, de la
santé et de la recherche, avec
l'appui technique et financier de
l'Office français de la
Biodiversité



Vous êtes agriculteur, conseiller agricole, etc. ? La surveillance de l'état sanitaire et la performance du colza vous intéresse ?

Alors n'hésitez plus, intégrez le réseau BSV en Aquitaine et Midi-Pyrénées/Ouest-Audois et devenez observateur colza !

Demandez plus d'information à vos animateurs filières Terres Inovia : q.level@terresinovia.fr pour les départements 24, 32, 33, 40, 47, 64, 65 ou

q.lambert@terresinovia.fr pour les départements 09, 11, 12, 31, 46, 81, 82.




AVERTISSEMENT

Au regard du contexte particulièrement chaud et sec de l'été 2026, certaines espèces phytophages, dont les ressources alimentaires habituelles sont actuellement limitées dans leur habitat naturel, peuvent migrer vers les colzas, occasionnant par endroits d'importants dégâts. Il convient d'être particulièrement vigilant sur l'évolution de l'état physiologique des colzas dès la levée, et de signaler tout symptômes ou disparition de pieds suspecte auprès de votre technicien.

• Stades phénologiques et état des cultures

Du fait de dates de semis très éparses selon les secteurs (précocité des préparations de sols, cumuls de pluies au cours des mois d'août et de septembre), les stades s'étalent du stade B3 (BBCH13 : 3 feuilles vraies étalées ou déployées) à B10 (BBCH 19 : 9 feuilles vraies étalées ou déployées) à l'échelle du réseau. Le faible nombre de remontées d'observations ne permet pas de définir de manière représentative la répartition des stades en présence. En effet, hors réseau des levées sont en cours grâce aux récentes pluies. L'avenir de ces colzas sera soumis aux conditions climatiques et la pression ravageurs des prochaines semaines.



Les conditions sèches du mois de septembre ont entraîné un retard de développement pour l'ensemble des colzas du Sud-Ouest. Les levées ont été échelonnées et hétérogènes, avec aujourd'hui des faibles niveaux d'accumulation de biomasse, augmentant la sensibilité de la culture vis-à-vis des ravageurs. Dans certaines situations, le manque d'eau empêche la germination des colzas. Les pluies récentes vont permettre de faire lever ces semis, en espérant qu'il y ait ensuite des relais de pluies et un automne doux pour que ces situations entrent dans la phase hivernale avec des biomasses suffisantes. Au vu des risques éventuelles, il est aujourd'hui déconseillé de semer de nouvelles parcelles.

Localement, les attaques cumulées de divers ravageurs (taupins, vers gris, petites altises), couplées à des conditions défavorables de levée et de croissance des colzas, ont localement mené à des retournements partiels ou totaux de parcelles. Ailleurs, les quelques semis qui ont pu lever dans de bonnes conditions voient leur état de salissement être dégradé par la présence, parfois en nombre, d'adventices plutôt habituelles pour la culture (repousses de céréales notamment), mais aussi d'adventices estivales (sétaires, panic, parfois datura, xanthium, etc.), en lien avec les fortes chaleurs de cette fin d'été.

• Altise d'hiver ou Grosse altise (*Psylliodes chrysocephala*)

Contrairement à la semaine dernière, les captures de grosses altises sont en augmentation cette semaine dans les cuvettes. Pour autant, les conditions climatiques n'ont pas encore été favorables au déclenchement d'un vol massif. La baisse des températures prévues cette fin de semaine pourrait massifier le phénomène.


10 parcelles piègent le ravageur à des niveaux allant de 2 à 20 individus par cuvette. La moyenne des parcelles avec grosses altises est de 7,3 individus par piège.

Pour autant, le niveau d'attaque est très faible en parcelle (% de plantes avec morsure et % de surface foliaire attaqué). C'est bien ces deux éléments (+ le stade) qui déterminent l'intérêt d'une protection.




Grosse altise sur colza (photo Terres Inovia).

Parcelles observées du 2026-10-01 au 2026-10-07



Piège enterré : Nb d'altises d'hiver (grosses altises) : ● [0-0] ● [0-5] ● [5-20]

Comparaison pluriannuelle de la dynamique de piégeage de la grosse altise (GA)
Nb moyen de grosse altise / cuvette (hors valeurs nulles, et valeur maxi à 50 insectes)
Suivi BSV colza sur Aquitaine et Ouest Occitanie



Période de risque : de la levée jusqu'au stade 4 feuilles compris.

Seuil indicatif de risque : 8 pieds sur 10 avec morsures et 25% de la surface foliaire atteinte.
3 pieds sur 10 pour les levées tardives au-delà du 15/09.

Évaluation du risque : Grande vigilance dans les colzas en cours de levée. Risque moyen à ce jour pour les situations n'ayant pas dépassés le stade 4 feuilles. Risque nul pour les colzas développés ayant dépassés le stade de sensibilité.

Les captures s'intensifient cette semaine, tout en restant à un niveau bas pour la période comparé aux précédentes campagnes. Des captures en cuvette, mais pas de remontées de dégâts à l'échelle du réseau. Au vu du faible développement des colzas (faible biomasse), il convient de surveiller attentivement les dynamiques de vol au cours des prochaines semaines, notamment pour les derniers semis.

- **Limaces**

Les conditions météorologiques deviennent favorables à l'activité des limaces, **grande vigilance dans les parcelles qui n'ont pas atteint 4 feuilles.**

Le risque limace est à moduler en fonction du stade, de la dynamique de croissance, de l'historique de la parcelle, des pratiques d'interculture, et de l'état de surface du sol (présence de résidus végétaux, de mottes, état de fermeture du sillon).

Période de risque : de la levée jusqu'au stade 3 feuilles compris.

Évaluation du risque : Risque fort dans les parcelles n'ayant pas atteint le stade 4 feuilles, particulièrement dans les colzas en cours de levée. Nul pour les parcelles ayant dépassées ce stade.

Les retours des pluies est favorable à l'activité des populations de limace. Il est donc important de suivre les déplacements et l'activité de ces ravageurs, notamment pour les implantations les plus tardives et/ou les plus difficiles (sols motteux, présence de résidus pailleux, etc.), au regard de l'état de développement des colzas en présence.

- **Autres ravageurs, pas si secondaires que ça cette année !**

Taupins

Des signalements ponctuels hors réseau (Pyrénées Atlantiques, Tarn, Lot-et-Garonne) au cours des semaines passées, difficilement quantifiables au regard du caractère très localisé et irrégulier des attaques. Certains facteurs peuvent aggraver les risques d'attaques (précédent jachère ou prairie, sols très riches en MO, attaques au cours des 3-4 dernières campagnes, etc.)

N'hésitez pas à alerter votre technicien en cas de doute sur l'origine d'un manque de peuplement sur certaines zones de votre parcelle.

Les attaques devraient diminuer avec l'arrivée des conditions humides et plus fraîches.

Fourmis

Ici aussi, des signalements ponctuels hors réseau (Haute-Garonne, Aude, Tarn, Dordogne), difficilement quantifiables au regard du caractère très localisé des attaques.

Les attaques devraient diminuer avec l'arrivée des conditions humides et plus fraîches.

Vers gris

Des attaques plus fréquentes et intenses qu'à l'accoutumée ont pu être remontées sur le territoire au cours des 3 dernières semaines. Les facteurs de nuisibilité sont multiples, entre des conditions météorologiques favorables aux pontes de noctuelles terricoles, et des colzas peu vigoureux, peu dynamiques, davantage sensibles aux dégâts de ravageurs.

- **Héliothis ou Noctuelle de la tomate (*Helicoverpa armigera*)**

Aucun retour de dégât cette semaine. La surveillance reste de mise pour les colzas en cours de levée n'ayant pas dépassés le stade 4-5 feuilles.

N'hésitez pas à alerter votre technicien en cas de doute sur l'origine d'un manque de peuplement ou de surface foliaire fortement impactée sur votre parcelle, en l'absence d'autres ravageurs connus (limaces, altises, etc.).



Larves d'Héliothis sur feuilles de Colza (photos NOVASOL).

Évaluation du risque : Risque faible à moyen, surveiller vos parcelles.

- **Tenthrede de la rave**

Des adultes peuvent être observés dans la cuvette jaune (sans danger direct, indique la présence du ravageur dans la parcelle). Aujourd'hui, aucun dégât n'est observé sur le réseau. Ce ravageur est à suivre jusqu'à l'atteinte du stade 6 feuilles.

Période de risque : De la levée jusqu'au stade 6 feuilles.

Seuil indicatif de risque : 25 % de la surface foliaire détruite par les larves de tenthrèdes



Larve de tenthrède de la rave sur colza (photos Terres Inovia).

Évaluation du risque : Risque nul à ce jour.

A ce jour, pas d'attaque. Surveillez vos parcelles jusqu'au stade 6 feuilles. Soyez vigilant et très réactif en cas de pullulation.



Tenthrèdes de la rave adultes en cuvette (photos Terres Inovia).

- **Altises des crucifères ou Petites Altises (*Phyllotreta sp.*)**

Hormis une parcelle ayant capturé quelques petites altises en cuvette (3), aucune remontée dans le réseau cette semaine. Pas d'activité hors réseau.

Pour rappel, l'évaluation du risque se fait sur plante, en prenant en compte le nombre de pieds avec morsures et la surface foliaire touchée. Ne pas protéger hâtivement une parcelle sans avoir atteint le seuil indicatif de risque. L'observation du ravageur peut être complétée par des relevés sur la cuvette jaune.

Soyez attentifs dans les bordures de parcelles, notamment pour les derniers semis en dates et/ou pour les colzas les plus chétifs et maintenez en place les repousses de colza dans les parcelles avoisinantes.



Période de risque : de la levée jusqu'au stade 3 feuilles compris.

Seuil indicatif de risque : 8 pieds sur 10 avec morsures et 25% de la surface foliaire atteinte.

Évaluation du risque : Risque faible dans les parcelles n'ayant pas dépassées le stade 3 feuilles. Nul dans les autres situations.

A mesure que nous nous éloignons de la fin d'été, les vols de petites altises se font de plus en plus rares, limitant les risques d'attaques pour les colzas en cours de levée.

Annexe – Notes nationales Biodiversité – BSV (cliquer sur les images)



REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Le bulletin de santé du végétal a été préparé :

- pour la filière colza par l'animateur filière de Terres Inovia et élaboré sur la base des observations réalisées par :

- Pour Ouest Occitanie : Chambres d'Agriculture de Haute-Garonne et du Tarn, Coop d'achats de Gaillac, ETS Ladeveze, Pioneer Selection, Agro Station, Terres Inovia
- Pour la région Aquitaine : Agriculteurs, Chambre d'Agriculture du Lot-et-Garonne, ETS Sansan, Terres Inovia

Ces bulletins sont produits à partir d'observations ponctuelles. S'ils donnent une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA d'Occitanie dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.

Avec le soutien financier de



Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**



Annexe 1 : reconnaissance des stades du colza à l'automne



A- Stade cotylédonaire - stade A (10)

Levée : les jeunes plantes marquent la ligne.
Pas de feuilles "vraies".
Seuls les deux cotylédons sont visibles.



B- Formation de la rosette - stades B1 et B4

Stade B : apparition des feuilles.
Pas d'entre-nœuds entre les pétioles. Absence de vraie tige.
Stade B1 (11) : 1 feuille vraie étalée ou déployée (*voir ci-contre*).
Stade B2 (12) : 2 feuilles vraies étalées ou déployées.
Stade B3 (13) : 3 feuilles vraies étalées ou déployées.
Stade B4 (14) : 4 feuilles vraies étalées ou déployées (*voir ci-contre*).
Stade Bn (1n) : n feuilles vraies étalées ou déployées.
Jusqu'à B9 (19) ou davantage de feuilles étalées
ou fin de la formation de la rosette.