



N°26
01/10/2026



Animateurs filières

Céréales à paille / Maïs

Philippe MOUQUOT / **CDA 33**
p.mouquot@gironde.chambagri.fr

Suppléance : ARVALIS
t.sidisaid@arvalis.fr
a.peyhorgue@arvalis.fr

Oléagineux

Quentin LAMBERT / **Terres Inovia**
q.lambert@terresinovia.fr

Prairies

Marie-Claude MAREAUX / **CDA 64**
mc.mareaux@pa.chambagri.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre Régionale
Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

Supervision site de Poitiers

La stratégie

écophyto 2030

Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.

Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Grandes
cultures N°X du JJ/MM/AA »

Edition **Aquitaine**

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT**
en cliquant sur [formulaire d'abonnement au BSV](#)

Ce qu'il faut retenir

Colza

- **Petites altises** : risque faible pour les parcelles n'ayant pas atteint le stade 3 feuilles, nul ailleurs. A mesure que nous nous éloignons de la fin d'été, les vols de petites altises se font de plus en plus rares, limitant les risques d'attaques pour les colzas en cours de levée.
- **Grosse altise** : risque faible dans les parcelles n'ayant pas atteint le stade 4 feuilles, nul ailleurs. Surveillez les dynamiques de vol au cours des prochains jours, notamment en cas de baisses de températures à la suite d'éventuels épisodes pluvieux.
- **Limaces** : risque faible à modéré pour les colzas n'ayant pas dépassé le stade 3 feuilles, à la date de ce BSV. Au regard des prévisions de pluies pour les 8 prochains jours, il convient de surveiller attentivement d'éventuelles arrivées en parcelle, notamment pour les parcelles les moins avancée et/ou les plus pénalisée par le sec !
- **Héliothis** : risque modéré vis-à-vis des larves pour les parcelles en cours de levée, jusqu'au stade 3-4 feuilles.

Des dégâts de taupins, fourmis et surtout vers gris sont aussi régulièrement observés en parcelle.

Annexes : Reconnaissance des stades du colza à l'automne

Prairies

- Les vols de papillons sont en cours ; aucune chenille n'a été observée.
- Les pontes sont probablement en cours (*corroboré par les observations faites en élevage par la FREDON64*), les émergences de la prochaine génération de chenilles devraient avoir lieu sous 8 à 15 jours. Il est donc nécessaire de continuer à surveiller les prairies sensibles.



ANALYSE DE RISQUE ELABOREE A L'ECHELLE DU TERRITOIRE OUEST OCCITANIE

Parcelles BSV observées du 2026-09-24 au 2026-09-30

Le réseau d'observations colza de la Surveillance Biologique du Territoire (SBT) est en cours de construction. L'élaboration de l'analyse de risque 2026-2027 est établie sur les territoires Aquitaine et Ouest-Occitanie à partir de parcelles fixes qui font l'objet d'observations hebdomadaires. Cette semaine, l'analyse de risque est établie à partir de 8 parcelles observées.



Vous êtes agriculteur, conseiller agricole, etc. ? La surveillance de l'état sanitaire et la performance du colza vous intéresse ?

Alors n'hésitez plus, intégrez le réseau BSV en Aquitaine et Midi-Pyrénées/Ouest-Audois et devenez observateur colza !



Demandez plus d'information à vos animateurs filières Terres Inovia : q.level@terresinovia.fr pour les départements 24, 32, 33, 40, 47, 64, 65 ou


q.lambert@terresinovia.fr pour les départements 09, 11, 12, 31, 46, 81, 82.

AVERTISSEMENT

Au regard du contexte particulièrement chaud et sec de l'été 2026, certaines espèces phytophages, dont les ressources alimentaires habituelles sont actuellement limitées dans leur habitat naturel, peuvent migrer vers les colzas, occasionnant par endroits d'importants dégâts. Il convient d'être particulièrement vigilant sur l'évolution de l'état physiologique des colzas dès la levée, et de signaler tout symptômes ou disparition de pieds suspecte auprès de votre technicien.

• Stades phénologiques et état des cultures

Du fait de dates de semis très éparées selon les secteurs (précocité des préparations de sols, cumuls de pluies au cours des mois d'août et de septembre), les stades s'étalent de levée en cours à B7 (BBCH 17 : 7 feuilles vraies étalées ou déployées) à l'échelle du réseau. Le faible nombre de remontées d'observations (8 cette semaine) ne permet pas de définir de manière représentative la répartition des stades en présence.



Les conditions sèches du mois de septembre demeurent défavorables au développement des colzas, se traduisant, notamment pour les semis de fin-août à début septembre en conditions sèches ou faiblement réhumectées, par des levées échelonnées et hétérogènes, accompagnées de faibles niveaux d'accumulation de biomasse, augmentant la sensibilité de la culture vis-à-vis des ravageurs. Dans certaines situations, le manque d'eau empêche la germination des colzas, avec par endroits des levées non-déclenchées depuis plus de 15 jours.

Parmi ces cas de figure, il peut être constaté la présence d'enveloppes de graines vidées de leur contenu, possiblement en raison d'un dessèchement précoce après germination et/ou d'attaques de ravageurs du sol. Les cumuls prévus pour les jours à venir, faibles (10 à 20mm) au regard de l'état de sécheresse exceptionnel des sols, et aléatoires, découragent les semis encore non-réalisés, hormis dans certains secteurs (Sud Landes, Pyrénées Atlantiques) où de nouvelles tentatives de semis pourraient avoir lieu en cas de pluies significatives (> 15mm). Néanmoins, ces pluies soulageront, ne serait-ce que temporairement, les colzas les plus chétifs.

Localement, les attaques cumulées de divers ravageurs (taupins, vers gris, petites altises), couplées à des conditions défavorables de levée et de croissance des colzas, ont localement mené à des retournements partiels ou totaux de parcelles. Ailleurs, les quelques semis qui ont pu lever dans de bonnes conditions voient leur état de salissement être dégradé par la présence, parfois en nombre, d'adventices plutôt habituelles pour la culture (repousses de céréales notamment), mais aussi d'adventices estivales (sétaires, panic, parfois datura, xanthium, etc.), en lien avec les fortes chaleurs de cette fin d'été.

- **Autres ravageurs, pas si secondaires que ça cette année !**

Taupins

Des signalements ponctuels hors réseau (Pyrénées Atlantiques, Tarn, Lot-et-Garonne) au cours des semaines passées, difficilement quantifiables au regard du caractère très localisé et irrégulier des attaques. Certains facteurs peuvent aggraver les risques d'attaques (précédent jachère ou prairie, sols très riches en MO, attaques au cours des 3-4 dernières campagnes, etc.) N'hésitez pas à alerter votre technicien en cas de doute sur l'origine d'un manque de peuplement sur certaines zones de votre parcelle.

Fourmis

Ici aussi, des signalements ponctuels hors réseau (Haute-Garonne, Aude, Tarn, Dordogne), difficilement quantifiables au regard du caractère très localisé des attaques.

Vers gris

Des attaques plus fréquentes et intenses qu'à l'accoutumée ont pu être remontées sur le territoire au cours des 15 derniers jours. Les facteurs de nuisibilité sont multiples, entre des conditions météorologiques favorables aux pontes de noctuelles terricoles, et des colzas peu vigoureux, peu dynamiques, davantage sensibles aux dégâts de ravageurs.

- **Altises des crucifères ou Petites Altises (*Phyllotreta* sp.)**

Hormis une parcelle ayant capturé quelques petites altises en cuvette (3), et en raison d'un faible nombre de remontées, ainsi que d'une majorité de colzas ayant dépassé le stade de sensibilité vis-à-vis des altises, il n'y a pas de remontées de dégâts en parcelle cette semaine au sein du réseau. Pour rappel, l'évaluation du risque se fait sur plante, en prenant en compte le nombre de pieds avec morsures et la surface foliaire touchée. Ne pas protéger hâtivement une parcelle sans avoir atteint le seuil indicatif de risque. L'observation du ravageur peut être complétée par des relevés sur la cuvette jaune. Soyez attentifs dans les bordures de parcelles, notamment pour les derniers semis en dates et/ou pour les colzas les plus chétifs et maintenez en place les repousses de colza dans les parcelles avoisinantes.



Cuvette jaune en situation (photo Terres Inovia).

Période de risque : de la levée jusqu'au stade 3 feuilles compris.

Seuil indicatif de risque : 8 pieds sur 10 avec morsures et 25 % de la surface foliaire atteinte.

Evaluation du risque : risque faible dans les parcelles n'ayant pas dépassées le stade 3 feuilles. Nul dans les autres situations

A mesure que nous nous éloignons de la fin d'été, les vols de petites altises se font de plus en plus rares, limitant les risques d'attaques pour les colzas en cours de levée. La surveillance reste néanmoins de mise pour les parcelles n'ayant pas dépassé le stade 3 feuilles et/ou présentant un état chétif, notamment en bordures.

- **Altise d'hiver ou Grosse altise (*Psylliodes chrysocephala*)**

Comme la semaine dernière, quelques individus isolés peuvent être observés dans les cuvettes mais les conditions climatiques n'ont pas encore été favorables au déclenchement du vol. Les légères baisses de températures prévues cette semaine et en fin de semaine prochaine, en cas de pluies, seront susceptibles de déclencher de premiers vols.

Période de risque : de la levée jusqu'au stade 4 feuilles compris.

Seuil indicatif de risque : 8 pieds sur 10 avec morsures et 25 % de la surface foliaire atteinte. 3 pieds sur 10 pour les levées tardives au-delà e 15/09.





Grosse altise sur colza (photo Terres Inovia).

Evaluation du risque : risque faible à ce jour pour les semis tardifs peu vigoureux, n'ayant pas dépassé le stade 4 feuilles. Risque nul pour les colzas développés ayant dépassé le stade de sensibilité.

De premières captures en cuvette, mais pas de remontées de dégâts à l'échelle du réseau. Au vu de la faible croissance des colzas en conditions sèches, il convient de surveiller attentivement les dynamiques de vol au cours des prochaines semaines, notamment pour les derniers semis en date !

Comparaison pluriannuelle de la dynamique de piégeage de la grosse altise (GA)
Nb moyen de grosse altise / cuvette (hors valeurs nulles, et valeur maxi à 50 insectes)
Suivi BSV colza sur Aquitaine et Ouest Occitanie





Piege enterre : Nb d'altises d'hiver (grosses altises) : [0 - 0] [0 - 3]

• Héliothis ou Noctuelle de la tomate (*Helicoverpa amigera*)

Les retours de dégâts sont moindres cette semaine, témoignant d'attaques ponctuelles et rapides, avec parfois d'impressionnants dégâts constatés localement. La surveillance reste de mise pour les colzas en cours de levée n'ayant pas dépassés le stade 4-5 feuilles. N'hésitez pas à alerter votre technicien en cas de doute sur l'origine d'un manque de peuplement ou de surface foliaire fortement impactée sur votre parcelle, en l'absence d'autres ravageurs connus (limaces, altises, etc.).



Larves d'Héliothis sur feuilles de Colza (photos NOVASOL).

Evaluation du risque : risque modéré, surveillez vos parcelles.

• Limaces

Les conditions météorologiques demeurent défavorables au développement et à l'activité des limaces, avec aucune attaque recensée cette semaine. Néanmoins, les annonces de pluies à venir pourraient rapidement inverser cette situation. Le risque limace est à moduler en fonction du stade, de la dynamique de croissance, de la conduite d'irrigation (attention en contexte d'arrosage au démarrage), de l'historique de la parcelle, des pratiques d'interculture, et de l'état de surface du sol (présence de résidus végétaux, de mottes, état de fermeture du sillon).

Période de risque : de la levée jusqu'au stade 3 feuilles compris.

Evaluation du risque : risque faible à modéré dans les parcelles n'ayant pas atteint le stade 3 feuilles. Nul pour les parcelles ayant dépassées ce stade.

Les retours de pluies prévus pour les prochains jours pourront être favorables à l'arrivée en parcelle de populations de limaces. Il est donc important de suivre les déplacements et l'activité de ces ravageurs, notamment pour les implantations les plus tardives et/ou les plus difficiles (sols secs, motteux, présence de résidus pailleux, etc.), au regard de l'état de développement des colzas en présence.

• Tenthrede de la rave

Des adultes peuvent être observés dans la cuvette jaune (sans danger direct, indique la présence du ravageur dans la parcelle). Aujourd'hui, aucun dégât n'est observé sur le réseau. Ce ravageur est à suivre jusqu'à l'atteinte du stade 6 feuilles.

Période de risque : de la levée jusqu'au stade 6 feuilles.

Seuil indicatif de risque : 25 % de la surface foliaire détruite par les larves de tenthrèdes.



Larve de tenthrède de la rave sur colza (photos Terres Inovia).

Evaluation du risque : risque nul à ce jour.


A ce jour, pas d'attaque. Surveillez vos parcelles jusqu'au stade 6 feuilles. Soyez vigilant et très réactif en cas de pullulation



Tenthrèdes de la rave adultes en cuvette (photos Terres Inovia).

Cirphis - Les observations de la semaine

La tournée de ce lundi est résumée par la carte ci-dessous :



Niveaux de présence des chenilles et papillons Cirphis le 14 septembre 2026 (CA64).

• Observations

Situation sur le terrain

Des papillons ont été capturés sur quasiment l'ensemble du réseau, avec les captures les plus importantes réalisées dans des pièges TIPI (à JUXUE, GARINDEIN, ROQUIAGUE, BIDARRAY, BOSDARROS), plus efficaces que les pots pièges classiques utilisés sur le réseau.

Aucune chenille n'a été observée.

On est probablement entre 2 générations de cirphis ; la prochaine cohorte de chenilles devrait apparaître d'ici 1 à 2 semaines.

Seules graminées vertes dans les prairies et bordures, les paspales et autres panics restent attractives pour abriter les pontes des papillons et fournir de la nourriture aux chenilles.

Le retour de quelques précipitations devrait favoriser les émergences des pontes en cours ; reste à voir si le rafraîchissement nocturne des températures sera suffisant pour limiter la présence / l'impact des chenilles sur une végétation desséchée.

Pour repérer les cirphis au plus tôt, profitez de la rosée matinale pour marcher dans les prés : les chenilles, surtout les toutes petites, se collent aux chaussures. Les vols d'étourneaux ou d'aigrettes peuvent aussi être un indicateur d'une éventuelle présence de chenilles plus âgées. Enfin, les crottes de chenilles (petits cubes noirs, souvent dans des pieds de dactyle) indiquent la présence de ces dernières.

Le piétinement, le fauchage ou/et l'application de Bt, en cas de présence avérée de chenilles encore jeunes (moins de 15 mm), permettront de limiter leur éventuelle abondance avant que leur développement n'impacte visiblement la végétation prairiale.

• Critères de reconnaissance

D'une envergure de 3 cm environ, le papillon est identifiable par sa tache blanche sur ses ailes brun-acajou.

La chenille possède quant à elle des couleurs variables, selon son stade de développement et son régime alimentaire. Elle est toutefois reconnaissable grâce à ses trois lignes longitudinales dorsales blanchâtres et sa bande longitudinale latérale jaune. Elle a un aspect lisse et sans poil et elle s'enroule lors d'un stress (lorsqu'on la touche par exemple).

• Se tenir informé

- site internet de la Chambre d'agriculture (<https://pa.chambres-agriculture.fr/sinformer/produire-et-innover/herbe-et-fourrages/cirphis>)
- presse hebdomadaire agricole (Le Sillon : <https://www.lesillon.info/>)
- affichage dans les coopératives agricoles
- Facebook (groupe Prairies.64).



Cirphis (*Mythimna unipuncta*) aux stades adultes et larvaires. (CA64)

Annexe 1 : reconnaissance des stades du colza à l'automne



A- Stade cotylédonaire - stade A (10)

Levée : les jeunes plantes marquent la ligne.
Pas de feuilles "vraies".
Seuls les deux cotylédons sont visibles.



B- Formation de la rosette - stades B1 et B4

Stade B : apparition des feuilles.
Pas d'entre-nœuds entre les pétioles. Absence de vraie tige.
Stade B1 (11) : 1 feuille vraie étalée ou déployée (voir ci-contre).
Stade B2 (12) : 2 feuilles vraies étalées ou déployées.
Stade B3 (13) : 3 feuilles vraies étalées ou déployées.
Stade B4 (14) : 4 feuilles vraies étalées ou déployées (voir ci-contre).
Stade Bn (1n) : n feuilles vraies étalées ou déployées.
Jusqu'à B9 (19) ou davantage de feuilles étalées ou fin de la formation de la rosette.

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine Grandes cultures / Edition Aquitaine sont les suivantes : Act'Agro, AREAL, ARVALIS Institut du Végétal, ASTRIA64, CDA 24, CDA 33, CDA 40, CDA 47, CDA 64, CETA de Guyenne, Terres Inovia, Terres conseils, Ets Sansan, Euralis, FREDON 64, FREDON Nouvelle-Aquitaine, GRCETA SFA, Groupe Maisadour, La Périgourdine, Lur Berri, SCAR, Sodepac, Groupe Terres du Sud, Viti Vista

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).