



N°29
22/10/2026



Animateurs filières

Céréales à paille / Maïs
Philippe MOUQUOT / **CDA 33**
p.mouquot@gironde.chambagri.fr

Suppléance : ARVALIS
t.sidisaid@arvalis.fr
a.peyhorgue@arvalis.fr

Oléagineux
Quentin LAMBERT / **Terres Inovia**
q.lambert@terresinovia.fr

Prairies
Marie-Claude MAREAUX / **CDA 64**
mc.mareaux@pa.chambagri.fr

Directeur de publication
Bernard LAYRE
Président de la Chambre Régionale
Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision
DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

Supervision site de Poitiers

**La stratégie
écophyto 2030**
Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

**Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.**
**Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Grandes
cultures N°X du JJ/MM/AA »**

Edition **Aquitaine**

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT**
en cliquant sur [formulaire d'abonnement au BSV](#)

Ce qu'il faut retenir

Colza

- **Grosse altise** : Risque fort dans les parcelles en cours de levée ou à cotylédons. L'accumulation des dégâts est très rapide. Grande vigilance et observation quotidienne. Risque nul pour les autres situations.
- **Limaces** : risque moyen à fort dans les parcelles n'ayant pas atteint le stade 4 feuilles, particulièrement dans les colzas levés récemment. Nul pour les parcelles ayant dépassé ce stade.
- **Pucerons cendrés** : risque faible, surveiller vos parcelles, que celles-ci soient bien développées ou récemment levées.

Annexes : Reconnaissance des stades du colza à l'automne



ANALYSE DE RISQUE ELABOREE A L'ECHELLE DU TERRITOIRE OUEST OCCITANIE

Le réseau d'observations colza de la Surveillance Biologique du Territoire (SBT) est en cours de construction. L'élaboration de l'analyse de risque 2026-2027 est établie sur les territoires Aquitaine et Ouest-Occitanie à partir de parcelles fixes qui font l'objet d'observations hebdomadaires. Cette semaine, l'analyse de risque est établie à partir de 10 parcelles observées.

Parcelles BSV observées du 2025-10-06 au 2025-10-13



Vous êtes agriculteur, conseiller agricole, etc. ? La surveillance de l'état sanitaire et la performance du colza vous intéresse ?

Alors n'hésitez plus, intégrez le réseau BSV en Aquitaine et Midi-Pyrénées/Ouest-Audois et devenez observateur colza !



Demandez plus d'information à vos animateurs filières Terres Inovia : q.level@terresinovia.fr pour les départements 24, 32, 33, 40, 47, 64, 65 ou

q.lambert@terresinovia.fr pour les départements 09, 11, 12, 31, 46, 81, 82.


• Stades phénologiques et état des cultures

C'est toujours le grand écart au niveau des stades. Cette situation représente quatre situations :

- des parcelles semées fin août/début septembre et ayant eu des cumuls suffisants après le semis. Ces parcelles sont en général bien portantes. Elles sont minoritaires sur le territoire.
- des parcelles semées fin août début septembre et ayant eu des cumuls insuffisants pour une levée satisfaisante. Ces parcelles présentent des peuplements hétérogènes et ont été sujettes à des dégâts de fourmis, noctuelles défoliatrices, taupins, vers gris, etc. Ces situations se sont bien repris grâce aux pluies de début octobre.
- des parcelles semées fin août début septembre et ayant eu des cumuls nul ou insuffisants pour permettre la levée. Ce sont les pluies de début octobre qui ont permis la levée, soit 3 à 5 semaines après le semis.
- des parcelles semées fin septembre/début octobre qui ont levé grâce aux pluies de début octobre.

Les deux dernières situations sont les plus critiques à ce jour, elles sont généralement à cotylédons étalés (stade A, BBCH10) et font face à des dégâts importants de grosses altises (voir partie dédiée). Si elles supportent la pression biotique, leur avenir dépendra des conditions climatiques d'ici la reprise de végétation en sortie d'hiver, l'objectif étant que la biomasse soit la plus élevée avant les premiers gels ou phénomènes d'excès d'eau. Dans le réseau BSV, elles représentent 11 % des parcelles, pourcentage sous estimant la part réelle de parcelle dans ce cas sur le territoire.

Le reste des parcelles est compris entre B7 (BBCH17 : 7 feuilles vraies étalées ou déployées) et supérieur à 10 feuilles (BBCH19 : 9 feuilles vraies étalées ou déployées et plus). Le faible nombre de remontées d'observations ne permet pas de définir de manière représentative la répartition des stades en présence.



• Altise d'hiver ou Grosse altise (*Psylliodes chrysocephala*)

La semaine dernière (jusqu'au jeudi 15/10) a été très favorable à l'activité du ravageur. Le retour des pluies et la baisse des températures sont moins propices au déplacement massif des populations, toutefois, on observe de l'activité dans les parcelles et les captures sont toujours en hausse dans les cuvettes.

Sur 9 parcelles suivies, 8 piègent le ravageur à des niveaux allant de 1 à 170 individus par cuvette. La moyenne des parcelles avec grosses altises est de 34,4 individus par piège (écrêtement à 50 indiv max), plus du double de la semaine dernière.




Grosse altise sur colza (photo Terres Inovia).

Le réseau BSV représente majoritairement des parcelles avec des développements de plantes supérieures à 7 feuilles, sur ces parcelles, le niveau d'attaque est globalement faible en parcelle (% de plantes avec morsure et % de surface foliaire attaquée).

Hors réseau, l'état des parcelles en cours de levée et à cotylédons sont, pour la majorité d'entre-elles, dans un état critique et il convient de les suivre avec la plus grande vigilance. Pour rappel, ce sont la dynamique de croissance des colzas, ainsi que l'intensité et la vitesse d'accumulation des dégâts qui orientent la prise de décision quant à la mise en œuvre d'interventions de protection.

Comparaison pluriannuelle de la dynamique de piégeage de la grosse altise (GA)
Nb moyen de grosse altise / cuvette (hors valeurs nulles, et valeur maxi à 50 insectes)
Suivi BSV colza sur Aquitaine et Ouest Occitanie



Période de risque : de la levée jusqu'au stade 4 feuilles compris.

Seuil indicatif de risque : 8 pieds sur 10 avec morsures et 25 % de la surface foliaire atteinte. 3 pieds sur 10 pour les levées tardives au-delà du 15/09.

Evaluation du risque : **Risque fort dans les parcelles en cours de levée ou à cotylédons. L'accumulation des dégâts est très rapide. Grande vigilance et observation quotidienne. Risque nul pour les autres situations.**

Les captures s'intensifient encore cette semaine et les observations hors réseau, sur petit colzas, sont peu rassurantes pour la suite. Les conditions climatiques sont peu favorables à un développement rapide. Au vu du faible développement des colzas (faible biomasse), il convient de surveiller quotidiennement les dynamiques de vol et d'attaques au cours des prochains jours.

• Limaces

Le maintien de conditions humides est favorable à l'activité des limaces, **grande vigilance dans les parcelles qui n'ont pas atteint 4 feuilles**. A ce jour, les retours sont à l'état de trace pour une parcelle du réseau et aucune remontée hors réseau.

Le risque limace est à moduler en fonction du stade, de la dynamique de croissance, de l'historique de la parcelle, des pratiques d'interculture, et de l'état de surface du sol (présence de résidus végétaux, de mottes, état de fermeture du sillon).

Période de risque : de la levée jusqu'au stade 3 feuilles compris.

Evaluation du risque : **risque moyen à fort dans les parcelles n'ayant pas atteint le stade 4 feuilles. particulièrement dans les colzas levés récemment. Nul pour les parcelles ayant dépassé ce stade.**

Le maintien de conditions humides en surface est favorable à leur activité, d'autant plus avec le faible développement des colzas à ce jour. Vigilance et observation régulière sont indispensables au vu de l'état des colzas.

• Piéride du Chou

La semaine dernière, hors réseau, des attaques localisées de larves de piérides du chou ont été identifiées et signalées dans le Tarn, les Pyrénées Atlantiques ainsi que dans le Lot-et- Garonne. Elles se caractérisent par une consommation partielle ou totale des colzas. On constate une consommation de la partie internervaire des limbes, accompagnée de nombreuses déjections sur la végétation restante. En règle générale, il n'est pas nécessaire d'intervenir contre ce ravageur. Néanmoins, la surveillance reste de mise pour les colzas les moins développés et/ou les plus chétifs.

Pas de remontée supplémentaire cette semaine

N'hésitez pas à alerter votre technicien en cas de doute sur la nuisibilité des attaques potentiellement causées par ce ravageur.



Larve de piéride du chou sur colza (photo Terres Inovia).

• Pucerons cendrés (*Brevicoryne brassicae*)

A la faveur d'un temps particulièrement doux, de premières colonies de pucerons cendrés sont visibles sur la face inférieure des limbes de colza.

La semaine dernière, 4 parcelles relevaient la présence de cet insecte, 2 cette semaine dans le Gers et le Tarn. La pression est faible à ce stade (inférieur à 5 % de pieds porteurs) et les colonies restent aux extrémités des feuilles.

La présence de pucerons cendrés à l'automne traduit un risque de futures infestations précoces au printemps. Elles pourront être particulièrement préjudiciables à la culture si les conditions redeviennent rapidement chaudes et sèches.

Le risque direct à l'automne survient si les colonies s'installent au cœur des plantes et provoque l'assèchement des futurs jeunes feuilles. Actuellement, aucun retour de dégât. La surveillance reste de mise, jusqu'en sortie d'hiver.



Colonies de pucerons cendrés sur limbe de Colza à l'automne (photos Terres Inovia).

Evaluation du risque : risque faible, surveiller vos parcelles, que celles-ci soient bien développées ou récemment levées.

• Tenthrede de la rave

Des adultes peuvent être observés dans la cuvette jaune (sans danger direct, indique la présence du ravageur dans la parcelle). Aujourd'hui, aucun dégât n'est observé sur le réseau. Ce ravageur est à suivre jusqu'à l'atteinte du stade 6 feuilles.

Période de risque : de la levée jusqu'au stade 6 feuilles.

Seuil indicatif de risque : 25 % de la surface foliaire détruite par les larves de tenthrèdes.



Larve de tenthrède de la rave sur colza (photos Terres Inovia).



Tenthrèdes de la rave adultes en cuvette (photos Terres Inovia).

Evaluation du risque : risque nul à ce jour.

A ce jour, pas d'attaque. Surveillez vos parcelles jusqu'au stade 6 feuilles. Soyez vigilant et très réactif en cas de pullulation.

- **Taupins, fourmis, vers gris, héliothis**

Les attaques sont absentes depuis 3 semaines et le retour des pluies. Les conditions actuelles, humides et fraîches ne sont plus favorables à de nouvelles attaques.

- **Altises des crucifères ou Petites Altises (Phyllotreta sp.)**

Le vol des grosses altises a débuté et les conditions climatiques ne sont plus favorables à l'activité des petites altises.

Période de risque : de la levée jusqu'au stade 3 feuilles compris.

Seuil indicatif de risque : 8 pieds sur 10 avec morsures et 25 % de la surface foliaire atteinte.



Evaluation du risque : risque très faible dans l'ensemble des situations.

Annexe 1 : reconnaissance des stades du colza à l'automne



A- Stade cotylédonaire - stade A (10)

Levée : les jeunes plantes marquent la ligne.
Pas de feuilles "vraies".
Seuls les deux cotylédons sont visibles.



B- Formation de la rosette - stades B1 et B4

Stade B : apparition des feuilles.
Pas d'entre-nœuds entre les pétioles. Absence de vraie tige.
Stade B1 (11) : 1 feuille vraie étalée ou déployée (voir ci-contre).
Stade B2 (12) : 2 feuilles vraies étalées ou déployées.
Stade B3 (13) : 3 feuilles vraies étalées ou déployées.
Stade B4 (14) : 4 feuilles vraies étalées ou déployées (voir ci-contre).
Stade Bn (1n) : n feuilles vraies étalées ou déployées.
Jusqu'à B9 (19) ou davantage de feuilles étalées
ou fin de la formation de la rosette.

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine Grandes cultures / Edition Aquitaine sont les suivantes : Act'Agro, AREAL, ARVALIS Institut du Végétal, ASTRIA64, CDA 24, CDA 33, CDA 40, CDA 47, CDA 64, CETA de Guyenne, Terres Inovia, Terres conseils, Ets Sansan, Euralis, FREDON 64, FREDON Nouvelle-Aquitaine, GRCETA SFA, Groupe Maïsadour, La Périgourdine, Lur Berri, SCAR, Sodepac, Groupe Terres du Sud, Viti Vista

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).