



Grandes cultures

N°29
20/10/2026



Animateurs filières

Céréales à paille

Philippe PENICHO

FREDON N-A

philippe.penichou@fredon-na.fr

Suppléance : **CDA 87**

valerie.lacorre@haute-vienne.chambagri.fr

Maïs

Valérie LACORRE / **CDA 87**

valerie.lacorre@haute-vienne.chambagri.fr

Suppléance : **FREDON N-A**

philippe.penichou@fredon-na.fr

Oléagineux

Valérie LACORRE / **CDA 87**

valerie.lacorre@haute-vienne.chambagri.fr

Suppléance : **FREDON N-A**

philippe.penichou@fredon-na.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE

Président de la Chambre Régionale

Nouvelle-Aquitaine

Boulevard des Arcades

87060 LIMOGES Cedex 2

accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF

Service Régional

de l'Alimentation

Nouvelle-Aquitaine

22 Rue des Pénitents Blancs

87000 LIMOGES

Supervision site de Poitiers

La stratégie

écophyto 2030

Réduire et améliorer

l'utilisation des phytos

**Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.**

**Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Grandes
cultures N°29
du 20/10/2026 »**

Edition Limousin

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT** en cliquant
sur **formulaire d'abonnement au BSV**

Ce qu'il faut retenir

Colza

- **Stades phénologiques** : les colzas du réseau sont au stade « 3 à 8 Feuilles » BBCH 13-18.
- **Evolution des conditions météorologiques** : Prendre en compte les cartes de probabilité de pluie avec **AléaPluie**
- **Petites et grosses altises** : surveillez les parcelles uniquement pour les colzas n'ayant pas dépassé le stade 3 Feuilles (BBCH13).
- **Limaces** : au vue des conditions climatiques, risque moyen à fort pour les parcelles n'ayant pas dépassé le stade 3 Feuilles (BBCH 13).
- **Tenthredes** : surveillez vos parcelles, risque moyen pour les parcelles en dessous du stade 6 Feuilles (BBCH 16).
- **Pucerons** : le risque est faible, mais pour les colzas qui sont dans les stades sensibles : restez vigilant.
- **Charançon du Bourgeon Terminal** : La période de risque étant actuellement en cours, surveillez vos parcelles.
- **Phoma**

Céréales à paille

- **Stades phénologiques** : semis en cours.
- **Limaces** : conditions favorables.
- **Pucerons d'automne** : la vigilance au champ s'impose dès la levée !
- **Cicadelles des céréales** : aucun risque avant la levée.



PREVISIONS METEO (sources météo France)

Un début de semaine avec des ondées éparses accompagnées de rafales de vent et un week-end pluvieux.

Limoges

MARDI 20	MERCREDI 21	JEUDI 22	VENDREDI 23	SAMEDI 24	DIMANCHE 25	LUNDI 26
9° / 14°	6° / 14°	8° / 16°	10° / 16°	8° / 15°	9° / 15°	8° / 15°
▲ 15 km/h	➤ 20 km/h 45 km/h	▲ 25 km/h 55 km/h	➤ 25 km/h 55 km/h	▲ 30 km/h 50 km/h	▲ 25 km/h 50 km/h	▲ 15 km/h

Guéret

MARDI 20	MERCREDI 21	JEUDI 22	VENDREDI 23	SAMEDI 24	DIMANCHE 25	LUNDI 26
8° / 12°	6° / 12°	8° / 14°	9° / 14°	7° / 13°	9° / 14°	7° / 14°
▲ 20 km/h 50 km/h	▲ 25 km/h 55 km/h	▲ 30 km/h 65 km/h	➤ 30 km/h 65 km/h	▲ 30 km/h 60 km/h	➤ 25 km/h 55 km/h	▲ 20 km/h

Brive

MARDI 20	MERCREDI 21	JEUDI 22	VENDREDI 23	SAMEDI 24	DIMANCHE 25	LUNDI 26
9° / 16°	8° / 15°	8° / 16°	11° / 18°	9° / 16°	11° / 17°	9° / 17°
➤ 10 km/h	➤ 20 km/h 40 km/h	▲ 20 km/h 40 km/h	➤ 20 km/h 45 km/h	▲ 20 km/h	➤ 10 km/h 45 km/h	➤ 15 km/h

Colza

• Stades phénologiques et observations du réseau

A l'heure actuelle le réseau compte 11 parcelles : 1 en Corrèze, 4 en Creuse et 6 en Haute-Vienne.
Cette semaine, 10 parcelles ont été observées.

Les colzas du réseau sont au stade « 5 à 8 Feuilles » BBCH 15-18.

- 30% sont au stade « 3 à 6 Feuilles » (BBCH 13 16)
- 70% sont au stade « 7 à 8 Feuilles » (BBCH 17 18)

	semis	Variétés	Stade	Charançon Bourgeon Terminal	Altises piégées (cuvette)	Fréquence (% plantes touchées)				
						Dégâts deTenthrede	Dégâts limaces	Morsures altises	Pucerons verts	Phoma
23-Evaux Les Bains P	14/08/2026	Helypse	8 Feuilles	0	2	Présence				
87- Rilhac Rancon	20/08/2026		7 Feuilles	1	0					
23-St Dizier Masbaraud	21/08/2026	RGT Ozzone	8 Feuilles	0	37					
87-Dompierre Les Eglises	21/08/2026	KWS Arianos	8 Feuilles	2	6			5%		
23-Evaux Les Bains B	24/08/2026	KWS Merinos	8 Feuilles	0	4					
23-St Pierre Le Bost	24/08/2026	KWS Feliciano	7 Feuilles	1	2	37%		47%		
87-Nexon Montezol	24/08/2026	Cézanne	7 Feuilles	0	8	10%	30%		0%	0%
87-St Maurice Les Brousse	27/08/2026	Nymphaea	3 Feuilles	0	40			100%		
19- Vigeois	27/08/2026		6 Feuilles			Présence	Présence			30%
87-Nexon l'Age	28/08/2026	Nymphaea	6 Feuilles	0	5	20%	50%		0%	5%
87-St Hilaire Bonneval	30/08/2026	LG Acropole								

Evolution du colza après quelques jours de pluie !!

Lundi 5 octobre 2026 → Lundi 12 octobre 2026 → Lundi 19 octobre 2026





Colza NEXON Mont. Semis 24/08/26 CDA87
V.LACORRE

• Evolution des conditions météorologiques

Prendre en compte les cartes de probabilité de pluie avec [AléaPluie](https://aleaplue.modelia.org) pour anticiper l'évolution des conditions météorologiques : AléaPluie est un service de prévisions probabilistes de cumul de précipitations pour l'agriculture, créé par l'Acta et les instituts techniques. Il est disponible gratuitement et sans inscription sur le site <https://aleaplue.modelia.org>. Il fournit des informations sur les probabilités d'atteindre un certain seuil de cumul de précipitations sur les deux semaines à venir sous forme de cartes, à l'échelle nationale.

Probabilité somme précipitation ≥ 30 mm
Semaine du 19/10/2026 au 26/10/2026



• Petites et grosses altises

Rappel des dégâts, période de risque, seuil indicatif de risque : Cf BSV GC Limousin N°25 22/09/2026

Observations du réseau : cette semaine, il a été piégé des altises, de 2 à 40 individus dans toutes les parcelles observées excepté Rilhac Rancon (87). Toutes les parcelles excepté St Maurice Les brousses (87) ont dépassé le seuil de nuisibilité (3 Feuilles, BBCH13).

Evaluation du risque – Altises

Surveillez les parcelles uniquement pour les colzas n'ayant pas dépassé le stade Feuilles (BBCH13).

Pour vous aider à estimer plus précisément le risque, consultez l'outil en ligne :



Attention : la grosse altise est résistante aux pyréthrinoïdes.



• Limaces

Observations du réseau : présence de dégâts de limaces sur les parcelles de Nexon (87).

Période de risque, leviers disponibles pour anticiper et réduire les risques, analyser le risque lié à la parcelle, comment observer si les limaces sont actives, seuil indicatif de risque :
Cf BSV GC Limousin N°25 22/09/2026

Evaluation du risque – limaces

Au vue des conditions climatiques, risque moyen à fort pour les parcelles n'ayant pas dépassé le stade 3 Feuilles (BBCH 13).

• Tenthredes de la rave

Biologie Cf BSV GC Limousin N°27 06/10/2026

Observations du réseau : on nous signale des dégâts sur les parcelles de St Pierre Le Bost, Evaux Les Bains P (23) et Nexon (87).

Période de risque : de la levée à 6 feuilles.

Seuil indicatif de risque : les surfaces consommées sont supérieures au ¼ de la surface végétative.

Evaluation du risque – tenthredes

Surveillez vos parcelles, risque moyen pour les parcelles en dessous du stade 6 Feuilles (BBCH 16)

• Héliothis

Pas de signalement cette semaine.



Photo ci-joint à Vigeois le 12/10/2026
T DELORD CDA19



Pour aller plus loin : [Gestion des ravageurs secondaires](#)

• Pucerons

Éléments de biologie

Les pucerons verts s'installent sur la face inférieure des feuilles et sur les petites feuilles en formation au centre de la rosette.

Le puceron vert, capable de transmettre les 3 virus (essentiellement, deux mosaïques (CaMV et TuMV) et une jaunisse (TuYV) est le plus redouté. Fréquent dans les parcelles, il a tendance à se disperser et favorise la transmission des virus à un grand nombre de plantes. Les pertes peuvent s'élever de 8 à 10 q/ha tout en passant inaperçues en végétation.

Observer minutieusement la face inférieure de l'ensemble des feuilles du colza.

Les pucerons cendrés aptères, jaune-verdâtre à la mue, prennent ensuite une coloration grisâtre, donnée par une sécrétion abondante de cire pulvérulente qui couvre rapidement tout le corps de l'insecte. Le puceron tend à présenter une coloration générale grise uniforme.

Regroupés en colonies serrées, leur nuisibilité directe est généralement faible à l'automne, même s'ils peuvent tuer des plantes au stade rosette.

Observations du réseau : cette semaine, pas de signalement.

Période de risque : de la levée à 6 feuilles.

Seuil de nuisibilité : pucerons présents sur 2 pieds sur 10 (fréquence 20 % de plantes hébergeant des individus).



Evaluation du risque – pucerons

Le Risque est faible, mais pour les colzas qui sont dans les stades sensibles : restez vigilant.

Ne pas oublier que le risque est réduit pour les variétés à résistance partielle au TuYV, une des viroses transmises par ce vecteur.




Attention : le puceron vert est résistant aux pyréthrinoïdes et au pirimicarbe

• Charançon du bourgeon terminal (*Ceuthorrhynchus picitarsis*)

Eléments de biologie : les adultes pondent dans les pétioles à l'automne. Les larves passent dans le cœur des plantes au stade rosette et détruisent le bourgeon terminal.

Attention à ne pas confondre le charançon Gallicole avec le charançon du Bourgeon Terminal. Seul ce dernier étant considéré nuisible.



Observations du réseau : cette semaine, 1 charançon du Bourgeon Terminal (CBT) a été piégé sur les parcelles Rilhac Rancon (87), St Pierre Le Bost (23) et 2 à Dompierre Les Eglises (87).

Période de risque : de la levée au stade rosette.

Seuil indicatif de risque : il n'y a pas pour le charançon du bourgeon terminal de seuil de risque. Etant donné la nuisibilité potentielle de cet insecte, il est considéré que sa seule présence sur les parcelles, repérée dans les cuvettes, est un risque.


Les petits colzas sont beaucoup plus sensibles. Les femelles sont rarement aptes à pondre dès leur arrivée sur les parcelles. On considère que le risque est plus important 8 à 10 jours après les premières captures.

Outil d'Aide à la Décision (OAD) pour prédire les vols de charançon du bourgeon terminal :




Pour accompagner la surveillance de vos colzas, Terres Inovia a construit un OAD de prédiction de vol du charançon du Bourgeon Terminal. Sur la base des captures relevées sur le territoire depuis 2011 par les observateurs BSV, et en se basant sur un réseau de stations météorologiques couvrant les différents bassins de production, le modèle sort une **courbe** de probabilité de piégeage sur la commune renseignée **Limoges 87** (jusqu'à J+7).

Lorsque la courbe se rapproche du seuil d'alerte (ligne en pointillés), vous devez vérifier régulièrement les captures dans votre cuvette.




Une vue d'ensemble sur une **carte** de France est également consultable et représente la probabilité quotidienne de capture à la date sélectionnée (jusqu'à J+7).

Pour tester l'OAD, [cliquez ici](#).



Mardi 20 octobre 2026



Lundi 26 octobre 2026

Actuellement, le risque modélisé de vols de charançons du bourgeon terminal est fort à avérer et avérer à faible pour les jours à venir sur le Limousin.

Evaluation du risque – charançon du bourgeon terminal

La période de risque étant actuellement en cours, surveillez vos parcelles.

• Phoma

Sur les feuilles, taches arrondies gris cendré de 5 à 15 mm présentant des points noirs.

Observations du réseau : on nous signale la présence de phoma sur les parcelles de Nexon l'Age (87) et Vigeois (19).

Classement de sensibilité au phoma des variétés semées dans le réseau (Terres Inovia)

Toutes les variétés du réseau sont classées peu Sensible à Très Peu Sensible au Phoma

Céréales à paille

Mise en place progressive du réseau d'observations, à l'heure actuelle peu de parcelles ont été semées à l'exception des méteils. Les pluies sont enfin au rendez-vous, une vigilance particulière sera apportée sur le salissement des parcelles, la sécheresse persistante jusqu'en septembre ayant rendue inopérante les levées de faux semis. Un régime d'averses s'installe pour plusieurs jours avec des températures conformes aux moyennes.


Semis en cours.

• Gestion des Limaces

Recommandations avant les semis de céréales se reporter au [BSV Limousin N°28 du 13/10/2026](#). À consulter : [note nationale DGAL/SDQPV \(octobre 2014\) limaces](#).

Observations du réseau : semis en cours.

Modélisation : calcul de l'indice de risque « limaces » par l'outil d'aide à la décision « Acta-Arvalis-Météo France » au 19/10/2026 à partir des données de la station Météo-France de Limoges (courbe noire).



Évaluation du risque

Bien que les conditions météorologiques actuelles soient *a priori* favorables, le modèle calcule un risque nettement plus faible que celui des années précédentes à la même époque. Il faut y voir une conséquence de la sécheresse et des fortes chaleurs sur les dynamiques de population. La gestion du risque doit être raisonnée à la parcelle. Vigilance accrue en conditions agronomiques particulières (historique limaces, parcelles motteuses, résidus de précédents en surface, etc.).

• Pucerons d'automne

Généralités : de nombreuses variétés d'orge d'hiver sont tolérantes à la JNO (se reporter au [BSV N°26 du 29/09/2026](#)).

Cette tolérance ne confère pas une résistance totale, mais elle permet de faire l'impasse à la condition d'avoir respecté les dates de semis recommandées. Pour les semis « trop » précoces, le risque n'est pas nul.

En blé tendre, 2 variétés seulement possèdent le gène de résistance partielle à la JNO : RGT Tweeteo et RGT Sundeo mais d'autres, bien que ne possédant pas le gène *bdv2* expriment peu de symptômes. Il convient aussi de respecter de la même manière les dates de semis recommandées de ces variétés pour profiter au mieux de cette tolérance.

Les dégâts dus à la JNO peuvent être très importants : jusqu'à retournement de la culture en orge et de quelques quintaux à 25-30 q/ha pour le blé.

Observations du réseau : semis en cours.

Période de risque : dès la levée (BBCH 09) et au-delà de fin tallage (BBCH 29) si nécessaire.

Seuils indicatifs de risque : sur orges sensibles (sans le gène de tolérance à la JNO), blé et triticales, une intervention est envisageable lorsque 10 % de plantes sont colonisées par au moins 1 puceron, ou bien si la présence de ces organismes est encore observée au bout de 10 jours.

Évaluation du risque

Les conditions d'observations au champ ne sont pas optimales. Toutefois il est important de contrôler minutieusement les cultures dès la levée. Le niveau de risque actuel est faible.

• Cicadelles des céréales

La maladie des pieds chétifs est une virose transmise par la cicadelle *Psammotettix alienus*.

Le blé est la céréale la plus sensible à cette virose. La contamination des céréales se fait dès les premières feuilles à l'automne, mais les symptômes ne sont visibles qu'à partir de la montaison.

La maladie des pieds chétifs est une maladie incurable, seule la gestion de la cicadelle à l'automne permet de limiter ses attaques.

Les levées précoces (début octobre) et les parcelles bien abritées sont les plus exposées car les conditions douces favorisent les pullulations ($T > 15^{\circ}\text{C}$).



Seuil indicatif de risque : à partir de 30 captures hebdomadaires, on considère que le risque de contagion est réel.

Période de risque : de la levée (BBCH 09) à 3 feuilles (BBCH 13).

Evaluation du risque

Aucun risque avant la levée.

Prochain bulletin : mardi 27 octobre 2026

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de Santé du Végétal Nouvelle-Aquitaine Grandes cultures / Edition Zone Limousin sont les suivantes : FREDON N-A, Chambres d'Agriculture 19, 23 et 87, OCEALIA, Agricentre Dumas, Sébastien Pinthon, Marc Bonnet, Agriculteurs

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).