

Bulletin de Santé du Végétal
Nouvelle-Aquitaine

Grandes cultures

N°30
27/10/2026

Edition Limousin

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix GRATUITEMENT en cliquant sur formulaire d'abonnement au BSV

CHAMBRE D'AGRICULTURE NOUVELLE-AQUITAINE

Animateurs filières

Céréales à paille
Philippe PENICHOU
FREDON N-A
philippe.penichou@fredon-na.fr
Suppléance **: CDA 87**
valerie.lacorre@haute-vienne.chambagri.fr

Maïs
Valérie LACORRE **/ CDA 87**
valerie.lacorre@haute-vienne.chambagri.fr
Suppléance : **FREDON N-A**
philippe.penichou@fredon-na.fr

Oléagineux
Valérie LACORRE / **CDA 87**
valerie.lacorre@haute-vienne.chambagri.fr
Suppléance : **FREDON N-A**
philippe.penichou@fredon-na.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre Régionale
Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

Supervision site de Poitiers

La stratégie écophyto 2030
Réduire et améliorer l'utilisation des phytos

Reproduction intégrale de ce bulletin autorisée. Reproduction partielle autorisée avec la mention « extrait du bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine Grandes cultures N°30 du 27/10/26 »

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
OFB OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ

Ce qu'il faut retenir

Colza

- **Stades phénologiques :** les colzas du réseau sont au stade « 3 à 8 Feuilles » BBCH 13-18.
- **Evolution des conditions météorologiques :** Prendre en compte les cartes de probabilité de pluie avec **AléaPluie**.
- **Petites et grosses altises :** surveillez les parcelles uniquement pour les colzas n'ayant pas dépassé le stade 3 Feuilles (BBCH13).
- **Larves de grosses altises :** Simulation du cycle de développement.
- **Limaces :** au vue des conditions climatiques, risque moyen à fort pour les parcelles n'ayant pas dépassé le stade 3 Feuilles (BBCH 13).
- **Tenthrèdes :** surveillez vos parcelles, risque moyen pour les parcelles en dessous du stade 6 Feuilles (BBCH 16).
- **Pucerons :** restez vigilant pour les colzas qui sont dans les stades sensibles.
- **Charançon du Bourgeon Terminal :** La période de risque étant actuellement en cours, surveillez vos parcelles.
- **Phoma**

Céréales à paille

- **Stades phénologiques :** semis en cours à levée (BBCH 10).
- **Limaces :** conditions favorables.
- **Pucerons d'automne :** conditions favorables.
- **Cicadelles des céréales :** Surveillance dès la levée.

Notes nationales BIODIVERSITE

- **Coléoptères**
- **Mares**

PREVISIONS METEO (sources météo France)

Les précipitations ont fait leur retour en octobre après un mois de septembre exceptionnellement sec. Mais cette semaine retour du soleil avec des températures maxi supérieures à la moyenne.

Limoges



Guéret



Brive



Colza

- **Stades phénologiques et observations du réseau**

A l'heure actuelle le réseau compte 11 parcelles : 1 en Corrèze, 4 en Creuse et 6 en Haute-Vienne.

Cette semaine, 10 parcelles ont été observées.

Les colzas du réseau sont au stade « 5 à 8 Feuilles » BBCH 15-18.

- 20% sont au stade « < ou = à 6 Feuilles » (BBCH <= 16)
- 80% sont au stade «> à 7 Feuilles » (BBCH >17)

	Semis	Variétés	Stade	Charançon Bourgeon Terminal	Altises piégées (cuvette)	Fréquence (% plantes touchées)				
						Dégâts de Tenthrède	Dégâts limaces	Morsures altises	Pucerons verts	Phoma
23-Evaux Les Bains P	14/08/2026	Helypse	10 Feuilles	2	2				0%	0%
87- Rilhac Rancon	20/08/2026		8 Feuilles	0	1				0%	0%
23-St Dizier Masbaraud	21/08/2026	RGT Ozzone	10 Feuilles	0	3				0%	0%
87-Dompierre Les Eglises	21/08/2026	KWS Arianos	9 Feuilles	0	2				0%	0%
23-Evaux Les Bains B	24/08/2026	KWS Merinos	8 Feuilles	2	3				0%	0%
23-St Pierre Le Bost	24/08/2026	KWS Feliciano	8 Feuilles	4	0	45%		40%	0%	0%
87-Nexon Montezol	24/08/2026	Cézanne	8 Feuilles	1	3				0%	0%
87-St Maurice Les Brousse	27/08/2026	Nymphea	5 Feuilles	0	10			100%	0%	0%
19- Vigeois	27/08/2026		6 Feuilles	0	0				0%	30%
87-Nexon l'Age	28/08/2026	Nymphea	7 Feuilles	1	1				0%	0%
87-St Hilaire Bonneval	30/08/2026	LG Acropole								

Evolution du colza après 3 semaines de pluie !!

Lundi 5 octobre 2026 ⟹ Lundi 26 octobre 2026






Colza NEXON Montezol Semis 24/08/26
CDA87 V. LACORRE

- **Evolution des conditions météorologiques**

Prendre en compte les cartes de probabilité de pluie avec AléaPluie pour anticiper l'évolution des conditions météorologiques : AléaPluie est un service de prévisions probabilistes de cumul de précipitations pour l'agriculture, créé par l'Acta et les instituts techniques. Il est disponible gratuitement et sans inscription sur le site **https://aleapluie.modelia.org**. Il fournit des informations sur les probabilités d'atteindre un certain seuil de cumul de précipitations sur les deux semaines à venir sous forme de cartes, à l'échelle nationale.

Probabilité somme précipitation **>= 10 mm**
Semaine du 26 10 2026 au 2 11 2026



- **Petites et grosses altises**

Rappel des dégâts, période de risque, seuil indicatif de risque : **Cf BSV GC Limousin N°25 22/09/2026**

Observations du réseau : cette semaine, il a été piégé des altises, de 1 à 10 individus dans toutes les parcelles observées excepté St Pierre le Bost (23). Toutes les parcelles ont dépassé le seuil de nuisibilité (3 Feuilles, BBCH13).

Evaluation du risque – Altises

Surveillez les parcelles uniquement pour les colzas n'ayant pas dépassé le stade 3 Feuilles (BBCH13).

Pour vous aider à estimer plus précisément le risque, consultez l'outil en ligne :

COLZA RISQUES altise adulte

Attention : la grosse altise est résistante aux pyréthrinoïdes.


- ## Larves de grosses altises (altises d'hiver)

Eléments de biologie

Ces larves sont très petites, d'une longueur de moins de 3 mm **avec les deux extrémités noires et 3 paires de pattes.**

Ne pas confondre avec des larves de mouche qui peuvent être présentes également dans les pétioles et qui n'ont pas de patte.

Ces dernières ne présentent aucun danger pour la plante.



Larves de Mouches

Simulation du cycle de développement

En fonction de la date du début du vol des altises il est possible de simuler les dates de pontes ainsi que l'évolution des différents stades larvaires. Ces prévisions de dates sont obtenues à partir des données météorologiques réelles de l'année (MAJ 26 octobre 2026) et complétées par des valeurs moyennes.

En base 7, selon Terres Inovia, il faut atteindre 40°C degrés – jour pour la ponte, 190°C pour l'éclosion et 240°C pour la larve L2 et 300°C pour la larve L3.

Pour le département de la Creuse les données météorologiques utilisées sont celles de la station de Boussac, celles de Magnac-Laval servant à la simulation en Haute-Vienne.

	Date début du vol	Ponte	Eclosion	Larve L2	Larve L3
Haute-Vienne	01-oct	04-oct	27-oct	21-nov	-
Creuse	01-oct	04-oct	-	-	-

Rappel : les larves après éclosion (L1) rejoignent les pétioles des plantes à partir du sol. Il est possible dans un premier temps d'observer la présence de la perforation leur permettant de pénétrer dans la plante. Ensuite les différents stades larvaires (L2-L3) sont observables dans les pétioles. Les larves âgées (Stade larvaire L3) sont les plus à risque car les meilleures candidates à la migration vers le cœur.

- ## Limaces

Observations du réseau : pas de signalement.

Période de risque, leviers disponibles pour anticiper et réduire les risques, analyser le risque lié à la parcelle, comment observer si les limaces sont actives, seuil indicatif de risque :
Cf BSV GC Limousin N°25 22/09/2026

Evaluation du risque – limaces

Au vue des conditions climatiques, risque moyen à fort pour les parcelles n'ayant pas dépassé le stade 3 Feuilles (BBCH 13).

- **Tenthrèdes de la rave**

Biologie **Cf BSV GC Limousin N°27 06/10/2026**

Observations du réseau : on nous signale des dégâts sur les parcelles de St Pierre Le Bost (23).

Période de risque : de la levée à 6 feuilles.

Seuil indicatif de risque : les surfaces consommées sont supérieures au ¼ de la surface végétative.

Evaluation du risque – tenthrèdes

Surveillez vos parcelles, risque moyen pour les parcelles en dessous du stade 6 Feuilles (BBCH 16).

- **Héliothis**

Présence sur la parcelle de Dompierre Les Eglises (87). Photo ci-joint à Vigeois le 12/10/2026 T DELORD CDA19



Reconnaissance des stades larvaires de l'Heliothis (*Queiroz Santoset al.* 2018)



Pour aller plus loin :
Gestion des ravageurs secondaires

- **Pucerons**

Eléments de biologie **Cf BSV GC Limousin N°29 20/10/2026** **Observations**

du réseau : cette semaine, pas de signalement.

Période de risque : de la levée à 6 feuilles.

Seuil de nuisibilité : pucerons présents sur 2 pieds sur 10 (fréquence 20 % de plantes hébergeant des individus).

Evaluation du risque – pucerons

Restez vigilant pour les colzas qui sont dans les stades sensibles moins de 6 feuilles (BBCH16).


Ne pas oublier que le risque est réduit pour les variétés à résistance partielle au TuYV, une des viroses transmises par ce vecteur.

Attention : le puceron vert est résistant aux pyréthrinoïdes et au pirimicarbe

- **Charançon du bourgeon terminal (*Ceuthorhynchus picitarsis*)**

Eléments de biologie : les adultes pondent dans les pétioles à l'automne. Les larves passent dans le cœur des plantes au stade rosette et détruisent le bourgeon terminal.

Attention à ne pas confondre le charançon Gallicole avec le charançon du Bourgeon Terminal. Seul ce dernier étant considéré nuisible.



Observations du réseau : cette semaine, 1 charançon du Bourgeon Terminal (CBT) a été piégé sur les parcelles de Nexon (87), 2 à Evaux Les Bains et 4 à St Pierre Le Bost (23).

Période de risque : de la levée au stade rosette.


Seuil indicatif de risque : il n'y a pas pour le charançon du bourgeon terminal de seuil de risque. Etant donné la nuisibilité potentielle de cet insecte, il est considéré que sa seule présence sur les parcelles, repérée dans les cuvettes, est un risque.
Les petits colzas sont beaucoup plus sensibles. Les femelles sont rarement aptes à pondre dès leur arrivée sur les parcelles. On considère que le risque est plus important 8 à 10 jours après les premières captures.

Outil d'Aide à la Décision (OAD) pour prédire les vols de Charançon du Bourgeon Terminal

Prédiction des vols de Ravageurs


Pour accompagner la surveillance de vos colzas, Terres Inovia a construit un OAD de prédiction de vol du charançon du Bourgeon Terminal. Sur la base des captures relevées sur le territoire depuis 2011 par les observateurs BSV, et en se basant sur un réseau de stations météorologiques couvrant les différents bassins de production, le modèle sort une **courbe** de probabilité de piégeage sur la commune renseignée **Limoges 87** (jusqu'à J+7).

Lorsque la courbe se rapproche du seuil d'alerte (ligne en pointillés), vous devez vérifier régulièrement les captures dans votre cuvette.




Une vue d'ensemble sur une **carte** de France est également consultable et représente la probabilité quotidienne de capture à la date sélectionnée (jusqu'à J+7).

Pour tester l'OAD, **cliquez ici.**



Mardi 27 octobre 2026





Lundi 2 novembre 2026

Actuellement, le risque modélisé de vols de charançons du bourgeon terminal est avéré et pour les jours à venir c'est avéré à fort sur le Limousin.

Evaluation du risque – charançon du bourgeon terminal

La période de risque étant actuellement en cours, surveillez vos parcelles.

- **Phoma**

Sur les feuilles, taches arrondies gris cendré de 5 à 15 mm présentant des points noirs.

Observations du réseau : 30% de plantes avec taches sur la parcelle de Vigeois (19).

Classement de sensibilité au phoma des variétés semées dans le réseau (Terres Inovia)

Toutes les variétés du réseau sont classées peu Sensible à Très Peu Sensible au Phoma

Céréales à paille

Mise en place progressive du réseau d'observations. Assèchement de la masse d'air et conditions ensoleillées pour plusieurs jours avec les premières gelées nocturnes – Au champ les parcelles les plus avancées sont à « 1 feuille » (BBCH 11).


Semis en cours à levée (BBCH10)

• Limaces

Recommandations avant les semis de céréales se reporter au BSV Limousin N°28 du 13/10/2026. À consulter : note nationale DGAL/SDQPV (octobre 2014) limaces.

Observations du réseau : semis en cours

Modélisation : calcul de l'indice de risque « limaces » par l'outil d'aide à la décision « Acta-Arvalis-Météo France » au 26/10/2026 à partir des données de la station Météo-France de Limoges-Bellegarde (courbe noire).



Évaluation du risque – limaces :
L'outil d'aide à la décision *Acta-Arvalis-Météo France* calcule un risque plus faible que celui des années précédentes à la même époque malgré les précipitations des jours derniers. La gestion du risque doit être raisonnée à la parcelle. Vigilance accrue en conditions agronomiques particulières (historique limaces, parcelles motteuses, résidus de précédents en surface, etc.).

• Pucerons d'automne

Généralités : de nombreuses variétés d'orge d'hiver sont tolérantes à la JNO (se reporter au BSV N°26du 29/09/2026).

Cette tolérance ne confère pas une résistance totale, mais elle permet de faire l'impasse à la condition d'avoir respecté les dates de semis recommandées. Pour les semis « trop » précoces, le risque n'est pas nul.

En blé tendre, 2 variétés seulement possèdent le gène de résistance partielle à la JNO : RGT Tweeteo et RGT Sundeo mais d'autres, bien que ne possédant pas le gène bdv2 expriment peu de symptômes. Il convient aussi de respecter de la même manière les dates de semis recommandées de ces variétés pour profiter au mieux de cette tolérance.

Prédiction des vols de Ravageurs

Les dégâts dus à la JNO peuvent être très importants : jusqu'à retournement de la culture en orge et de quelques quintaux à 25-30 q/ha pour le blé.

Observations du réseau : non signalés.

Période de risque : dès la levée (BBCH 09) et au-delà de fin tallage (BBCH 29) si nécessaire.

Seuils indicatifs de risque : sur orges sensibles (sans le gène de tolérance à la JNO), blé et triticale, une intervention est envisageable lorsque 10 % de plantes sont colonisées par au moins 1 puceron, ou bien si la présence de ces organismes est encore observée au bout de 10 jours.

Évaluation du risque – pucerons d'automne :

Les conditions seront favorables à l'installation des pucerons sur les jeunes plantes et ce, pour plusieurs jours. L'idéal est l'observation aux heures les plus « chaudes » de la journée – La vigilance s'impose dès la levée.

- **Cicadelles des céréales**

Observations du réseau : non signalées



Photo : V. LACORRE CDA 87

Des pièges destinés à estimer l'importance des populations en présence peuvent être disposés dès la levée

Période de risque : de la levée (BBCH 09) à 3 feuilles (BBCH 13).

Seuil indicatif de risque : à partir de 30 captures hebdomadaires, on considère que le risque de contagion est réel.

Evaluation du risque – cicadelles des céréales :

Comme les pucerons, la présence de cicadelles est favorisée avec des températures supérieures à 12 °C, l'absence de pluie et un temps ensoleillé. Les conditions actuelles sont donc peu favorables – le niveau de risque actuel est faible.





Prochain bulletin : mardi 3 novembre 2026

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de Santé du Végétal Nouvelle-Aquitaine Grandes cultures / Edition Zone Limousin sont les suivantes : FREDON N-A, Chambres D'agriculture 19, 23 et 87, OCEALIA, Agricentre Dumas, Sébastien Pinthon, Marc Bonnet Agriculteurs

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).