CHAMBRES D'AGRICULTURE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

GRANDES CULTURES

N°14 du 10/11/2026

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL de Bourgogne-Franche-Comté

SOMMAIRE

P. 1 Météo
P. 2 Biodiversité et santé des agrosystèmes
P. 3 Colza
P. 12 Céréales d'hiver

A RETENIR

Colza :

- Pression larvaire le plus souvent encore inférieure aux seuils. **Réaliser les Berlèses.** Vigilance pour les plus petits colzas.
- Encore quelques vols de CBT. Le temps perturbé ne devrait pas leur être favorable. Le risque doit déjà avoir été pris en compte.

Céréales d'hiver :

- Les graminées lèvent maintenant massivement dans les céréales.
- Risque limace faible. Surveillez les parcelles avec le retour des pluies.
- Risque pucerons faible sur les parcelles à 2-3 feuilles. Quelques parcelles ont atteint ou dépassé les seuils. Risque à réévaluer la semaine prochaine.
- Risque pucerons moyen sur les parcelles actuellement à 3 feuilles – début tallage.
- Risque cicadelle faible.

METEO

Prévisions à 7 jours :

MARDI 10	MERCREDI 11	JEUDI 12	VENDREDI 13	SAMEDI 14	DIMANCHE 15	LUNDI 16
13° / 18°	11° / 17°	9° / 15°	3° / 10°	1° / 10°	5° / 15°	8° / 14°
10 km/h	15 km/h	25 km/h	20 km/h	15 km/h	20 km/h	20 km/h
		50 km/h				50 km/h

(Source : Météo France, Annoire (39120), 03/11/2026 à 10h00. Retrouvez les données météo actualisées ici)

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT Liberté Égalité Fraternité
Avec le soutien financier de OFB OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ

Biodiversité et santé des agrosystèmes

Toutes les fiches biodiversité et santé des agrosystèmes ainsi que les fiches réglementaires sont disponibles sur le site de la Chambre régionale de Bourgogne Franche-Comté.

Biodiversité et santé des agrosystèmes

Ces notes biodiversité visent à accompagner la démarche agroécologique portée par le bulletin de santé du végétal.











Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de



COLZA


RESEAU 2026 - 2027

Cette semaine, le BSV a été rédigé à partir des observations réalisées dans 72 parcelles.

Stade

Dans le réseau, les stades s'échelonnent de 6 feuilles à rosette.

Les températures matinales fraiches ralentissent le développement des colzas.



Dans plusieurs situations, des rougissements liés à des faims d'azote et/ou aux amplitudes thermiques sont visibles.



Violassement des colzas

CA21

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de

Un début d'élongation (2 cm) est signalé dans 2 parcelles de Côte d'Or.

Pour limiter le risque lié aux insectes, des **objectifs de biomasse** ont été définis :

	A l'entrée de l'hiver
Biomasse minimum	> 1 kg/m² (soit plus de 30 g/plante)
Biomasse optimum	> 1,5 kg/m² (soit plus de 45 g/plante)

Quelques parcelles ont fait l'objet de pesée cette semaine. L'état des colzas est très hétérogène.

Commune	Département	Densité (pl/m²)	Biomasse (g/m²)	Biomasse (g/pl)	Stade
CHANCEAUX	21	13	3230	248	>B10
COURCELLES-LÈS-MONTBARD	21	27	1730	64	>B10
DAMPIERRE EN MONTAGNE	21	14	2120	151	B8
EPOISSES	21	19	2650	139	B8
LOUESME	21	25	1500	60	B8
MARCENAY	21	27	1500	56	B8
SAVIGNY LE SEC	21		3200		B10
ALLUY	58	25	900	36	>B10
VARENNES-LÈS-NARCY	58	23	1800	78	>B10
BOUGNON	70	30	1500 + 200 g/m² de plantes compagnes	50	B8
ROCHE-ET-RAUCOURT	70	23	1394	61	B10
CARISEY	89	14	1180	84	B6
CHAMPIGNELLES	89	25	1700	68	>B10
CHARBUY	89	23	900	39	B9
GY-L'ÉVÊQUE	89	12	90	8	B8
LUCY SUR CURE	89			23	B8
SAINT-JULIEN-DU-SAULT	89	16	768	48	B10
SAINTE VERTU	89	48	750	16	B7
VILLIERS-LOUIS	89	21	387	18	B9

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de

Ravageurs

Larves d'altises

Les larves après éclosion (L1) rejoignent les pétioles des plantes à partir du sol. Il est possible dans un premier temps d'observer la présence de la perforation leur permettant de pénétrer dans la plante. Ensuite les différents stades larvaires (L2-L3) sont observables dans les pétioles. Les larves âgées (Stade larvaire L3) sont les plus à risque car les meilleures candidates à la migration vers le cœur.

La lutte contre les larves de grosses altises est déconnectée de la lutte contre les altises adultes.


Attention à ne pas confondre dans les Berlèses, les larves d'altises avec les larves de diptères qui sont sans nuisibilité sur le colza.

Larve d'altise	Larve de diptère
3 paires de pattes	Absence de patte
Extrémités noires, voir plaques noires sur le corps à un stade avancé.	Corps entièrement translucide (jaune / blanc)



Larves d'altises dans Berlèse

Seine Yonne



Larves et pupes de diptères

CL. Lévêque - CA89

Les observations peuvent être réalisées par dissection des pétioles ou bien avec la méthode Berlèse (voir description ci-dessous ou vidéo ici). La méthode Berlèse permet davantage de précision dans l'identification et le dénombrement des larves d'altises.

L'utilisation de plantes compagnes (si elles sont suffisamment développées : 150 à 200 g/m² minimum) peut permettre de diminuer la pression exercée par les larves par un effet de leurre.

a. Observations :

26 parcelles ont fait l'objet d'une observation avec la méthode Berlèse cette semaine. 2 d'entre elles dépassent le seuil de risque pour petits colzas (2,5 larves par plante).

La pression semble pour le moment limitée malgré la date avancée en saison. Il est important de la mesurer à la parcelle avec des Berlèses.

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de

Commune	Département	Nombre de larves par plante
CHANCEAUX	21	0,2
EPOISSES	21	0,4
LOUESME	21	0
DAMPIERRE EN MONTAGNE	21	0,1
COURCELLES-LÈS-MONTBARD	21	3,4
SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE	21	2,3
VIC-DES-PRÉS	21	0
PARIGNY-LES-VAUX zone traitée	58	1,2
PARIGNY-LES-VAUX	58	3
BONBOILLON	70	0,2
BOUGNON	70	1
COLOMBINE	70	1
CUGNEY	70	1,4
ROCHE-ET-RAUCOURT	70	0,04
VELESMES-ÉCHEVANNE	70	0,2
ALLEREY-SUR-SAÔNE	71	0,3
SAINT-GERVAIS-EN-VALLIÈRE	71	0
SEVREY	71	0,1
BRANNAY	89	0,5
CARISEY	89	1,3
CHAMPIGNELLES	89	1
CUY	89	1,05
LINDRY	89	1
LUCY-SUR-CURE	89	0,2
SAINT-JULIEN-DU-SAULT	89	0
SAINT-VALÉRIEN	89	0,3
SAINTE-VERTU	89	2



Larves de grosses altises en balade sur les pétioles

E. Courbet - CA70

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Liberté Égalité Fraternité
Avec le soutien financier de

b. Seuil indicatif de risque :

Méthode Berlèse :

Infestation larvaire	Risque agronomique	Indication de risque
> 5 larves / plante	Toutes situations	Risque fort
Entre 3 et 5 larves / plante	Biomasse < 45 g/pied **OU** Croissance limitée (rougissement, faible disponibilité en azote, mauvais enracinement)	Risque fort
	Biomasse > 45 g/pied **ET** Croissance continue sans faim d'azote (pas de rougissement, disponibilité en azote, bon enracinement)	Risque moyen
< 3 larves / plante	Toutes situations	Risque faible

Source Terres Inovia

Outil d'estimation du risque lié aux larves de grosse altise (Terres Inovia) : https://www.terresinovia.fr/fr/oad/estimation-du-risque-lie-aux-larves-de-grosse-altise-altise-dhiver

c. Analyse du risque :

Pour les colzas bien développés et poussant, le risque est **faible**.



Pour les colzas plus petits ou en situation de carence, le risque est **faible** à **moyen**.
Réaliser des Berlèses pour quantifier la pression.



Une large majorité des grosses altises du colza en région Bourgogne-Franche-Comté présente des résistances aux pyréthrinoïdes.

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de OFB

METHODE BERLESE POUR L'ESTIMATION DE LA PRESSION EN LARVES DE GROSSE ALTISE DANS LES COLZAS

1. **Prélever au champ** au minimum une vingtaine de plantes (4 x 5 plantes consécutives),
2. De retour au labo ou au bureau, **nettoyer rapidement les plantes** à l'eau claire,
3. **Couper les pivots et le plus gros des limbes** (non touchés)
4. Rincer encore si besoin les plantes (le nettoyage permet d'éviter les tombées et dépôts de terre dans le récipient et facilite le comptage des larves),
5. **Répartir les plantes sur un grillage qui recouvre un récipient** (cuvette, entonnoir sur flacon, …). Le nombre de plantes à positionner sur chaque dispositif dépend de la taille des plantes. Il est important qu'aucun morceau de plante ne dépasse de la cuvette ou de l'entonnoir au risque d'avoir des larves tombant à côté du dispositif.
6. Laisser sécher pendant 8 à 15 jours (selon la température de la pièce et la taille des plantes),
7. Après dessèchement complet des plantes, **compter le nombre de larves tombées** dans les récipients. Les observations peuvent aussi se réaliser au fur et à mesure du séchage.





Terres Inovia


Charançon du bourgeon terminal (CBT)

Coléoptère de 2,5 à 3,7 mm de long. De couleur noire, brillant, avec l'extrémité des pattes rousses et présence d'une tache dorsale blanche.


a. Observations :

L'activité des charançons s'est poursuivie malgré le vent. 32 parcelles sur 63 observées (soit 51%) piègent ce ravageur cette semaine. Le nombre d'individus capturés est toutefois plus modéré que la semaine dernière : en moyenne de 2,7 (de 1 à 6).

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de



Captures de CBT du 4 au 10 novembre 2026



Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de

Suivis de maturité CBT – Dissections réalisées par la FREDON BFC :

Commune	Résultats des captures du 02/11
GY L'EVEQUE (89)	8 femelles avec des œufs matures 3 femelles vides (pas fécondées ou déjà pondues)
VILLIERS LOUIS (89)	1 femelle vide (pas fécondée ou déjà pondue)
TURNY (89)	1 femelle avec des œufs matures 1 femelle vide (pas fécondée ou déjà pondue)
CARISEY (89)	10 femelles avec des œufs matures 3 femelles vides (pas fécondées ou déjà pondues)

La présence de femelles matures dans les relevées de début novembre indique qu'un 2ème pic de vol de CBT a eu lieu.

Des pontes sont désormais régulièrement observées sur plantes.



Œufs de CBT


E. Courbet - CA70

b. Période de risque :

Du développement des premières larves jusqu'au décollement du bourgeon terminal. La lutte contre les larves étant impossible, c'est l'arrivée des adultes qui va déclencher le début de la période de risque. La cuvette jaune (positionnée au-dessus de la végétation) est indispensable pour effectuer ce piégeage. Les vols de CBT peuvent avoir lieu de fin septembre jusqu'à l'entrée de l'hiver.

Terres Inovia a développé un outil pour prédire les vols de CBT : https://www.terresinovia.fr/fr/oad/prediction-des-vols-de-ravageurs

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de



Probabilité de captures de CBT à Dijon.

Les pluies annoncées ne devraient pas être favorables à une poursuite des vols.

c. Analyse du risque :



Les gros colzas (40-50 g/plante et plus) sont peu sujets au risque. Risque **assez faible**.

Pour les colzas plus petits : le risque doit déjà avoir été pris en compte.



La gestion du risque CBT sur colza doit prendre en compte les phénomènes de résistances aux pyréthrinoïdes.

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de
OFB



CEREALES D'HIVER - BLE TENDRE

RESEAU 2026 - 2027

Stade

Les semis sont maintenant terminés. Beaucoup de parcelles ont été semées la semaine dernière avec pour objectif de réduire l'enherbement.

Les semis de septembre sont à début tallage.

Les semis de début octobre sont à 3 feuilles.

Les semis du 15/10 sont au stade 2 feuilles.

84 parcelles levées ont fait l'objet d'une saisie sur Vigicultures (53 blés et 31 orges).


	Non levée	Levée à 1 f	2 f	3 f	Début tallage	Total
Blé	4	20	25	7	1	57
Orge	1	16	10	4	1	32
Total	**5**	**36**	**35**	**11**	**2**	**89**

Tableau des observations en nombre de parcelles


Ravageurs

Limaces

Que ce soit à Dijon, Chargey, Auxerre, Nevers ou Lons, le risque estimé par le modèle agro-climatique inter institut s'annonce très faible.



Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
Avec le soutien financier de



Evaluer le risque limaces

Vous pouvez évaluer le risque limaces avant les semis.

La pose de 4 pièges standardisés, couvrant 0,25 m² chacun, permet de donner une estimation du nombre d'individus au mètre carré dans la parcelle.

Pour pallier autant que possible l'hétérogénéité d'infestation, il est conseillé d'espacer les pièges d'au moins 5 mètres et de les répartir à l'intérieur de la parcelle en évitant les bordures pour ne pas biaiser la mesure.

De plus, pour éviter de créer des refuges de limaces, il est judicieux de déplacer tous les pièges de quelques mètres après chaque relevé.

Les pièges sont à installer face aluminium visible, de préférence le soir et doivent être préalablement humidifiés à saturation. Aucun granulé molluscicide ne doit être positionné dessous.

A partir de ce piège, le risque limace se raisonne avec les seuils suivants (rapporter le comptage du piège au m²) :

- 1 à 10 limaces / m² : risque faible
- 10 à 20 limaces / m² : risque moyen
- 20 à 50 limaces / m² : risque élevé
- Plus de 50 limaces / m² : risque très élevé

En cas d'observations de dégâts, privilégiez les spécialités de biocontrôle à base de phosphate ferrique.

Les dégâts augmentent sensiblement. Des morsures (3 % de pieds) sont maintenant observées dans 13 parcelles sur 44.

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT Liberté Égalité Fraternité
Avec le soutien financier de OFB OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ

commune	Code insee		Organisme	culture	variete	date_semis	% plantes avec morsures
MAGNY-SUR-TILLE	21370		ARVALIS	Orge d'hiver	KWS Faro	19/10/2026	0
MERCEUIL	21405		FREDON BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	Blé tendre d'hiver	LG Absalon	06/10/2026	0
AVILLEY	25038		CA 25-90	Blé tendre d'hiver	KWS Sphere	16-oct	0
OLLANS	25430		CA 25-90	Blé tendre d'hiver	Intensity	14/10/2026	0
POULIGNEY-LUSANS	25468		CA 25-90	Blé tendre d'hiver		14/10/2026	0
VENNANS	25599		CA 25-90	Orge d'hiver	Eternel	30/09/2026	0
ARLAY	39017		CA 39	Orge d'hiver	SY Dakoota	05/10/2026	0
COLONNE	39159		INTERVAL	Blé tendre d'hiver	conquistador	15/10/2026	0
RUFFEY-SUR-SEILLE	39471		CA 39	Blé tendre d'hiver	Conquistador	13/10/2026	0
VILLETTE-LÈS-DOLE	39573		CA 39	Orge d'hiver	Constel	09/10/2026	1
CRUX-LA-VILLE	58092		CA 58	Blé tendre d'hiver		19/10/2026	0
LURCY-LE-BOURG	58147		CA 58	Blé tendre d'hiver		05/10/2026	0
LURCY-LE-BOURG	58147		CA 58	Orge d'hiver	Carrousel	05/10/2026	5
MONTIGNY-SUR-CANNE	58178		CA 58	Blé tendre d'hiver		14/10/2026	0
MONTIGNY-SUR-CANNE	58178		CA 58	Orge d'hiver	LG Zorica	15/10/2026	0
NARCY	58189		CA 58	Orge d'hiver	Carrousel	19/10/2026	0
PARIGNY-LES-VAUX	58207		AXEREAL	Blé tendre d'hiver			0
TINTURY	58292		CA 58	Blé tendre d'hiver		19/10/2026	12
VARENNES-LÈS-NARCY	58302		CA 58	Blé tendre d'hiver	Mélange	15/10/2026	0
AUVET-ET-LA-CHAPELOTTE	70043		GIROUX SAS	Blé tendre d'hiver	Unik	15/10/2026	1

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de

FRANCOURT	70251		CA 70	Orge d'hiver	KWS Faro	13/10/2026	0
GRATTERY	70278		EPLEFPA VESOUL	Orge d'hiver	Mélange	24/10/2026	0
MEMBREY	70340		CA 70	Blé tendre d'hiver	Chevignon	05/10/2026	0
PORT-SUR-SAÔNE	70421		EPLEFPA VESOUL	Blé tendre d'hiver	Spirou	16/10/2026	2
BUXY	71070		CA 71	Blé tendre d'hiver	Conquistador	09/10/2026	0
BUXY	71070		CA 71	Orge d'hiver		13/10/2026	0
SAINT-GERVAIS-EN-VALLIÈRE	71423		FREDON BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	Orge d'hiver	LG Zorica	11/10/2026	2
AUXERRE	89024		CA 89	Orge d'hiver	KWS Faro	10/10/2026	2
BRIENON-SUR-ARMANÇON	89055		CA 89	Orge d'hiver	KWS Faro	15/10/2026	1
CHAMPIGNELLES	89073		110 BOURGOGNE	Orge d'hiver	KWS Delis	17/10/2026	0
CHARBUY	89083		CA 89	Blé tendre d'hiver	KWS Constellum	13/10/2026	0
GY-L'ÉVÊQUE	89199		CA 89	Blé tendre d'hiver	Chevignon	08/10/2026	0
GY-L'ÉVÊQUE	89199		CA 89	Orge d'hiver	caroussel	27/10/2026	0
SAINPUITS	89331		CA 89	Blé tendre d'hiver	FUNNY	16/10/2026	0
SAINT-MORÉ	89362		CA 89	Orge d'hiver	Comtesse	15/10/2026	1
SALIGNY	89373		CA 89	Blé tendre d'hiver		22/10/2026	0
SALIGNY	89373		CA 89	Blé tendre d'hiver	Kingkong	18/10/2026	0
VILLEBOUGIS	89450		CA 89	Blé tendre d'hiver	Intensity	14/10/2026	2
FONTAINE	90047		CA 25-90	Blé tendre d'hiver	Chevignon	08/10/2026	0
LACHAPELLE-SOUS-ROUGEMONT	90058		CA 25-90	Blé tendre d'hiver	LG Abilene	16/10/2026	0
PETITEFONTAINE	90078		CA 25-90	Orge d'hiver	KWS Mattis	03/10/2026	1

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de

CHÂTILLON SUR SEINE			CA 21	Orge d'hiver	Comtesse	16/10/2026	1
CORROMBLES			CA 21	Orge d'hiver	KWS FARO	14/10/2026	1
FRESNES			CA 21	Orge d'hiver	Comtesse	19/10/2026	0

% plantes avec morsures de limaces


réseau BSV



Morsures sur blé

Elodie JOUDELAT - CA89

Le risque limace est faible. Le risque sera à réévaluer la semaine prochaine. Surveillez cependant les parcelles avec peu de travail du sol et couvertes de végétation.



Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de


Les cicadelles (Psammotettix alienus) responsables des symptômes de pieds chétifs

Quelques rares cicadelles ont été dénombrées sur 8 pièges englués posés (de 1 à 20 insectes).


Risque actuellement faible à moyen sur les parcelles levées (2 feuilles) et sur les parcelles en cours de levée (pointant à 1 feuille).

La météo de la semaine à venir ne sera pas favorable au déplacement de cet insecte.

Surveillez les cicadelles grises dès le stade pointant de la céréale dans les situations qui se réchauffent rapidement et / ou proches de repousses de céréales. Réaliser les observations dans les heures chaudes et ensoleillées de la journée.




Les variétés KWS Futuris et KWS Innovatris sont tolérantes au virus des pieds chétifs




Les pucerons (Rhopalosiphum Padi, Sitobion, Metopolophium…) vecteurs de la jaunisse nanisante

Le vol de pucerons est nul depuis 4 semaines à la tour à succion.



Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de



Risque pucerons pour des semis de BTH à 3 dates : 05/10 – 15/10 et 25/10.

Données Météo France, modèle Aphibox, ARVALIS

Le risque pucerons est globalement faible sur la région *(cohérent avec la tour à succion d'Auxerre).*

ETAT DES LIEUX

Dès le début de la levée, un état des lieux est à réaliser par beau temps en parcourant la parcelle. Le seuil d'intervention est de 10 % de plantes touchées par au moins un puceron. En dessous de ce seuil, il ne faut pas laisser séjourner les pucerons plus de 10 jours de suite.

Des pucerons ailés sont signalés dans 20 parcelles sur 73 (27 %) avec des infestations moyennes de 3 % de plantes porteuses d'au moins un puceron. Le pourcentage de parcelles avec pucerons est égal à la semaine dernière.

Le seuil est atteint ou dépassé dans 3 parcelles, comme la semaine dernière.

Des pucerons sont également capturés sur les pièges englués.

Commune	Code insee	Organisme	Culture	variété	Date semis	% pieds porteurs d'au moins un puceron	Stade
MAGNY-SUR-TILLE	21370	ARVALIS	Orge	KWS Faro	19/10	0	1 F
MERCEUIL	21405	FREDON BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	Blé	LG Absalon	6/10	0	3 F
AVILLEY	25038	CA 25-90	Blé	KWS Sphere	16/10	0	2 F
OLLANS	25430	CA 25-90	Blé	Intensity	14/10	0	2 F
POULIGNEY-LUSANS	25468	CA 25-90	Blé		14/10	0	2 F
VENNANS	25599	CA 25-90	Orge	Eternel	30/9	0	3 F
ANNOIRE	39011	CA 39	Orge	Coopernic	16/10	0	2 F

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Liberté Égalité Fraternité
Avec le soutien financier de
OFB OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ

ARLAY	39017	CA 39	Orge	SY Dakoota	5/10	3	Debut tallage
ASNANS-BEAUVOISIN	39022	CA 39	Blé	Conquistador	14/10	0	1 F
AUDELANGE	39024	CA 39	Blé	SY Admiration	7/10	0	3 F
AUDELANGE	39024	CA 39	Orge	LG Zorica	12/10	0	3 F
CHEMIN	39138	CA 39	Blé	SY Admiration	19/10	0	Levée
COLONNE	39159	INTERVAL	Blé	conquistador	15/10	4	2 F
RUFFEY-SUR-SEILLE	39471	CA 39	Blé	Conquistador	13/10	1	2 F
SERMANGE	39513	CA 39	Blé	Unik	15/10	20	2 F
VILLETTE-LÈS-DOLE	39573	CA 39	Orge	Constel	9/10	1	3 F
CRUX-LA-VILLE	58092	CA 58	Blé		19/10	0	Levée
LURCY-LE-BOURG	58147	CA 58	Blé		5/10	0	2 F
LURCY-LE-BOURG	58147	CA 58	Orge	Carrousel	5/10	0	2 F
MONTIGNY-SUR-CANNE	58178	CA 58	Blé		14/10	0	1 F
MONTIGNY-SUR-CANNE	58178	CA 58	Orge	LG Zorica	15/10	0	1 F
NARCY	58189	CA 58	Orge	Carrousel	19/10	2	1 F
PARIGNY-LES-VAUX	58207	AXEREAL	Blé		9/9	2	1 F
TINTURY	58292	CA 58	Blé		19/10	1	1 F
VARENNES-LÈS-NARCY	58302	CA 58	Blé	Mélange	15/10	1	2 F
AUVET-ET-LA-CHAPELOTTE	70043	GIROUX SAS	Blé	Unik	15/10	1	1 F
BEAUJEU-SAINT-VALLIER-PIERREJUX-ET-QUITTEUR	70058	CA 70	Blé		13/10	0	2 F
COLOMBINE	70152	CA 70	Blé	KWS Sphere	8/10	2	3 F
CLANS	70158	CA 70	Blé		5/10	0	3 F
CUGNEY	70192	CA 70	Blé		4/10	1	3 F
FRANCOURT	70251	CA 70	Orge	KWS Faro	13/10	0	1 F
GRATTERY	70278	EPLEFPA VESOUL	Orge	Mélange	24/10	0	Levée
MEMBREY	70340	CA 70	Blé	LG Asterion	3/10	10	2 F
MONT-LE-VERNOIS	70367	CA 70	Orge		7/10	2	2 F
PESMES	70408	CA 70	Blé	LG Absalon	15/10	1	2 F
PORT-SUR-SAÔNE	70421	EPLEFPA VESOUL	Blé	Spirou	16/10	0	Levée
BUXY	71070	CA 71	Blé	Conquistador	9/10	0	3 F
BUXY	71070	CA 71	Orge		13/10	0	2 F
DENNEVY	71171	COOP BOURGOGNE DU SUD	Orge		5/10	0	3 F

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto GOUVERNEMENT Liberté Égalité Fraternité
Avec le soutien financier de OFB OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ

DENNEVY	71171	COOP BOURGOGNE DU SUD	Orge		5/10	0	3 F
MONTPONT-EN-BRESSE	71318	COOP BOURGOGNE DU SUD	Blé	Conquistador	16/10	0	2 F
SAINT-GERVAIS-EN-VALLIÈRE	71423	FREDON BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	Orge	LG Zorica	11/10	0	2 F
AUXERRE	89024	CA 89	Orge	KWS Faro	10/10	0	2 F
BRIENON-SUR-ARMANÇON	89055	CA 89	Orge	KWS Faro	15/10	0	1 F
CHAMPIGNELLES	89073	110 BOURGOGNE	Orge	KWS Delis	17/10	2	1 F
CHARBUY	89083	CA 89	Blé	KWS Constellum	13/10	0	2 F
GY-L'ÉVÊQUE	89199	CA 89	Blé	Chevignon	8/10	0	2 F
GY-L'ÉVÊQUE	89199	CA 89	Orge	caroussel	27/10	0	Levée
LUCY-SUR-CURE	89233	CA 89	Blé	Outdoor	6/10	0	2 F
SAINPUITS	89331	CA 89	Blé	FUNNY	16/10	0	1 F
SAINT-MORÉ	89362	CA 89	Orge	Comtesse	15/10	0	Levée
SAINT-VALÉRIEN	89370	SOUFFLET AGRICULTURE	Blé	PONDOR	14/10	5	1 F
SAINT-VALÉRIEN	89370	SOUFFLET AGRICULTURE	Orge	LAROCHEL	18/10	10	1 F
SALIGNY	89373	CA 89	Blé		22/10	1	2 F
SALIGNY	89373	CA 89	Blé	Kingkong	18/10	0	1 F
VILLEBOUGIS	89450	CA 89	Blé	Intensity	14/10	0	2 F
FONTAINE	90047	CA 25-90	Blé	Chevignon	8/10	0	2 F
LACHAPELLE-SOUS-ROUGEMONT	90058	CA 25-90	Blé	LG Abilene	16/10	0	1 F
PETITEFONTAINE	90078	CA 25-90	Orge	KWS Mattis	3/10	0	2 F
		CA 21	Blé	Mélange		0	1 F
MARLIENS		CA 21	Blé	LG ABSALON	14/10	0	2 F
CORROMBLES		CA 21	Blé	THERMIDOR	11/10	0	2 F
MASSINGY		CA 21	Blé	RGT PROPULSO	18/10	0	1 F
MONTIGNY MONTFORT		CA 21	Blé	Mélange	3/11	0	Levée
QUETIGNY		CA 21	Blé	THERMIDOR	13/10	0	2 F
RUFFEY-LÈS-ECHIREY		CA 21	Blé	Mélange	19/10	1	1 F
VAROIS-ET-CHAIGNOT		CA 21	Blé	THERMIDOR	15/10	0	1 F
CHÂTILLON SUR SEINE		CA 21	Orge	Comtesse	16/10	0	1 F
CORROMBLES		CA 21	Orge	KWS FARO	14/10	0	2 F
FRESNES		CA 21	Orge	Comtesse	19/10	0	1 F
		CA 21	Orge	Mélange		0	1 F

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de

		CA 21	Orge	Mélange		0	1 F
MARLIENS		CA 21	Orge	KWS FARO		0	2 F

*% pieds porteurs d'au moins un puceron – réseau BSV - **En rouge** = seuil atteint ou dépassé*



Puceron ailé sur orge

Elodie JOUDELAT - CA89



Un puceron sans aile sur pied de blé




Un puceron ailé sur piège englué

Photo COURBET - CA70

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Liberté Égalité Fraternité
Avec le soutien financier de


Sur les quelques parcelles actuellement au stade tallage, la colonisation est en cours. Le risque est moyen.



Le risque est faible lorsque les infestations sont inférieures aux seuils (majorité des cas).

Le risque est moyen lorsque les infestations atteignent ou dépassent le seuil ou si les pucerons séjournent plus de 10 jours dans les parcelles.

Réalisez des observations lors d'après-midi ensoleillées pour évaluer le risque.




Risque faible sur orges et blés tolérants à la JNO (liste non exhaustive).

Escourgeons brassicoles : CARROUSEL, CONSTEL

Fourragers : KWS FUTURIS, KWS INNOVATRIS, KWS JOYAU, LAROCHEL, LG ZEBRA, LG ZELDA, LG ZORBA, LG ZORICA, ETERNEL, SY SPAROO…

ORGES 2 RANGS : Atomic, Duchesse, Eternity, Idilic, KWS Legendis, KWS Mattis, KWS Ovnis, LG Caiman, LG Caporal, Majorett, Majuscule, Manade, Orcade, Organa, Paquita, Spazio…

Blé : RGT Sundeo



Adventices

Les graminées lèvent maintenant massivement.

Réglementation prosulfocarbe : cliquez

Vidéo = comment reconnaitre les graminées (cliquez)

Les graminées du type vulpins, ray-grass, bromes sont de plus en plus résistantes aux différentes molécules

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de

Liens utiles pour plus d'information :

- Résistances aux PPP : R4P (r4p-inra.fr)
- Fiches biodiversité : https://ecophyto-bfc.fr/documentation/fiches-biodiversite/
- Plantes exotiques envahissantes :http://especes-exotiques-envahissantes.fr/centre-de-ressources-especes-exotiques-envahissantes/
- Organismes nuisibles réglementés : https://www.eppo.int/ACTIVITIES/quarantine_activities
- Biocontrôle : https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Liberté
Égalité
Fraternité
Avec le soutien financier de

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté et rédaction animée par ARVALIS-Institut du Végétal, Terres Inovia et les Chambres d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté.

Bulletin édité à partir des observations réalisées par :

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux-mêmes réalisées sur leurs parcelles ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques de leurs conseillers.

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Liberté Égalité Fraternité
Avec le soutien financier de OFB