

CHAMBRES D'AGRICULTURE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

GRANDES CULTURES

N°13 du 03/11/2026

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL de Bourgogne-Franche-Comté

SOMMAIRE

P. 1 Météo
P. 2 Biodiversité et santé des agrosystèmes
P. 3 Colza
P. 13 Céréales d'hiver

A RETENIR

Colza :

- Reprise du vol de CBT. Risque accru sur les petits colzas si les conditions météo redeviennent favorables à l'activité des insectes.
- 1ères larves de grosses altises visibles en plaine, dans de faibles quantités. Débuter les Berlèses.
- Pucerons : toujours d'importantes colonies localement. Veiller à ce qu'ils n'entravent pas le développement.

Céréales d'hiver :

- Les graminées lèvent maintenant massivement dans les céréales.
- Risque limace faible. Surveillez les parcelles avec le retour des pluies.
- Risque pucerons faible sur les parcelles à 2-3 feuilles. Quelques parcelles ont atteint ou dépassé les seuils. Risque à réévaluer la semaine prochaine.
- Risque pucerons moyen sur les parcelles actuellement à 3 feuilles – début tallage.
- Risque cicadelle faible.

METEO

Prévisions à 7 jours :

MARDI 03	MERCREDI 04	JEUDI 05	VENDREDI 06	SAMEDI 07	DIMANCHE 08	LUNDI 09
2° / 10°	3° / 11°	0° / 13°	3° / 9°	5° / 11°	4° / 12°	6° / 15°
20 km/h	15 km/h	5 km/h	5 km/h	5 km/h	20 km/h	20 km/h
45 km/h						45 km/h

(Source : Météo France, Annoire (39120), 03/11/2026 à 10h00. Retrouvez les données météo actualisées ici)

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT Liberté Égalité Fraternité
Avec le soutien financier de OFB OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ

Biodiversité et santé des agrosystèmes

Toutes les fiches biodiversité et santé des agrosystèmes ainsi que les fiches réglementaires sont disponibles sur le site de la Chambre régionale de Bourgogne Franche-Comté.

Biodiversité et santé des agrosystèmes

Ces notes biodiversité visent à accompagner la démarche agroécologique portée par le bulletin de santé du végétal.











Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Liberté
Égalité
Fraternité
Avec le soutien financier de



COLZA


RESEAU 2026 - 2027

Cette semaine, le BSV a été rédigé à partir des observations réalisées dans 73 parcelles.

Stade

Dans le réseau, les stades s'échelonnent de 6 feuilles à rosette.

Les températures matinales fraiches ralentissent le développement des colzas.



Dans quelques rares situations (gros colzas, sols superficiels), des rougissements liés à des faims d'azote sont visibles.

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de



Début de rougissement des colzas

E. Joudelat - CA89

Pour limiter le risque lié aux insectes, des **objectifs de biomasse** ont été définis :

	A l'entrée de l'hiver
Biomasse minimum	> 1 kg/m² (soit plus de 30 g/plante)
Biomasse optimum	> 1,5 kg/m² (soit plus de 45 g/plante)

Quelques parcelles ont fait l'objet de pesée cette semaine. L'état des colzas est très hétérogène.

Commune	Département	Densité (pl/m²)	Biomasse (g/m²)	Biomasse (g/pl)	Stade
BRESSEY SUR TILLE	21	38			B8
FLAGEY-ECHÉZEAUX	21	30			B7
TARSUL	21	30			B8
ANNOIRE	39	29	1337	46	B10
BONBOILLON	70	15	450	30	B8
BOUGNON	70	30	1500	50	B8
COLOMBINE	70	15	1000	67	B9
CUGNEY	70	14	1350	96	B9
MOTEY-BESUCHE	70	19	1700	89	B9
PESMES	70	18	1500	83	B9
RIOZ	70	40	2500	63	B8
ROCHE-ET-RAUCOURT	70	23			B10
VELESMES-ÉCHEVANNE	70	12	1400	117	B10
BRANNAY 1	89	32	580	18	B7
BRANNAY 2	89	20	800 + 100 g/m² de plantes compagnes	40	B7

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de

BRIENON SUR ARMANCON	89			9	B8
CARISEY	89	16	560	35	B5
CHAMPIGNELLES	89	25	1950	78	>B10
CHARBUY	89	29			B8
SAINPUITS	89	14	90	6	B7
SAINTE-VERTU	89	48	750	16	B7
VILLIERS-LOUIS	89	18			B8

Ravageurs

Charançon du bourgeon terminal (CBT)

Coléoptère de 2,5 à 3,7 mm de long. De couleur noire, brillant, avec l'extrémité des pattes rousses et présence d'une tache dorsale blanche.




Charançon du bourgeon terminal

E. Courbet - CA70


a. Observations :

Le soleil durant les après-midis a engendré une reprise du vol. 47 parcelles sur 69 observées (soit 68 %) piègent ce ravageur cette semaine. Le nombre d'individus capturés est en moyenne de 9,8 (de 1 à 72).

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de



Captures de CBT du 28 octobre au 3 novembre 2026



Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de

Des pontes sont observées sur plantes dans deux parcelles (Côte d'Or et Haute Saône). Elles correspondent probablement aux vols d'il y a 15 jours.




Œuf de CBT

E. Courbet - CA70

b. Période de risque :

Du développement des premières larves jusqu'au décollement du bourgeon terminal. La lutte contre les larves étant impossible, c'est l'arrivée des adultes qui va déclencher le début de la période de risque. La cuvette jaune (positionnée au-dessus de la végétation) est indispensable pour effectuer ce piégeage. Les vols de CBT peuvent avoir lieu de fin septembre jusqu'à l'entrée de l'hiver.

Terres Inovia a développé un outil pour prédire les vols de CBT : https://www.terresinovia.fr/fr/oad/prediction-des-vols-de-ravageurs



Probabilité de captures de CBT à Dijon.

Les températures fraiches ne devraient pas être favorables à une poursuite des vols.

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de

c. Analyse du risque :

Les gros colzas (40-50 g/plante et plus) sont peu sujets au risque. Risque **assez faible**.



Pour les colzas plus petits :

Les vols datant de plus de 15 jours doivent déjà avoir été pris en compte.

Dans les secteurs où des captures significatives ont été observées cette semaine, le risque est **moyen** à **élevé** selon les conditions climatiques à venir (températures, ensoleillement).



Dans les secteurs où aucun CBT n'a encore été piégé récemment OU dans les situations déjà protégées depuis moins de 8-10 jours, le risque est **assez faible**.



Pour garantir une observation fiable, il est indispensable que le bas des cuvettes soit positionné au niveau de la végétation et qu'elle soit de couleur vive. C'est la vision du « jaune » qui attire les CBT !

La gestion du risque CBT sur colza doit prendre en compte les phénomènes de résistances aux pyréthrinoïdes.

Larves d'altises


Les larves après éclosion (L1) rejoignent les pétioles des plantes à partir du sol. Il est possible dans un premier temps d'observer la présence de la perforation leur permettant de pénétrer dans la plante. Ensuite les différents stades larvaires (L2-L3) sont observables dans les pétioles. Les larves âgées (Stade larvaire L3) sont les plus à risque car les meilleures candidates à la migration vers le cœur.

La lutte contre les larves de grosses altises est déconnectée de la lutte contre les altises adultes.


Attention à ne pas confondre dans les Berlèses, les larves d'altises avec les larves de diptères qui sont sans nuisibilité sur le colza.

Larve d'altise	Larve de diptère
3 paires de pattes	Absence de patte
Extrémités noires, voir plaques noires sur le corps à un stade avancé.	Corps entièrement translucide (jaune / blanc)

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de



Larves d'altises (vu à la loupe)



Larves et pupes de diptères

CL. Lévêque - CA89

Les observations peuvent être réalisées par dissection des pétioles ou bien avec la méthode Berlèse (voir description ci-dessous ou vidéo ici). La méthode Berlèse permet davantage de précision dans l'identification et le dénombrement des larves d'altises.

L'utilisation de plantes compagnes (si elles sont suffisamment développées : 150 à 200 g/m² minimum) peut permettre de diminuer la pression exercée par les larves par un effet de leurre.

a. Observations :

19 parcelles ont fait l'objet d'une observation avec la méthode Berlèse cette semaine. 5 d'entre elles ne possèdent aucune larve. Pour 11 parcelles, le nombre de larve est compris entre 0,1 et 0,2 larves / plante. Seulement 3 parcelles font état d'une présence significative de larves (1 à 1,2 / plante, toujours bien en deçà du seuil de risque).





Galeries de larves dans les pétioles

E. Courbet - CA70

b. Seuil indicatif de risque :

Méthode Berlèse :

- Si colza de plus de 45 g/plante, bien enracinés et sans carence azotée (absence de risque agronomique) : 5 larves en moyenne par plante.

- Si risque agronomique identifié : 2,5 larves en moyenne par plante.

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Liberté Égalité Fraternité
Avec le soutien financier de

Outil d'estimation du risque lié aux larves de grosse altise (Terres Inovia) : https://www.terresinovia.fr/fr/oad/estimation-du-risque-lie-aux-larves-de-grosse-altise-altise-dhiver

c. Analyse du risque :



Le risque est encore **faible**.

Réaliser des Berlèses pour quantifier la pression.

Une large majorité des grosses altises du colza en région Bourgogne-Franche-Comté présente des résistances aux pyréthrinoïdes.

METHODE BERLESE POUR L'ESTIMATION DE LA PRESSION EN LARVES DE GROSSE ALTISE DANS LES COLZAS

1. **Prélever au champ** au minimum une vingtaine de plantes (4 x 5 plantes consécutives),
2. De retour au labo ou au bureau, **nettoyer rapidement les plantes** à l'eau claire,
3. **Couper les pivots et le plus gros des limbes** (non touchés)
4. Rincer encore si besoin les plantes (le nettoyage permet d'éviter les tombées et dépôts de terre dans le récipient et facilite le comptage des larves),
5. **Répartir les plantes sur un grillage qui recouvre un récipient** (cuvette, entonnoir sur flacon, …). Le nombre de plantes à positionner sur chaque dispositif dépend de la taille des plantes. Il est important qu'aucun morceau de plante ne dépasse de la cuvette ou de l'entonnoir au risque d'avoir des larves tombant à côté du dispositif.
6. Laisser sécher pendant 8 à 15 jours (selon la température de la pièce et la taille des plantes),
7. Après dessèchement complet des plantes, **compter le nombre de larves tombées** dans les récipients. Les observations peuvent aussi se réaliser au fur et à mesure du séchage.



Terres Inovia

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de

Pucerons verts

a. Observations :

14 parcelles signalent la présence de ce ravageur. Le seuil de 20 % des plantes avec présence est atteint dans 6 de ces parcelles, avec parfois d'importantes colonies.

La présence de pucerons parasités est aussi parfois remarquée.

1 parcelle de Saône et Loire signalent également la présence de pucerons cendrés. Le risque réside dans le prélèvement de sève sur de petits colzas et non dans la transmission de virose.



Colonie de pucerons verts sous une feuille de colza, avec 2 pucerons momifiés,

E. Joudelat - CA89



Colza marquant la forte pression puceron

C. Dieudonne - Seine Yonne

b. Période de risque :

Depuis la levée jusqu'au stade 6 feuilles.

c. Seuil indicatif de risque :

Plus de 2 pieds sur 10 avec présence de pucerons.

d. Analyse du risque :

Pour les colzas bien développés ou ceux avec peu ou pas de pucerons, le risque est **faible**.



Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de

Pour les parcelles à faible biomasse et avec une forte pression (nombreuses colonies, feuilles qui se recroquevillent, croissance ralentie), le risque est **élevé**.



La gestion des pucerons verts sur colza doit prendre en compte les phénomènes de résistances aux pyréthrinoïdes.

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de



CEREALES D'HIVER - BLE TENDRE
RESEAU 2026 - 2027

Stade

Les semis de céréales sont en cours. Environ 90% des surfaces sont semées.

Les semis de septembre sont à début tallage.


Les semis de début octobre sont à 2-3 feuilles.

Les semis du 15/10 sont au stade 1-2 feuilles.

68 parcelles levées ont fait l'objet d'une saisie sur Vigicultures (45 blés et 23 orges).

	Non levée	Levée à 1 f	2 f	3 f	Début tallage	Total
Blé	2	31	12	1	1	47
Orge	2	15	6	2	0	25
Total	**4**	**46**	**18**	**3**	**1**	**72**

Tableau des observations en nombre de parcelles





Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de

Ravageurs

Limaces

Que ce soit à Dijon, Auxerre, Nevers ou Lons, le risque estimé par le modèle agro-climatique inter institut s'annonce très faible.





Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
Avec le soutien financier de

Evaluer le risque limaces

Vous pouvez évaluer le risque limaces avant les semis.

La pose de 4 pièges standardisés, couvrant 0,25 m² chacun, permet de donner une estimation du nombre d'individus au mètre carré dans la parcelle.

Pour pallier autant que possible l'hétérogénéité d'infestation, il est conseillé d'espacer les pièges d'au moins 5 mètres et de les répartir à l'intérieur de la parcelle en évitant les bordures pour ne pas biaiser la mesure.

De plus, pour éviter de créer des refuges de limaces, il est judicieux de déplacer tous les pièges de quelques mètres après chaque relevé.

Les pièges sont à installer face aluminium visible, de préférence le soir et doivent être préalablement humidifiés à saturation. Aucun granulé molluscicide ne doit être positionné dessous.

A partir de ce piège, le risque limace se raisonne avec les seuils suivants (rapporter le comptage du piège au m²) :


- 1 à 10 limaces / m² : risque faible
- 10 à 20 limaces / m² : risque moyen
- 20 à 50 limaces / m² : risque élevé
- Plus de 50 limaces / m² : risque très élevé



En cas d'observations de dégâts, privilégiez les spécialités de biocontrôle à base de phosphate ferrique.

Des morsures (1 à 4 % de pieds) sont observées dans 4 parcelles sur 68.

Le risque limace est faible. Le risque sera à réévaluer la semaine prochaine. Surveillez cependant les parcelles avec peu de travail du sol et couvertes de végétation.




Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Liberté Égalité Fraternité
Avec le soutien financier de

Les cicadelles (Psammotettix alienus) responsables des symptômes de pieds chétifs

Quelques rares cicadelles ont été dénombrées sur 8 pièges englués posés (de 1 à 20 insectes).

Risque actuellement faible à moyen sur les parcelles levées (2 feuilles) et sur les parcelles en cours de levée (pointant à 1 feuille).


La météo de la semaine à venir ne sera pas favorable au déplacement de cet insecte.



Surveillez les cicadelles grises dès le stade pointant de la céréale dans les situations qui se réchauffent rapidement et / ou proches de repousses de céréales. Réaliser les observations dans les heures chaudes et ensoleillées de la journée.

Les pucerons (Rhopalosiphum Padi, Sitobion, Metopolophium…) vecteurs de la jaunisse nanisante

Rhopalosiphum padi est un puceron à forme globuleuse (1,2 à 2,4 mm), qui présente un corps vert foncé avec des taches rougeâtres autour de l'insertion des cornicules. A l'automne, lorsque les conditions sont favorables les pucerons ailés volent et se posent préférentiellement sur les jeunes plantules de céréales. Ils transmettent le virus lors de leurs piqûres alimentaires. L'infestation est d'autant plus importante que le nombre de jours de vols est élevé : les semis précoces sont ainsi toujours plus exposés. Suite à cette contamination primaire de la parcelle, la diffusion de la maladie est assurée par leur descendance : les pucerons aptères (sans ailes) se contaminent en se nourrissant sur des plantes malades puis contaminent d'autres plantes (dissémination par foyer).






Puceron ailé et puceron aptère


Elodie JOUDELAT - CA89


Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Liberté Égalité Fraternité
Avec le soutien financier de
OFB OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ

Le vol de pucerons reste modeste à la tour à succion.



Le vol est extrêmement faible. Zéro capture la semaine dernière.






Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de

Risque pucerons

Semis du 15/10 - Risque évalué jusqu'au 09/11/2026



Risque pucerons pour des semis de BTH à 3 dates : 25/09 - 05/10 et 15/10.

Données Météo France, modèle Aphibox, ARVALIS

ETAT DES LIEUX

Dès le début de la levée, un état des lieux est à réaliser par beau temps en parcourant la parcelle. Le seuil d'intervention est de 10 % de plantes touchées par au moins un puceron. En dessous de ce seuil, il ne faut pas laisser séjourner les pucerons plus de 10 jours de suite.

Des pucerons ailés sont signalés dans 15 parcelles sur 56 avec des infestations moyennes de 5 % de plantes porteuses d'au moins un puceron. Le seuil est atteint ou dépassé dans 3 parcelles.

Des pucerons sont également capturés sur les pièges englués.

Commune	code_insee	Organisme	culture	variete	date semis	Stade	% pieds porteurs d'au moins un puceron
MERCEUIL	21405	FREDON BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	Blé tendre d'hiver	LG Absalon	06/10/2026	Z12 : 2e F Etalee	0
AVILLEY	25038	CA 25-90	Blé tendre d'hiver	KWS Sphere	16-10-206	Z11 : 1ere F Etalee	0
OLLANS	25430	CA 25-90	Blé tendre d'hiver	Intensity	14/10/2026	Z12 : 2e F Etalee	0
POULIGNEY-LUSANS	25468	CA 25-90	Blé tendre d'hiver		14/10/2026	Z12 : 2e F Etalee	0
VENNANS	25599	CA 25-90	Orge d'hiver	Eternel	30/09/2026	Z12 : 2e F Etalee	0
ANNOIRE	39011	CA 39	Orge d'hiver	Coopernic	16/10/2026	Z11 : 1ere F Etalee	0
ARLAY	39017	CA 39	Orge d'hiver	SY Dakoota	05/10/2026	Z12 : 2e F Etalee	3

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de

ASNANS-BEAUVOISIN	39022	CA 39	Blé tendre d'hiver	Conquistador	14/10/2026	Z10 : Levée	0
AUDELANGE	39024	CA 39	Blé tendre d'hiver	SY Admiration	07/10/2026	Z12 : 2e F Etalee	0
AUDELANGE	39024	CA 39	Orge d'hiver	LG Zorica	12/10/2026	Z12 : 2e F Etalee	0
CHEMIN	39138	CA 39	Blé tendre d'hiver	SY Admiration	19/10/2026	Z10 : Levée	0
COLONNE	39159	INTERVAL	Blé tendre d'hiver	conquistador	15/10/2026	Z11 : 1ere F Etalee	4
OUNANS	39399	CA 39	Blé tendre d'hiver	KWS Sphere	16/10/2026	Z10 : Levée	0
RUFFEY-SUR-SEILLE	39471	CA 39	Blé tendre d'hiver	Conquistador	13/10/2026	Z11 : 1ere F Etalee	1
SERMANGE	39513	CA 39	Blé tendre d'hiver	Unik	15/10/2026	Z12 : 2e F Etalee	**20**
VILLETTE-LÈS-DOLE	39573	CA 39	Orge d'hiver	Constel	09/10/2026	Z12 : 2e F Etalee	3
LURCY-LE-BOURG	58147	CA 58	Blé tendre d'hiver		05/10/2026	Z11 : 1ere F Etalee	1
LURCY-LE-BOURG	58147	CA 58	Orge d'hiver	Carrousel	05/10/2026	Z12 : 2e F Etalee	0
MONTIGNY-SUR-CANNE	58178	CA 58	Blé tendre d'hiver		14/10/2026	Z11 : 1ere F Etalee	0
MONTIGNY-SUR-CANNE	58178	CA 58	Orge d'hiver	LG Zorica	15/10/2026	Z11 : 1ere F Etalee	0
TINTURY	58292	CA 58	Blé tendre d'hiver		19/10/2026	Z10 : Levée	0
AUVET-ET-LA-CHAPELOTTE	70043	GIROUX SAS	Blé tendre d'hiver	Unik	15/10/2026	Z10 : Levée	2
BEAUJEU-SAINT-VALLIER-PIERREJUX-ET-QUITTEUR	70058	CHAMBRE AGRICULTURE VIENNE	Blé tendre d'hiver		13/10/2026	Z11 : 1ere F Etalee	0
COLOMBINE	70152	CA 70	Blé tendre d'hiver	KWS Sphere	08/10/2026	Z12 : 2e F Etalee	1
CUGNEY	70192	CA 70	Blé tendre d'hiver		04/10/2026	Z12 : 2e F Etalee	2
MONTUREUX-ET-PRANTIGNY	70371	CHAMBRE AGRICULTURE VIENNE	Blé tendre d'hiver		13/10/2026	Z12 : 2e F Etalee	1
MONTUREUX-ET-PRANTIGNY	70371	CHAMBRE AGRICULTURE VIENNE	Orge d'hiver		17/10/2026	Z13 : 3e F Etalee	0
PESMES	70408	CA 70	Blé tendre d'hiver	LG Absalon	15/10/2026	Z11 : 1ere F Etalee	2
VELESMES-ÉCHEVANNE	70528	CA 70	Blé tendre d'hiver		15/09/2026	Z21 : Debut tallage	5
BUXY	71070	CA 71	Blé tendre d'hiver	Conquistador	09/10/2026	Z13 : 3e F Etalee	0
BUXY	71070	CA 71	Orge d'hiver		13/10/2026	Z11 : 1ere F Etalee	0
SAINT-GERVAIS-EN-VALLIÈRE	71423	FREDON BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	Orge d'hiver	LG Zorica	11/10/2026	Z11 : 1ere F Etalee	0
AUXERRE	89024	CA 89	Orge d'hiver	KWS Faro	10/10/2026	Z11 : 1ere F Etalee	0
BRIENON-SUR-ARMANÇON	89055	CA 89	Orge d'hiver	KWS Faro	05/10/2026	Z11 : 1ere F Etalee	0
CHAMPIGNELLES	89073	110 BOURGOGNE	Orge d'hiver	KWS Delis	17/10/2026	Z10 : Levée	0
CHARBUY	89083	CA 89	Blé tendre d'hiver	KWS Constellum	13/10/2026	Z11 : 1ere F Etalee	0
GY-L'ÉVÊQUE	89199	CA 89	Blé tendre d'hiver	Chevignon	08/10/2026	Z11 : 1ere F Etalee	0
LUCY-SUR-CURE	89233	CA 89	Blé tendre d'hiver	Outdoor	06/10/2026	Z12 : 2e F Etalee	0

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de

SAINPUITS	89331	CA 89	Blé tendre d'hiver	FUNNY	16/10/2026	Z10 : Levée	0
SAINT-MARTIN-D'ORDON	89353	SEINEYONNE	Orge d'hiver	KWS Faro	12/10/2026	Z11 : 1ere F Etalee	0
SAINT-VALÉRIEN	89370	SOUFFLET AGRICULTURE	Blé tendre d'hiver	PONDOR	14/10/2026	Z10 : Levée	10
SAINT-VALÉRIEN	89370	SOUFFLET AGRICULTURE	Orge d'hiver	LAROCHEL	18/10/2026	Z10 : Levée	15
SOUMAINTRAIN	89402	FERME LORNE	Orge d'hiver		09/10/2026	Z12 : 2e F Etalee	0
VILLEBOUGIS	89450	CA 89	Blé tendre d'hiver	Intensity	14/10/2026	Z11 : 1ere F Etalee	0
FONTAINE	90047	CA 25-90	Blé tendre d'hiver	Chevignon	08/10/2026	Z11 : 1ere F Etalee	0
LACHAPELLE-SOUS-ROUGEMONT	90058	CA 25-90	Blé tendre d'hiver	LG Abilene	16/10/2026	Z10 : Levée	0
PETITEFONTAINE	90078	CA 25-90	Orge d'hiver	KWS Mattis	03/10/2026	Z11 : 1ere F Etalee	0
CORROMBLES		CA 21	Blé tendre d'hiver	THERMIDOR	11/10/2026	Z11 : 1ere F Etalee	0
ÉTALANTE		CA 21	Blé tendre d'hiver	Mélange	14/10/2026	Z11 : 1ere F Etalee	0
MASSINGY		CA 21	Blé tendre d'hiver	RGT PROPULSO	18/10/2026	Z10 : Levée	0
QUETIGNY		CA 21	Blé tendre d'hiver	THERMIDOR	13/10/2026	Z12 : 2e F Etalee	0
RUFFEY-LÈS-ECHIREY		CA 21	Blé tendre d'hiver	Mélange	19/10/2026	Z10 : Levée	0
VAROIS-ET-CHAIGNOT		CA 21	Blé tendre d'hiver	THERMIDOR	15/10/2026	Z11 : 1ere F Etalee	0
CHÂTILLON SUR SEINE		CA 21	Orge d'hiver	Comtesse	16/10/2026	Z11 : 1ere F Etalee	0
FRESNES		CA 21	Orge d'hiver	Comtesse	19/10/2026	Z10 : Levée	0
FROLOIS		CA 21	Orge d'hiver	Comtesse	17/10/2026	Z10 : Levée	0




Puceron ailé sur orge

Elodie JOUDELAT CA89


Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Liberté Égalité Fraternité
Avec le soutien financier de

Sur les quelques parcelles actuellement au stade 3 feuilles - début tallage, la colonisation est en cours. Le risque est moyen.



Sur les semis ultérieurs au 5/10, le risque est actuellement faible à moyen lorsque les infestations dépassent les seuils. Les infestations sont cependant majoritairement faibles.

Réalisez des observations lors d'après midi ensoleillées pour évaluer le risque.




Risque faible sur orges et blés tolérants à la JNO (liste non exhaustive).

Escourgeons brassicoles : CARROUSEL, CONSTEL

Fourragers : KWS INNOVATRIS, KWS JOYAU, LG ZEBRA, LG ZELDA, LG ZORBA, LG ZORICA, ETERNEL, SY SPAROO…

ORGES 2 RANGS : Atomic, Duchesse, Eternity, Idilic, KWS Legendis, KWS Mattis, KWS Ovnis, LG Caiman, LG Caporal, Majorett, Majuscule, Manade, Orcade, Organa, Paquita, Spazio…

Blé : RGT Sundeo



Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Liberté
Égalité
Fraternité
Avec le soutien financier de

Adventices

Les graminées lèvent maintenant massivement.

Réglementation prosulfocarbe : cliquez

Vidéo = comment reconnaitre les graminées (cliquez)



Les graminées du type vulpins, ray-grass, bromes sont de plus en plus résistantes aux différentes molécules

Liens utiles pour plus d'information :

- Résistances aux PPP : R4P (r4p-inra.fr)
- Fiches biodiversité : https://ecophyto-bfc.fr/documentation/fiches-biodiversite/
- Plantes exotiques envahissantes :http://especes-exotiques-envahissantes.fr/centre-de-ressources-especes-exotiques-envahissantes/
- Organismes nuisibles réglementés : https://www.eppo.int/ACTIVITIES/quarantine_activities
- Biocontrôle : https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Avec le soutien financier de

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté et rédaction animée par ARVALIS-Institut du Végétal, Terres Inovia et les Chambres d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté.

Bulletin édité à partir des observations réalisées par :

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux-mêmes réalisées sur leurs parcelles ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques de leurs conseillers.

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
Liberté Égalité Fraternité
Avec le soutien financier de OFB